

Spilarectia karakorumica sp. n. (Lep., Arctiidae)

Von Franz Daniel

In der Zeichnungsanlage und Färbung nicht unähnlich *Ardices glatignyi* Le Guill. (siehe Seitz X p. 237, Tab. 20 g Bild 2 ab. *pallida* Dbl.), im Habitus *Spilarectia leopardina* Koll. fast gleich.

♂: Spannweite 42 mm, Vorderflügel-Länge 20 mm. Grundfarbe aller Flügel ober- und unterseits weiß, beiderseits gleich reich schwarz gezeichnet; die Anordnung der Zeichnungselemente ist aus der Abbildung gut ersichtlich. Besonders auffallend ist eine



Reihe schwarzer Strichflecke längs des Außenrandes der Vorderflügel, die in dieser prägnanten Form allen mir bekannten *Spilarectia*-Arten fehlen. Die Unterseite ist wie die Oberseite gezeichnet. Kopf und Thorax weiß, letzterer mit schwarzer Mittellinie und einem kräftigen, schwarzen Strichfleck auf der Tegula. Patagia nicht abgehoben. Abdomen oberseits gelb, mit einem dunklen Dorsalstreifen und einer lateralen Fleckenreihe; unterseits weiß mit einer der Lateralreihe parallel laufenden verkürzten Reihe schwarzer Punkte. Abdominalende wenig heller.

Palpen schwarz, gerade vorstehend. Fühler schwarz, bewimpert. Füße dunkel, Femur und Tibia kräftig behaart, oberseits weißlich, unterseits gelb. Hinterschienen mit 2 kräftigen Endsporen.

Die beiden vorliegenden ♂♂ unterscheiden sich kaum.

Sp. *karakorumica* nov. ist bei *leopardina* Koll. einzuordnen.

♀ unbekannt.

2 ♂♂ (Holotypus und Paratypoid) N. W. Karakorum, Gilgit, Banidas 2600 m, 36°11' n. Br., 74°33' ö. L., 30. VI.—2. VII. 1959, leg. F. Lobbichler. In Zoologischer Staatssammlung München.

Anschrift des Verfassers:

Franz Daniel, München 19, Schloß Nymphenburg, Nordflügel.