

**Faunistische Nachrichten aus der Steiermark (XX/2):
Neue Tachinenfunde aus der Steiermark (Ins., Diptera, Tachinidae)**

Von Hermann ELSASSER

Eingelangt am 31. Jänner 1975

Die Dipteren der Steiermark wurden seit den grundlegenden Arbeiten von STROBL (1893—1909) wenig beachtet. In systematischer Hinsicht gab es seitdem viele Veränderungen. Auch die geographisch-politischen Verhältnisse haben sich geändert, da die damalige Untersteiermark heute zu Jugoslawien gerechnet wird und Fundortangaben STROBL's sich auch auf ehemals steirische Gebiete beziehen.

Die Tachinen, mit deutscher Bezeichnung Raupenfliegen genannt, sind vornehmlich Endoparasiten von Insekten. Dadurch kommt ihnen bei der Dezimierung bestimmter schädlicher Insektenarten große Bedeutung als Nützlinge zu.

In der folgenden Liste sind neuere Tachinenfunde aus dem Raum der heutigen Steiermark aufgezählt. Die STROBLSchen Funde der hier erwähnten Arten wurden nach Synonymiehinweisen von Dr. B. HERTING (Stuttgart) berücksichtigt, soweit die Artzugehörigkeit aus der Literatur ersichtlich war. Herrn Dr. HERTING ist auch für die Determination der im folgenden angeführten Tachinen und für die Durchsicht des Manuskriptes recht herzlich zu danken.

Alle Tiere wurden vom Autor gesammelt und befinden sich in seiner Sammlung. Fundortangaben ohne Hinweise auf die Stückzahl betreffen nur ein Individuum.

1. Subfam. *Exoristinae*
1. Tribus *Exoristini*

Exorista rustica FALL.

Eutachina rustica MG. (STROBL 1894)

Fundorte: Empersdorf südlich von Graz, 18. 8. 1974;

Fladnitz a. d. Raab, 25. 8. 1974 2 Ex., 1. 9. 1974.

Phorocera assimilis FALL.

Setigena assimilis FALL. (STROBL 1894)

Empersdorf südlich von Graz, 2. 6. 1974.

2. Tribus *Blondeliini*

Meigenia mutabilis FALL.

M. floralis FALL. *M. bisignata* MG. (STROBL 1894, 1910)

Fladnitz a. d. Raab, 26. 5. 1974, 25. 8. 1974, 1. 9. 1974.

Degeeria separata MEIG.

Empersdorf südlich von Graz, 2. 6. 1974.

Erstmals für die Steiermark zu melden.

Trichoparia blanda FALL.

Admontia blanda FALL. (STROBL 1910)

Kumberg östlich von Graz, 19. 7. 1974.

Trichoparia maculisquama ZETT.

Admontia maculisquama ZETT. (STROBL 1894) *A. seria* MG. (STROBL 1910)

Fundort: Kumberg östlich von Graz, 19. 7. 1974, 20. 7. 1974.

Aus Oberösterreich von Bad Hall bekannt (HERTING 1973)

Blondelia nigripes FALL.

Dexodes nigripes FALL. (STROBL 1894)

Fundorte: Engelweingarten, Stainz, 29. 7. 1974;

Kumberg östlich von Graz, 30. 7. 1974;

Fladnitz a. d. Raab, 17. 8. 1974, 25. 8. 1974, 3 Ex.

Compsilura concinnata MEIG.

Machaira concinnata MG. (STROBL 1894)

Kaiserwald, Wundschuh b. Graz, 21. 6. 1973.

6. Tribus Winthemiini

Winthemia quadripustulata F.

Chaetolyga quadripustulata FBR. (STROBL 1894)

Mureck, 9. 5. 1974.

7. Tribus Goniini

Epicampocera succincta MEIG.

E. s. MG. (STROBL 1894)

Fladnitz a. d. Raab, 3. 6. 1974.

Von STROBL bisher nur aus der Obersteiermark gemeldet.

Phryxe vulgaris FALL.

Blepharidea vulgaris FALL. (STROBL 1894)

Fundorte: Deutschlandsberg Burg, 21. 5. 1974;

Fladnitz a. d. Raab, 25. 8. 1974.

Phryxe nemea MEIG.

Graz, 7. 9. 1974.

Von GEPP & ELSASSER 1974 erstmals aus der Steiermark gemeldet.

Lydella stabulans MEIG.

Kumberg östlich von Graz, 19. 7. 1974 4 Ex. 20. 7. 1974.

Erstmals für die Steiermark zu melden.

Carcelia bombylans R. D.

Von STROBL sicher gefunden, aber falsch bestimmt (HERTING i. l.).

Fladnitz a. d. Raab, 28. 7. 1974.

Mit der Angabe von GEPP & ELSASSER 1974 erstmals aus der Steiermark gemeldet.

Carcelia puberula MESN.

Kaiserwald, Wundschuh b. Graz, 4. 6. 1974 2 Ex.

Mit der Angabe von GEPP & ELSASSER 1974 erstmals aus der Steiermark gemeldet.

Platynomyia fimbriata MEIG.

Exorista fimbriata MEIG. (STROBL 1894)

Mureck, 9. 5. 1974.

Von STROBL nur aus der Obersteiermark gemeldet.

Erythrocerca nigripes R. D.

Paraneaera longicornis B. B. (STROBL 1910)

Fundort: Empersdorf südlich von Graz, 18. 8. 1974.

2. Subfam. Echinomyiinae

1. Tribus Echinomyiini

Echinomyia grossa L.

Tachina grossa L. (STROBL 1894)

Kaiserwald, Wundschuh b. Graz, 29. 7. 1974.

Von STROBL aus der Obersteiermark als häufig gemeldet.

Echinomyia fera L.

Tachina fera L. (STROBL 1894)

Fundorte: Glashütten Koralpe 900—1250 m, 20. 7. 1973; Landscha b. Weiz, 28. 5. 1974; Empersdorf südlich von Graz, 2. 6. 1974, 14. 7. 1974, 18. 8. 1974; Fladnitz a. d. Raab, 4. 8. 1974; Kirchberg a. d. Raab, 8. 9. 1974 2 Ex.

Echinomyia magnicornis ZETT.

Tachina magnicornis ZETT. (STROBL 1894)

Fundort: Fladnitz a. d. Raab, 18. 5. 1974, 23. 5. 1974, 30. 6. 1974, 4. 8. 1974 31. 8. 1974 2 Ex., 1. 9. 1974 6 Ex.

Servillia ursina MEIG.

Steingraben, Schöckel, 23. 4. 1974.

Erstmals für die Steiermark zu melden.

Linnaemyia impudica ROND.

Micropalpus haemorrhoidalis MG. (STROBL 1894, 1910)

Fundorte: Empersdorf südlich von Graz, 2. 6. 1974; Fladnitz a. d. Raab, 17. 8. 1974.

Linnaemyia pudica ROND.

Micropalpus pudicus RND. (STROBL 1910)

Kirchberg a. d. Raab, 8. 9. 1974.

Ernestia rufa FALL.

Erigone strenua MG. (STROBL 1894, 1910)

Empersdorf südlich von Graz, 2. 6. 1974.

Von STROBL aus Admont, von Lichtmeßberg und aus dem Gesäuse als nicht häufig gemeldet.

Ernestia caesia FALL.

Erigone longicornis STROBL (STROBL 1894)

Kaiserwald, Wundschuh b. Graz, 29. 7. 1974 3 Ex.

Ernestia connivens ZETT.

Erigone caesia STROBL, non FALL. (STROBL 1894)

E. connivens ZETT. (STROBL 1910)

Kumberg östlich von Graz, 19. 7. 1974.

Ernestia consobrina MEIG.

Erigone rufa STROBL (STROBL 1894) non FALL. (STROBL 1910)

Kaiserwald, Wundschuh b. Graz, 29. 7. 1974 2 Ex.

Ernestia vivida ZETT.

Erigone vivida ZETT. (STROBL 1894, 1910)

Dürnberger Moor bei Neumarkt, 13. 7. 1974.

Nemoreaa pellucida MEIG.

N. p. MG., *N. nupta* RND. (STROBL 1894)

Empersdorf südlich von Graz, 14. 7. 1974; Kirchberg a. d. Raab, 8. 9. 1974.

Lypha dubia FALL.

Aporomyia dubia FALL. (STROBL 1894, 1898, 1910)

Gralla-Au bei Leibnitz, 21. 3. 1974.

Pelatachina tibialis FALL.

Hyria tibialis FALL. (STROBL 1894, 1898, 1910)

Fladnitz a. d. Raab, 18. 5. 1974.

Macquartia tenebricosa MEIG.

M. t. MG., *M. affinis* SCHINER, *M. nitida* ZETT. (STROBL 1894)

Mureck, 9. 5. 1974.

Macquartia praefica MEIG.

Dürnberger Moor bei Neumarkt, 13. 7. 1974 2 Ex., 14. 7. 1974.

Erstmeldung für die Steiermark.

2. Tribus Leskiini

Bithia spreta MEIG.

Demoticus frontatus ZETT. (STROBL 1894)

Empersdorf südlich von Graz, 18. 8. 1974.

3. Tribus Microphthalmini

Dexiosoma caninum F.

D. c. FAB. (STROBL 1894)

Fladnitz a. d. Raab, 28. 7. 1974.

3. Subfam. Dexiinae

1. Tribus Dexiini

Phorostoma carinifrons FALL.

Myiocera carinifrons FALL. (STROBL 1894)

Lachtal, 13. 8. 1974.

Von STROBL aus der Obersteiermark gemeldet.

2. Tribus Voriini

Eriothrix rufomaculatus DEC.

Olivieria lateralis FBR. (STROBL 1894)

Fladnitz a. d. Raab, 31. 8. 1974, 1. 9. 1974.

Phyllomyia volvulus F.

Melania volvulus FBR. (STROBL 1894)

Fladnitz a. d. Raab, 3. 6. 1974; Dürnberger Moor bei Neumarkt, 15. 7. 1974.

Nach STROBL häufig in der Obersteiermark.

Voria ruralis FALL.

Plaginæa ruralis FALL. (STROBL 1894)

Graz Süd, 7. 3. 1974; Kumberg östlich von Graz, 4. 7. 1974, 19. 7. 1974;

Kaiserwald, Wundschuh b. Graz, 29. 7. 1974.

Thelaira nigripes F.

T. n. F. (STROBL 1894)

Kumberg östlich von Graz, 4. 7. 1974, 19. 7. 1974, 20. 7. 1974.

3. Tribus Dufouriini

Dufouria chalybeata MEIG.

Masquartia (Ptilops) chalybeata MG. (STROBL 1894)

Fladnitz a. d. Raab, 18. 5. 1974, 23. 5. 1974, 26. 5. 1974.

Von STROBL 1894 aus der Obersteiermark gemeldet.

Dufouria nigrita FALL.

Macquartia (Ptilops) nigrita FALL. (STROBL 1894)

Fladnitz a. d. Raab, 23. 5. 1974.

4. Subfam. Phasiinae

1. Tribus Phasiini

Gymnosoma rotundatum L.

Fladnitz a. d. Raab, 31. 8. 1974.

2 Ex.

Gymnosoma clavatum ROHD.

Fladnitz a. d. Raab, 31. 8. 1974.

Erstmeldung für die Steiermark.

Aus Oberösterreich von der Welser Heide bekannt (HERTING 1973).

Allophora obesa F.

A. o. F. (STROBL 1894)

Empersdorf südlich von Graz, 14. 7. 1974.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Eine Liste neuerer Tachinenfunde aus der Steiermark mit faunistischen Hinweisen wurde erstellt. Insgesamt werden 45 Arten aufgezählt, von denen 6 Arten Erstmeldungen für die Steiermark darstellen.

L i t e r a t u r

- GEPP J. & ELSASSER H. 1974. Zur Entomofauna der Schwarzerkenbruchwälder im Südwesten der Steiermark: Einige Tachinenfunde. — Ber. Arbeitsgem. ökol. Ent. Graz, 1 (3):21-23.
- HERTING B. 1960. Biologie der westpaläarktischen Raupenfliegen. Dipt., Tachinidae. — Monogr. angew. Ent. 16:1-188.
- 1973. Raupenfliegen (Dipt. Tachinidae) aus Oberösterreich in der Sammlung des Oberösterreichischen Landesmuseums zu Linz. — Naturkundl. Jb. Stadt Linz, 1973:9-121.
- STROBL G. 1894. Die Dipteren von Steiermark. II. Theil. — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 30:1-152.
- 1898. Die Dipteren von Steiermark. IV. Theil. Nachträge. Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 34:192-298.
- 1910. Die Dipteren von Steiermark. II. Nachtrag. — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark. 46:45-293.

Anschrift des Verfassers: Hermann ELSASSER, Ludwig Boltzmann-Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz, Heinrichstraße 5, A-8010 G r a z.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [105](#)

Autor(en)/Author(s): Elsasser Hermann

Artikel/Article: [Neue Tachinenfunde aus der Steiermark. 305-309](#)