

- KEPKA, O., 1954: In M. ANSCHAU, W. BERNHAUER, O. KEPKA und E. KUPKÁ:
Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark. Mitt. naturw. Ver.
Steiermark, 84:76.
- KEPKA, O., 1956: Der Graureiher (*Ardea cinerea*) als Brutvogel in der Steier-
mark. Ornithologische Mitteilungen, Heft 6:111.

Anschriften der Verfasser:

Dr. MLADEN ANSCHAU stud. pharm. WOLFG. BERNHAUER, Dr. OTTO KEPKA,
Graz, Burgring 14/II Steyr, Stadtplatz 7 Graz, Zool. Inst.
Univ. Graz

MAMMALIA
CHIROPTERA

Gefranste Fledermaus, *Myotis nattereri* KUHLE 1818. Meines Wissens ist diese Fledermaus bisher nur einmal in der Steiermark gefunden worden. Und zwar fand K. BAUER 1956 in einer Aufsammlung aus dem Katerloch bei Weiz einen Schädel dieser Art. Lebendfunde waren bisher noch ausständig. Bei meinen Untersuchungen in den Höhlen in der Steiermark fand ich an folgenden Stellen Männchen dieser Art. Die Tiere befanden sich in 40—50 cm tiefen Spalten in der Nähe der Höhleneingänge.

1. Stollen im Felsen des Klettergartens, Admonterkogel, Weinzödl bei Graz: am 27. März 1957 ein Männchen.
2. Zigeunerloch bei Gratkorn: am 19. April 1957 ein Männchen.
3. Große Badlhöhle bei Peggau: am 22. April 1957 ein Männchen.

Literatur:

BAUER, K., 1956: Erster Nachweis der Teichfledermaus (*Myotis dasycneme* Boie) für Österreich. Die Höhle, Heft 4:89-91.

Dr. OTTO KEPKA, Graz, Zoolog. Inst. Universität Graz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark](#)

Jahr/Year: 1957

Band/Volume: [87](#)

Autor(en)/Author(s): Kepka Otto

Artikel/Article: [Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark \(IV\). MAMMALIA CHIROPTERA. 24](#)