

**Abteilung für Zoologie u. Botanik am Landesmuseum „Joanneum“**  
**Heft 6** **Graz** **1956**

---

# In Graz gepflanzte Laubhölzer

Von  
**FRANZ HANSELMAYER**  
**GRAZ**



**Schriftleitung: Dr. Karl Mecenovic**

Im Selbstverlag der Abteilung für Zoologie und Botanik am Landesmuseum „Joanneum“  
Graz, Raubergasse 10.

Ausgegeben im Dezember 1956



# In Graz gepflanzte Laubhölzer

Von FRANZ HANSELMAYER, Graz

In den Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark, Bd. 75 (1939), Seite 17 bis 30, ist eine Aufzählung der „In Graz und Umgebung gepflanzten Nadelhölzer“ von J. EGGLER enthalten und vermerkt, daß die Laubhölzer einer späteren Veröffentlichung vorbehalten sind. Durch Doktor W. KRIECHBAUM angeregt, für Gärtner und Gartenfreunde auch die in Graz und Umgebung gepflanzten Laubhölzer zu veröffentlichen, hat mir Dozent Dr. J. EGGLER seine gemeinsam mit den Nadelhölzern seinerzeit gesammelten Belege der Laubhölzer in drei Herbarfazikeln mit dem Wunsch übergeben, sie zu bearbeiten, zu ergänzen und zu veröffentlichen, weil er hiefür vorderhand nicht die nötige Zeit aufbringt. Diesem Wunsch bin ich gern nachgekommen, mußte aber bald erkennen, daß eine vollständige Erfassung der gepflanzten Laubhölzer dem Einzelnen kaum möglich ist und etlicher Jahre bedarf. Ich habe mich aber trotzdem zur Veröffentlichung des Ergebnisses entschlossen und dabei vor allem getrachtet, möglichst alle Gattungen, von denen Arten in Graz und Umgebung gedeihen, ausfindig zu machen. Ich hoffe, diese Liste durch weitere Begehungen und durch die Unterstützung aller Gehölzfreunde möglichst zu vervollständigen. Das Grazer Klima (siehe Seite 4) ist so günstig, daß manche Arten, für die in den Gartenbüchern guter Winterschutz gefordert wird, bei uns ohne solchen aushalten. Als Beispiel führe ich die Escallonen an, die in den Baumschulen kaum geführt werden, weil sie als nicht winterhart gelten. Bei mir gedeihen sie seit Jahren (1936 bis 1955) ohne jeden Winterschutz im Garten, ohne daß sie jemals abgefroren wären.

Selbstverständlich sind auch in Graz nicht alle Lagen gleichwertig. So ist die Kultur vieler Pflanzen auf den südseitigen und geschützten Hanglagen günstiger als auf den nordseitigen und in ebenen Lagen.

Ich wäre allen Lesern sehr dankbar, wenn sie mir in dieser Liste nicht angeführte Fundorte an meine Anschrift, die am Schluß dieses Artikels steht, bekanntgeben wollten; denn es war mir nicht möglich, alle Privatgärten zu besuchen; auch kann mir in größeren Anlagen leicht die eine oder andere Art entgangen sein.

Ich habe mich bemüht, die jetzt gültigen Pflanzennamen ausfindig zu machen, was bei der noch nicht zur Ruhe gekommenen wissenschaftlichen Nomenklatur oft nicht leicht war. Daher habe ich mich vor allem in der wissenschaftlichen Benennung der Arten an die umfassendste neuere Dendrologie von REHDER, Manual of Cultivated Trees and Shrubs, New York 1954, gehalten. Die nach Gattungen oder Personen benannten Arten habe ich nach den Empfehlungen des Internationalen Botaniker-Kongresses in Stockholm (1950) klein geschrieben. Synonyme wurden nur insoweit angeführt, als sie heute noch verwendet werden. Zum leichteren Auffinden sind die Gattungen und Arten in alphabetischer Reihenfolge angeordnet.

Allen jenen, die mir Fundorte angegeben oder mich sonst unterstützt haben, möchte ich an dieser Stelle danken, so den Besitzern der Baumschulen, ferner besonders Herrn H. BRUNNER, Frau Dozent Dr. A. BUSCHMANN, Herrn Dozent Dr. J. EGGLER und Herrn Dr. W. KRIECHBAUM; nicht zuletzt der Steiermärkischen Landesregierung und dem Bürgermeister der Stadt Graz, Herrn Dr. J. SPECK, die mir die Begehung der in ihrer Obhut befindlichen Anlagen gestatteten.

Herrn Univ.-Prof. Dr. F. WIDDER danke ich für die Erlaubnis zur Benützung der Bibliothek des Institutes für systematische Botanik der Universität Graz.

## Meteorologische Angaben zum Klima von Graz:

		Jahresmittel		Schwankungen	
		Temperaturen in C°	Niederschläge in mm	Temperaturen	Niederschläge
Normalperiode	1901—1930	8,9°	891,9	8,1°—9,7°	608,9—1133,6
50-jähriges Mittel	1901—1950	9,0°			
	1881—1930	8,8°	874,0		
	1948—1954	9,45°	762,5	9,1°—9,8°	681—844

Extreme		
	Temperaturen	Niederschläge
1901—1930	+ 32,5° bis — 23,7°	608,9—1133,6

Die Vegetationszeit — das ist die Zeit zwischen Vorfrühlingsbeginn (Schneeglöckchenblüte) bis zum Absinken des Tagesmittels unter +5°C — dauert für das Gebiet von Graz bis 235 Tage.

In vorliegender Arbeit benützte Literatur sowie wichtigste Bestimmungs- und Nachschlagsbehelfe für Laubhölzer:

- Fitschen J. 1950. Gehölzflora. 4. Aufl. Heidelberg.  
 Fritsch K. 1909. Exkursionsflora für Österreich. 2. Aufl. Wien.  
 Hamburger J. 1948. Zur Adventivflora von Graz (unveröffentlichte Dissertation).  
 Hauszer K. 1935. Gärtnerisch-botanischer Führer über den Grazer Schloßberg. Graz.  
 Hoffer M. u. Lämmermayr L. 1922. Junk's Naturführer: Steiermark. Berlin (Stadtpark, p. 200 ff.).  
 Krüssmann G. 1951. Die Laubgehölze. 2. Aufl. Berlin.  
 Lämmermayr L. 1926. Die Pflanzendecke der Steiermark. In: Heimatkunde der Steiermark XIV. Ein Gang durch die Parkanlagen von Graz (Stadtpark, Schloßberg). Wien, Leipzig, Prag.  
 Lämmermayr L. 1933. Querschnitte durch den Boden, die Pflanzendecke und Tierwelt von Graz. In: Naturgeschichtliche Lehrwanderungen in der Heimat. Heft I. Graz.  
 Rehder A. 1954. Manual of Cultivated Trees and Shrubs. 2. Aufl. New York.  
 Rosenkranz F. 1951. Grundzüge der Phänologie. Wien.  
 Schneider C. 1906—1912. Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde, 1, 2. Jena.  
 Silva Tarouca E. u. Schneider C. 1930. Unsere Freiland-Laubgehölze. 3. Aufl. Wien.  
 Wocke E. 1922. Gehölzbuch für Gartenfreunde und Gärtner. 2. Aufl. Frankfurt a. O.

Im Texte verwendete Abkürzungen:

- H = Heimat bzw. natürliches Vorkommen.  
F = Fundort im Untersuchungsgebiet.  
f. = forma.  
Bot.G. = Botanischer Garten der Universität Graz.  
BsCh. = Baumschule.  
u. a. = und anderwärts.  
p. pte. = zum Teil.  
fl. pl. = mit gefüllten Blüten.

## Verzeichnis der Laubholzgattungen und -arten

### Acanthopanax Dene. et Planch., Stachelkraftwurz — Araliaceae.

- **henryi** Harms., H: Mittelchina, F: Bot. G.  
— **sieboldianus** Mak. (= *A. spinosus*, = *Aralia pentaphylla*), H: Japan, F: BsCh. Klenert.

### Acer L., Ahorn — Aceraceae.

- **campestre** L., Feld-Ahorn, Maßholder, H: Europa, Westasien, F: Vor dem Bad Friedrichgasse (Naturschutz!), BsCh. Grubbauer. — Auch sonst nicht selten.  
— **carpinifolium** S. et Z., Hainbuchen-Ahorn, H: Japan, F: Schloßberg beim Türkenbrunnen.  
— **ginnala** Maxim., Mandschurischer Ahorn, H: Mittel- und Nordchina, Mandschurei, Japan, F: Bot. G., BsCh. Grubbauer.  
— **japonicum** Thunb., Japanischer Ahorn, H: Japan, F: Bot. G., Babenbergerstraße, BsCh. Kern.  
— **monspessulanum** L., Französischer Ahorn, H: Südeuropa, Westasien, F: Bot. G., Schloßberg: Mauerbrüstung beim Uhrturm.  
— **negundo** L. (= *Negundo fraxinifolium*, = *N. aceroides*), Eschen-Ahorn, H: Östliche und mittlere Vereinigte Staaten, F: Bot. G. Stadtpark: Nähe der Trauerweide, BsCh. Grubbauer, Ecker und Thalhammer u. a. — Zahlreiche Gartenformen mit weißbunten, weißrandigen, gelben und gekräuselten Blättern:  
— — **auratum** Schwer. (= *A. californicum aureum*, = *A. negundo odessanum*), F: Burg, Parkring, Stadtgärtnerei.  
— **palmarum** Thunb., Fächer-Ahorn, H: Japan, F: Stadtpark: Nähe des Anastasius-Grün-Denkmales, Schloßbergplateau, Murkai, BsCh. Grubbauer. — Viele Formen:  
— — **atropurpureum** Schwer., Rotblättriger Fächer-Ahorn, F: BsCh. Kern und Ecker.  
— — **dissectum** Maxim., F: BsCh. Kern.  
— **pennsylvanicum** L., Schlangenhaut-Ahorn, H: östliches Nordamerika, F: Bot. G.  
— **platanoides** L., Spitz-Ahorn, H: Europa, Kaukasus. — Zahlreiche Formen:  
— — **globosum** Nichols., mit kugeliger Krone, F: Stadtgärtnerei.  
— — **schwedleri** Nichols., meist als Blut-Ahorn bezeichnet, doch haben auch andere Arten mehr oder minder rötliche Blätter (besonders im Austrieb), F: Stadtpark mehrere, z. B. Nähe der Franck-Eiche, Kinderspielplatz, Stadtgärtnerei, Bot. G., BsCh. Ecker, Grubbauer und Thalhammer u. a.  
— **pseudoplatanus** L., Berg-Ahorn, H: Europa, Westasien. Von den Formen seien genannt:  
— — **leopoldii** Schwer., weiß und rosa gescheckte Blätter, F: Stadtpark beim Brunnen, BsCh. Grubbauer.  
— — **handjeryi** Schwer. (= *A. pseudoplatanus Prinz Handjery*, = *A. pseudoplatanus brilliantissimus*), F: BsCh. Grubbauer.  
— — **rubrum drummondii** Sarg. (= *A. Drummondii*), H: südliche Vereinigte Staaten, F: BsCh. Klenert.

- **saccharum** Marsh., Z u c k e r - A h o r n (= *A. saccharinum* Wangh. nicht L., = *A. barbatum*), **H:** nördliches Nordamerika, **F:** Bot. G.
- **saccharinum laciniatum** Carr., S i l b e r - A h o r n (= *A. dasycarpum* wieri), **H:** östliches Nordamerika, **F:** Stadtpark beim Roseggerdenkmal, Bsch. Grubbauer.
- **tartaricum** L., **H:** Südosteuropa, Westasien, **F:** Bot. G., Garten der Maschinenfabrik Andritz.

**Actinidia Lindl.**, S t r a h l e n g r i f f e l — *Dilleniaceae*.

- **arguta** Miq., S c h a r f z ä h n i g e r S t r a h l e n g r i f f e l, **H:** Japan, Korea, Mandschurei, **F:** Bot. G., Bsch. Kern.
- **chinensis** Planch., C h i n e s i s c h e r S t r a h l e n g r i f f e l, **H:** China, **F:** Bot. G.
- **kolomikta** Maxim., M a n d s c h u r i s c h e r S t r a h l e n g r i f f e l, **H:** Nordostasien, China, Japan, **F:** Bot. G.

**Aesculus L.**, R o ß k a s t a n i e — *Hippocastanaceae*.

- **carnea** Hayne, R o t e R o ß k a s t a n i e (= *A. rubicunda*, = *A. hippocastanum* x *pavia*), mit mehreren Formen, häufig, z. B. Stadtpark, Schloßberg, Anfang Bergstraße Eggenberg.
- **hippocastanum** L., G e m e i n e R o ß k a s t a n i e, **H:** Nordgriechenland, Bulgarien, **F:** Häufig gepflanzter Alleebaum mit vielen Gartenformen.
- **octandra** Marsh., G e l b e R o ß k a s t a n i e (= *A. flava*, = *A. lutea*, = *Pavia lutea*), **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark: Nähe des Franckdenkmals.
- **parviflora** Walt., L a n g t r a u b i g e R o ß k a s t a n i e (= *A. macrostachya*), **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark: Hauptallee.
- **pavia** L., R o t b l ü h e n d e R o ß k a s t a n i e (= *Pavia rubra*), **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark (Kleinbaum bis 6 m).

**Ailanthus\* Desf.**, G ö t t e r b a u m — *Simarubaceae*.

- **altissima** Swingle, G ö t t e r b a u m (= *A. glandulosa*), **H:** China, **F:** Stadtpark: besonders glacie seitig; oft gepflanzt und hie und da verwildert (z. B. Plabutsch).
- **vilmoriniana** Dode (= *A. glandulosa* var. *spinosa*), **H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

**Akebia Dcne.**, A k e b i e — *Lardizabalaceae*.

- **lobata** Dcne. (= *A. trifoliata*), **H:** Mittelchina bis Japan, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **quinata** Dcne., **H:** Mittelchina bis Korea, Japan, **F:** Bot. G., Rudolfstraße 12, Bsch. Klenert, Grubbauer und Kern.

**Amelanchier Med.**, F e l s e n b i r n e — *Rosaceae*.

- **ovalis** Med., G e m e i n e F e l s e n b i r n e (= *A. vulgaris*, = *A. rotundifolia*), **H:** Süd- und Mitteleuropa, **F:** Bot. G., in der Nähe des „Klettergartens“ St. Veit, Jungfernsprung.
- **spicata** K. Koch, Ä h r i g e F e l s e n b i r n e, **H:** nordöstliches Nordamerika, **F:** Bot. G.

**Amorpha L.**, B a s t a r d - I n d i g o , U n f o r m — *Leguminosae*.

- **fruticosa** L., G e m e i n e B a s t a r d - I n d i g o , **H:** Nordamerika, **F:** Bot. G., Steinbergstraße, Bsch. Ecker und Grubbauer.

**Ampelopsis Mehx.**, D o l d e n r e b e , S c h e i n r e b e — *Vitaceae*.

- **brevipedunculata** Koehne, R a u h h a a r i g e D o l d e n r e b e , **H:** Nordostasien, **F:** Schloßberg: Tor zum Herbersteingarten.
- — **maximowiczii** f. **elegans** (= *A. tricolor*, = *Vitis heterophylla variegata*), Blätter weiß und rosa gescheckt, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **megalophylla** Diels et Gilg. (= *Vitis megalophylla*), **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Schloßberg: Mauern des Kriegerdenkmals, Bsch. Grubbauer.

**Aralia L.**, A r a l i e — *Araliaceae*.

- **elata** Seem. (= *A. chinensis*), **H:** Japan, Korea, Mandschurei, **F:** Bot. G., Bsch. Kern.

\* Richtiger ohne „h“; kommt vom molukkanischen „ailanto“.

— **spinosa** L., Teufelsspazierstock, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Schloßberg, Jubiläumssteig links (in der Nähe einer Eibe), Bsch. Grubbauer.

**Aristolochia** L., Osterluzei, Pfeifenwinde — *Aristolochiaceae*.

— **durior** Hill. (=*A. siphon*), **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Hof der Grieskaischule, Humboldtstraße, Bsch. Grubbauer und Thalhammer.

**Aronia** Med., Apfelbeere — *Rosaceae*.

— **arbutifolia** Elliot., Rotfrüchtige Apfelbeere (=*Sorbus arbutifolia*), **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Grubbauer.

**Aucuba** Thunb., Goldblatt — *Cornaceae*.

— **japonica** variegata D'Ombr. (=*A. maculata*), **H:** Japan, **F:** Bot. G., Am Grabenwald (Eggenberg) u. a., Bsch. Klenert. Wird meist als Kalthauspflanze kultiviert, ist aber bei uns winterhart.

**Baccharis** L., Kreuzstrauch — *Compositae*.

— **halimifolia** L., **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtgärtnerei.

**Berberis** L., Berberitz, Sauerdorn — *Berberidaceae*.

— **buxifolia** Poir., Buchsbaum-Berberitz (=*B. dulcis*), **H:** südliches Südamerika, **F:** Bsch. Klenert, Thalhammer (*var. nana*).

— **candidula** C. Schn. (=*B. hookeri* *var. candidula*), **H:** Mittelchina, **F:** Bsch. Ecker.

— **gagnepainii** C. Schn. (=*B. acuminata* p. pte), **H:** Westchina, **F:** Schloßberg: Jubiläumssteig unter Eibe, Landeskrankenhaus, Am Grabenwald, Bsch. Kern.

— **polyantha** Hemsl., **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Bsch. Kern.

— **sanguinea** Franch., **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

— **thunbergii** DC. (=*B. japonica*), **H:** Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker, Grubbauer und Thalhammer.

— — **atropurpurea** Chenault, Japanische Blutberberitz, **F:** Bot. G., Stadtpark, Opernhaus, Herbersteingarten, Anlage Murkai, Körösistraße, Hirtenschule (Hecke), Bsch. Ecker, Grubbauer und Kern.

— **veitchii** C. Schn. (=*B. acuminata*), **H:** Mittelchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

— **verruculosa** Hemsl. et Wils., **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer und Kern.

— **vulgaris atropurpurea** Reg., **F:** Bsch. Ecker, Grubbauer, Kern und Thalhammer.

— **wilsoniae** Hemsl. et Wils., **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Schloßberg: Jubiläumssteig, Bsch. Ecker und Grubbauer.

Da *Berberis*-Arten schwer unterscheidbare Bastarde liefern, sind reine Arten selten. So sollen die Arten im Botanischen Garten vorwiegend Bastarde sein.

**Betula** L., Birke — *Betulaceae*.

— **excelsa** Aiton, Hohe Birke, hübscher Bastard zwischen *B. papyrifera* und *B. pumila*, **F:** Bot. G.

— **humilis** Schrank, Strauch-Birke, **H:** Europa, Nordasien bis Altai, **F:** Bsch. Thalhammer.

— **lenta** L., Zucker-Birke, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bsch. Klenert.

— **papyrifera** Marsh., Papier-Birke, **H:** nördliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Bsch. Klenert.

— **pendula** Roth, Gemeine Weißbirke (=*B. verrucosa*, =*B. alba* p. pte), **H:** Europa, Kleinasiens bis Mandschurei, **F:** Stadtpark, Landeskrankenhaus, Jungferngasse auf Torbogen, Liebiggasse u. a., Bsch. Kern und Thalhammer.

— — **dalecarlica** C. Schn. Schlitzblättrige Birke (=*B. laciniata*), **F:** Straße zur Hubertushöhe.

— — **fastigiata** K. Koch (=*B. pendula pyramidalis*), **F:** Bot. G., Mariagrünerstraße (Besitz Rumpf).

— — **youngii** C. Schn., Hänge-Birke, **F:** Bsch. Grubbauer.

**Broussonetia** Vent., Papier-Maulbeerbaum — *Moraceae*.

— *papyrifera* Vent., H: China, Japan, F: Bot. G.

**Buddleia**\* L., Sommer- oder Herbstflieder — *Loganiaceae*.

— *alternifolia* Maxim., H: Nordwestchina, F: Bot. G.

— *davidii* Franch. (= *B. variabilis*), H: China, F: Bot. G., Schloßberg: Jubiläumssteig, Aufgang Karmeliterplatz, vor dem Eingang zum Rosenhain, Stadtgärtnerei, Am Grabenwald, Mälzerweg, Heimgartenstraße, Bs. Ecker, Grubbauer, Kern und Thalhammer.

— *japonica* Hemsl., H: Japan, F: Bot. G.

**Buxus** L., Buchsbaum — *Buxaceae*.

— *microphylla* japonica Rehd. et Wils. (= *B. japonica*, = *B. sempervirens japonica*), H: Japan, F: Bot. G., Bs. Grubbauer.

— *sempervirens* L., Gemeiner Buchsbaum, H: Südeuropa, Westasien, Nordafrika, F: Bot. G., Stadtpark, Bs. Grubbauer. — Viele grüne und buntblättrige Formen. Bei uns fast nur als niederer Busch oder Hecke (z. B. Bergstraße) häufig.

— *arborescens* L., verträgt jeden Schnitt, so daß wir ihn buschig, als Pyramide oder Säule, in Kugelform usw. in Gärten und Anlagen finden. F: Bot. G., Stadtpark, Liebiggasse, Bs. Grubbauer.

— *argenteo-variegata* West. (= *B. sempervirens* var. *argentea*), mit weiß-bunten Blättern, F: Bs. Grubbauer und Klenert.

— *aureo-variegata* West., mit gelbbunten Blättern, F: Bs. Grubbauer.

— *handsworthii* Dallimore, F: Bs. Grubbauer und Klenert.

— *suffruticosa* L., Zwergform, der „Einfassungsbuchs“, F: in vielen Gärten (z. B. Hecke in der Bayernstraße), auf Friedhöfen, Bs. Grubbauer.

**Callicarpa** L., Schönfrucht — *Verbenaceae*.

— *dichotoma* K. Koch. (= *C. koreana*), H: Ost- und Mittelchina, Korea, F: Bot. G.

— *japonica* Thunb. H: Japan, F: Bs. Grubbauer.

— *leucocarpa* Sieb., weißfruchtig, F: Bot. G.

**Calluna** Salisb., Besenheide, Heidekraut — *Ericaceae*.

— *vulgaris* Hull. H: Europa, Kleinasien. — Viele Kulturformen, F: Bs. Kern.

**Calophaea** Fisch., Schönhülse — *Leguminosae*.

— *wolgarica* Fisch., H: südliches Rußland bis Turkestan, F: Bs. Grubbauer.

**Calycanthus** L., Gewürzstrauch — *Calycanthaceae*.

— *floridus* L., Erdbeer-Gewürzstrauch, H: südöstliche Vereinigte Staaten, F: Bot. G., Bs. Ecker und Grubbauer.

— *occidentalis* Hook. et Arn., Großblättriger Gewürzstrauch, H: Kalifornien, F: Bot. G.

**Campsis** Lour. (= *Tecoma* Juss.), Trompetenblume, Jasmin-trompete — *Bignoniaceae*.

— *grandiflora* Schum. (= *C. chinensis*, = *Tecoma chinensis*), H: China, Japan, F: Bot. G.

— *radicans* Seem. (= *Bignonia* oder *Tecoma radicans*), H: Nordamerika, F: Bot. G., äußerer Burghof, Körblergasse, Bs. Kern, Grubbauer und Thalhammer.

**Caragana** Lam., Erbsenstrauch — *Leguminosae*.

— *arborescens* Lam. H: Sibirien, Mandschurei, F: Bot. G., Stadtgärtnerei u. a.

— *pendula* Carr., F: Stadtgärtnerei, Bs. Grubbauer.

— *boissii* C. Schn. (= *C. ambigua*), H: Westchina, F: Bs. Grubbauer.

— *fruticosa* Bess., H: Amurgebiet, Korea, F: Bs. Grubbauer.

— *sinica* Rehd. (= *C. chamaagua*), H: Nordchina, F: Bs. Grubbauer.

\* Nach A. BUDDLE benannt, daher nicht *Buddleia* oder *Buddleya* (siehe auch BOERNER F., Taschenwörterbuch der botanischen Pflanzennamen, Berlin 1951 : 31).

**Carpinus L., Hain - oder Weißbuche — Betulaceae.**

- **betulus L.**, Weißbuche, **H:** Europa bis Persien, **F:** wird, da sie starken Schnitt verträgt, häufig als Hecke verwendet: Opernring, hinter Kaiser-Josef-Denkmal, Georgigasse (Park), Grasbergerstraße, u. a., Bsch. Grubbauer und Kern. — Von Formen sei erwähnt:
  - **fastigiata** Jaeg., Säulen-Hainbuche (=C. betulus *pyramidalis*, =C. betulus *columnaris*), **F:** Bsch. Thalhammer.
  - **caroliniana** Walt. (=C. *americana*), **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bsch. Grubbauer.

**Caryopteris Bge., Bartblume — Verbenaceae.**

- **clandonensis** Simmonds (=C. *incana* × *mongolica*), **F:** Bsch. Grubbauer und Kern.
- **incana** Miq. (=C. *mastacanthus*), **H:** Japan bis Nordwestchina, **F:** Bsch. Kern.

**Castanea Mill., Edelkastanie — Fagaceae.**

- **sativa** Mill., Edelkastanie (=C. *vesca*, =C. *vulgaris*), **H:** Südeuropa, Nordafrika, Westasien, **F:** Bot. G., Schloßberg (Schweizerhaus), Körblergasse 100 (Naturschutz!), Lineckerweg 50 (Naturschutz!), angepflanzt und verwildert, z. B. Plabutsch, Rosenberg, Lineck u. a., Bsch. Grubbauer und Kern.

**Catalpa Scop., Trompetenbaum — Bignoniaceae.**

- bignonioides** Walt., Gemeiner Trompetenbaum, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Stadtpark, nächst Schillerdenkmal, Krausgasse, vor dem Hotel Daniel, Thalstraße (Gösting), Bsch. Grubbauer.
- **hybrida japonica** Rehd. (=C. *japonica*; vielleicht C. *ovata* × *bignonioides*), **F:** Bsch. Kern.
- **ovata** Don., Japanischer Trompetenbaum (=C. *kaempferi*), **H:** China, **F:** Bot. G., Stadtgärtnerei, Bsch. Grubbauer.
- **speciosa** Wärder, Prächtiger Trompetenbaum, **H:** mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Stadtpark, Stadtgärtnerei.

**Ceanothus L., Säckelblume — Rhamnaceae.**

- **americanus** L., **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bsch. Klenert.

**Celastrus L., Baumwürger — Celastraceae.**

- **orbiculata** Thunb., Rundblättriger Baumwürger (=C. *orbicularis*), **H:** China, Japan, **F:** Bot. G., Stadtgärtnerei, Bsch. Grubbauer und Kern.
- **scandens** L., Gemeiner Baumwürger, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G.

**Celtis L., Zürgelbaum — Ulmaceae.**

- **australis** L., Südlicher Zürgelbaum, **H:** Südeuropa, Nordafrika, Westasien, **F:** Bot. G., Stadtpark: östlich des kleinen Rondells, Babenbergerstraße.
- **occidentalis** L., Amerikanischer Zürgelbaum, **H:** östliches und mittleres Nordamerika, **F:** Bot. G., Stadtpark.

**Cercidiphyllum S. et Z., Judasbaumblatt, Scheinjudasblatt — Cercidiphyllaceae.**

- **japonicum** S. et Z., Kadsura-Baum, Japanisches Judasbaumblatt, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Stadtpark: Wiese gegenüber Musikpavillon, Bsch. Grubbauer.

**Cercis L., Judasbaum — Leguminosae.**

- **canadensis** L., Kanadischer Judasbaum, **H:** östliches und mittleres Nordamerika, **F:** Bot. G.
- **chinensis** Bge., Chinesischer Judasbaum (=C. *japonica*), **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G.
- **siliquastrum** L., Gemeiner Judasbaum, **H:** Südeuropa, Westasien, **F:** Bot. G., Stadtpark, Joanneumgarten.

**Chaenomeles Lindl., Scheinquitten — Rosaceae.**

- **japonica** Lindl., Japanische Scheinquitten (=Ch. *maulei*, =Cydonia

*maulei*, =*Cydonia japonica*), **H:** Japan, **F:** Bot. G., Stadtpark, Schloßberg, Bsch. Ecker, Grubbauer, Kern, viele Gartenformen.

— **lagenaria** Koidz. (=*Cydonia japonica*, =*Cydonia lagenaria*), **H:** China, Japan, **F:** Bsch. Grubbauer. Auch hier viele Formen.

*Chaenomeles* unterscheidet sich von *Cydonia* durch dornige Zweige. Die verschiedenen Formen werden auch als Zierhecken gern verwendet, z. B. am Schloßberg: Herbersteingarten.

**Chimonanthus Lindl.**, Winterblüte — *Calycanthaceae*.

— **praecox** Link. (=*Calycanthus praecox*, *Meratia praecox*), **H:** China, **F:** Bot. G. (dort auch *C. praecox grandiflorus*).

**Chionanthus L.**, Schneebuche, Schneeflockenbaum — *Oleaceae*.

— **virginica** L., **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark, Bsch. Grubbauer.

**Cistus L.**, Cistrose — *Cistaceae*.

— **hirsutus** Lam., **H:** Südwesteuropa, **F:** Bsch. Kern.

**Cladrastis Raf.**, Gelbholz — *Leguminosae*.

— **lutea** K. Koch, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark: gegenüber Anastasius-Grün-Denkmal.

— **sinensis** Hemsl., **H:** Mittel- und Westchina, **F:** Bot. G.

**Clematis L.**, Waldrebe — *Ranunculaceae*.

— **alpina** Mill., Alpen-Waldrebe, **H:** Mittel- und Südeuropa bis Nordostasien, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer und Kern.

— **heracleifolia** DC. (=*C. tubulosa*), **H:** China, **F:** Bot. G.

— **jackmanii** Th. Moore (=*C. lanuginosa* x *viticella*), **F:** Bsch. Grubbauer, Kern und Thalhammer, Ecke Janzgasse und Eggenbergerallee; häufiger gepflanzte großblumige dunkelblaue Waldrebe.

— **montana rubens** Kuntze, **H:** Himalaja, Zentralchina, **F:** Bot. G., Schloßberg: Kriegerdenkmal, Weg zum Rosenhain, Jägerhaus unter dem Schöckelkreuz, Bsch. Grubbauer (dort auch *C. montana alba*).

— **paniculata** Thunb., Rispige Waldrebe, **H:** Japan, **F:** Schloßberg: Kriegerdenkmal.

— **rehderiana** Craib. (=*C. nutans*), **H:** Westchina, **F:** Bot. G.

— **serratifolia** Rehd. (=*C. koreana*), **H:** Korea, **F:** Bot. G.

— **tangutica** Korsh., **H:** Mongolei bis Nordwestchina, **F:** Am Grabenwald.

— **viticella** L., Italienische Waldrebe, **H:** Südeuropa bis Westasien, **F:** Bot. G.

**Clerodendron L.**, Losbaum — *Verbenaceae*.

— **foetidum** Bge., **H:** China, **F:** Bot. G.

— **trichotomum** Thunb. (=*C. serotinum*), **H:** Japan, Ostchina, **F:** Bot. G.

**Colutea L.**, Blasenstrauch — *Leguminosae*.

— **arborescens** L., Gemeiner Blasenstrauch, **H:** Südeuropa, Nordafrika, **F:** Bot. G., Schloßberg (Westhang), Buchkogel (Osthang), wie auch sonst in Graz nur verwildert, Bsch. Grubbauer.

— **cilicica** Boiss., **H:** Kleinasien, **F:** Bsch. Grubbauer und Ecker.

— **orientalis** Mill., **H:** Kaukasus bis Turkestan, **F:** Bot. G.

**Comptonia L'Her.**, Farngmyrte — *Myricaceae*.

— **asplenifolia** Fern., Farngmyrte — (=*C. peregrina*, =*Myrica asplenifolia* p.pte), **H:** Nordamerika, **F:** Bsch. Grubbauer.

**Cornus L.**, Hartriegel — *Cornaceae*.

— **alba** L., Tatarischer Hartriegel (=*C. tatarica*), **H:** Nordasien, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker, Klenert und Thalhammer.

— **spaethii** Wittm., **F:** Bsch. Grubbauer.

— **alternifolia** L., Wechselblättriger Hartriegel, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G.

- **amomum Mill.**, Seidenhaariger Hartriegel, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
- **florida L.**, Blumen-Hartriegel, **H:** östliches und mittleres Nordamerika, **F:** Stadtgärtnerei (Geschenk aus Montclair), Stadtpark, Schloßberg, Hilmteich, BsCh. Grubbauer.
- **kousa Buerg.**, **H:** Japan, Korea, **F:** Bot. G.
- **mas L.**, Kornelkirsche (=C. *mascula*), **H:** Mittel- und Südeuropa, Westasien, **F:** Bot. G. (und C. *macrocarpa*), Stadtpark, Johann-Fux-Gasse, Plabutsch u. a., BsCh. Ecker, Grubbauer und Kern.
- **officinalis S. et Z.**, Japanische Kornelkirsche, **H:** Japan, **F:** BsCh. Grubbauer.
- **racemosa Lam.**, Traubenzweigiger Hartriegel (=C. *candidissima*), **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
- **sanguinea L.**, Roter Hartriegel, **H:** Europa; häufig als Deckstrauch angepflanzt; verbreitet, **F:** BsCh. Grubbauer.
- **stolonifera Mehx.**, Weißer Hartriegel (=C. *alba Wangh.* nicht L.), **H:** östliches Nordamerika, **F:** Rosenberg, Lindweg 33, Eggenberg, Baiernhof (buntblättrig); Anlagen in Laßnitzhöhe.
- — **flaviramea Rehd.**, **F:** BsCh. Ecker und Thalhammer.

**Coronilla L.**, Kronwicke — Leguminosae.

- **emerus L.**, **H:** Mittel- und Südeuropa, **F:** Schloßberg: Plateau.

**Corylopsis S. et Z.**, Scheinhasel — Hamamelidaceae.

- **glabrescens Franch et Sav.**, Kahle Scheinhasel (=C. *gotoana*), **H:** Japan, **F:** Bot. G.
- **spicata S. et Z.**, Ährige Scheinhasel, **H:** Japan, **F:** Bot. G.

**Corylus L.**, Haselstrauch — Betulaceae.

- **avellana L.**, Waldhasel, **H:** Europa; viele Kultur-Fruchtsorten in den Gärten, außerdem:
- — **heterophylla Loud.** (=C. *avellana* var. *laciniata*, =C. *avellana* var. *urticaefolia*), **F:** Stadtpark, BsCh. Grubbauer (und var. *pendula*, var. *contorta*, var. *aurea*, var. *fuscorubra*).
- **colurna L.**, Baumhasel, **H:** Südosteuropa, Westasien, **F:** Bot. G., Stadtpark: gegenüber Einmündung der Zinzendorfgasse, Burggarten, BsCh. Grubbauer.
- **maxima purpurea Rehd.**, echte Bluthasel (var. *atropurpurea*), **F:** Stadtpark, in Gärten und Anlagen, BsCh. Grubbauer. Auch C. *avellana fuscocrocea Dipp.* (var. *purpurea*, var. *atropurpurea*) wird als Bluthasel bezeichnet. **F:** BsCh. Kern.
- **tibetica Batal.**, Tibethasel, **H:** China, **F:** BsCh. Grubbauer.

**Cotinus Scop.**, Perückenstrauch — Anacardiaceae.

- **coggygria Scop.**, Gemeiner Perückenstrauch (=Rhus *Cotinus*), **H:** Südeuropa bis Mittelchina, **F:** Bot. G., Rosenberg: Minoritenschlössel, Körblergasse gegen Geidorfplatz, Stadtpark, Gösting (Besitz Professor Dr. Laker), BsCh. Grubbauer und Ecker.
- — **rufifolius Boom.**, **F:** BsCh. Grubbauer.

**Cotoneaster Med.**, Zwergmispel, Steinquitte — Rosaceae.

- **acuminata Ldl.**, **H:** Himalaja, **F:** Bot. G.
- **acutifolia Turez.**, Spitzblättrige Zwergmispel (=C. *pekinensis*), **H:** Nordchina, **F:** Bot. G.
- **adpressa Bois.**, **H:** Westchina, **F:** Schloßberg: Herbersteingarten, BsCh. Kern.
- **bullata Bois.**, Runzelige Zwergmispel, **H:** Westchina, **F:** Bot. G.
- **dammeri C. Schn.** (=C. *humifusa*), **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, BsCh. Ecker und Kern.
- **dielsiana Pritz.** (=C. *applanata*), **H:** Mittel- und Westchina, **F:** Bot. G., BsCh. Grubbauer und Kern.
- **divaricata Rehd. et Wils.**, **H:** Mittel- und Westchina, **F:** BsCh. Grubbauer.
- **foveolata Rehd. et Wils.**, **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G.
- **francheti Bois.**, **H:** Westchina, **F:** Schloßberg: Herbersteingarten, BsCh. Ecker.

- **henryana Rehd. et Wils.**, **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G.
- **horizontalis Dcne.**, Niedergestreckte Zwergmispel, **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Schloßberg, Am Grabenwald, Mälzerweg, Bsch. Grubbauer, Ecker, Kern und Thalhammer.
- **integerima Med.**, Gemeine Zwergmispel (=*C. vulgaris*), **H:** Europa, Nordasien bis Altai, **F:** Burggarten.
- **lindleyi Steud.**, **H:** Nordwest-Himalaja, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **melanocarpa Lodd.**, Schwarzfrüchtige Zwergmispel (=*C. nigra*, =*C. pentagyna*), **H:** Europa bis Mittel- und Nordostasien, **F:** Bot. G.
- **microphylla Ldl.**, Kleinblättrige Zwergmispel, **H:** Himalaja, **F:** Bsch. Ecker.
- **rotundifolia lanata C. Schn.** (=*C. prostrata* var. *buxifolia*), **F:** Herberstein-garten vor dem Durchgang, Bsch. Kern.
- **salicifolia floccosa Rehd. et Wils.**, **H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer und Kern.
- **rugosa Rehd. et Wils.** (=*C. rugosa*), **H:** Mittelchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **simonsii Bak.**, **H:** Himalaja, **F:** Bsch. Ecker.

**Crataegus L.**, Weißdorn — Rosaceae.

- **altaica Lge.** (=*C. songarica*, =*C. wattiana*), **H:** Nordchina bis Turkestan, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **azarolus L.**, **H:** Südeuropa, Nordafrika, Westasien, **F:** Bsch. Klenert.
- **calpodendron Med.**, Filziger Weißdorn (=*C. tomentosa Rehd.*), **H:** Vereinigte Staaten, **F:** beim Parkhotel.
- **crus-galli L.**, Hahnensporn-Weißdorn, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
- **lavallei Herincq.** (=*C. carrierei*, =*C. crus-galli* x *pubescens*), **F:** Stadtgärt-nerei, Bsch. Grubbauer.
- **macracantha Lodd.**, Langdorniger Weißdorn, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **monogyna Jacq.**, Eingriffeliger Weißdorn, **H:** Europa, Nordafrika, Westasien, **F:** Hecken: Bergstraße. — Verbreitet.
- **nigra W. et K.**, Schwarzfrüchtiger Weißdorn, **H:** Südosteuropa, **F:** Bot. G.
- **oxyacantha L.**, Zweigriffeliger Weißdorn, **H:** Europa, Nordafrika, **F:** Bsch. Grubbauer (und var. *alba plena*). — Verbreitet.
- **paulii Rehd.**, Echter Rotdorn (=*C. monogyna* var. *rubro-plena*).
- **rubra-plena Hort.**, Rotdorn; beide letztere Arten oft gemischt, **F:** Allee bei der „Thalia“, Fröbelpark, Bsch. Grubbauer und Kern. — Häufig.
- **pentagyna W. et K.**, Füngriffeliger Weißdorn, **H:** Südosteuropa, Kaukasus, Persien, **F:** Lindweg 33.

**Cydonia Mill.**, Quitte — Rosaceae.

- **oblonga Mill.**, Gemeine Quitte (=*C. vulgaris*), **H:** Mittelasien, **F:** Bot. G., Schloßberg. — Viele Gartenformen kultiviert.

**Cytisus L.**, Geißklee — Leguminosae.

- **albus Hacq.**, Weißblühender Geißklee (=*C. leucanthus*), **H:** Ungarn, Siebenbürgen, Bulgarien, **F:** Bot. G.
- **elongatus W. et K.**, Langästiger Geißklee, **H:** Ungarn, Serbien, **F:** Bot. G.
- **praecox Bean**, Elfenbeinginstster (=*C. multiflorus* x *purgans*), **F:** Schloßberg: Herbersteingarten, Bot. G., Bsch. Kern.
- **purpureus Scop.**, Roter Geißklee, **H:** Tirol bis Norditalien, **F:** Bot. G., Mälzerweg.
- **scoparius Lk.**, Besenginster (=*Sarothamnus scoparius*), **H:** Mittel- und Südeuropa, **F:** Schloßberg: Aufgang vom Paulustor, Felsensteig links in der Schlucht, in St. Peter und Waltendorf (kieselhold!), bei Mariatrost, Bot. G., Bsch. Ecker, Grubbauer und Kern.
- **scoparius fulgens**, **F:** Bot. G.
- **sessilifolius L.**, Italienischer Geißklee, **H:** Südeuropa, Nordafrika, **F:** Bot. G.

**Daphne L., Seidelbast — Thymelaeaceae.**

- *alpina* L., Alpen-Seidelbast, **H:** Alpen, **F:** Bot. G.
- *arbuscula* Čelak., **H:** Ungarn, **F:** Bot. G.
- *blagayana* Frey, Königsblume, **H:** Gebirge Südosteuropas, **F:** Bot. G., Am Grabenwald, Mälzerweg.
- *caucasica* Pall., **H:** Kaukasus, **F:** Bot. G.
- *cneorum* L., Rosmarin-Seidelbast, Fläumiges Steinröslein, **H:** Gebirge von Spanien bis westliches Rußland, **F:** Bot. G., Schloßbergplateau, Gärtnerei Penitz in Liebenau, Am Grabenwald.
- *mezereum* L., Gemeiner Seidelbast, Kellerhals, **H:** Europa bis Kaukasus und Altai, **F:** Wälder der Umgebung Graz, z. B. Plabutsch, Rannach, Schöckel; Bot. G., Bsch. Ecker.

**Decaisnea Hook. et Thoms., Decaisnea — Lardizabalaceae.**

- *fargesii* Franch., **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Bsch. Klenert und Grubbauer.

**Deutzia Thunb., Deutzie — Saxifragaceae.**

- *gracilis* S. et Z., Zierliche Deutzie, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Schloßberg u. a., Bsch. Ecker, Grubbauer und Thalhammer.
- *lemoinei* Lemoine (=*D. parviflora* x *gracilis*), **F:** Bsch. Grubbauer. — Eine Kulturform mit vielen Sorten, die ebenfalls wieder an vielen Bastarden beteiligt ist. Lemoine hat zahlreiche Hybriden gezüchtet, die er als *discolor*-Formen verbreitet hat. Es herrscht hier ein großes Durcheinander in der Namensgebung, dessen Entwirrung allein schon eine Arbeit für sich wäre. Ähnlich verhält es sich auch mit *Philadelphus*.
- *magnifica latiflora* (=*D. crenata latiflora*, =*D. scabra* x *vilmoriniae*), **F:** Bsch. Grubbauer.
- *parviflora* Bge., **H:** Nordchina, Mandschurei, **F:** Bsch. Grubbauer.
- *scabra* Thunb. (=*D. crenata* S. et Z.), **H:** Japan, China, **F:** Bot. G., Stadtpark, Bergstraße, Bsch. Ecker, Grubbauer, Kern und Thalhammer. — Häufig.
- *vilmoriniae* Lemoine, **H:** Mittel- und Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

**Diervilla Adans., Buschgeißblatt, Weigelie, Dierville — Caprifoliaceae.**

- *rivularis* Gatt., **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bsch. Grubbauer. — Mit „Dier-villa“ bezeichnet man heute meist nur die gelb-blühenden Arten, während die andersfarbigen großblumigen Züchtungen als „Weigelia“ gehen.

**Diospyros L., Dattelpflaume — Ebenaceae.**

- *kaki* L., Kakipflaume, **H:** Japan, China, **F:** Bsch. Klenert.
- *virginiana* L., Persimone, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G.

**Dryas L., Silberwurz — Rosaceae.**

- *drummondii* Rich., **H:** arktisches Nordamerika, **F:** Bot. G.
- *octopetala* L., **H:** Europa, Asien, Nordamerika, **F:** Bot. G. u. a.
- *suendermannii* Kellerer (=*D. octopetala* x *drummondii*), **F:** Bot. G.

**Elaeagnus L., Ölweide — Elaeagnaceae.**

- *angustifolia* L., Schmalblättrige Ölweide, **H:** Mediterrangebiet bis Mittelasien, Altai und Himalaja, **F:** Bot. G., Schloßbergplateau, Kehlberg, Göstingerstraße u. a., Bsch. Kern.
- *commutata* Bernh., Silberbeere, Silber-Ölweide (=*E. argentea* Pursh.), **H:** Nordamerika, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker, Kern, Klenert und Thalhammer.
- *multiflora* Thunb., Reichblütige Ölweide (=*E. edulis*), **H:** Japan, China, **F:** Bsch. Ecker und Klenert.

**Elsholtzia Willd., Elsholtzie — Labiatae.**

- *stauntonii* Benth., **H:** Nordchina, **F:** Bot. G.

**Enkianthus Lour., Prachtglocke — Ericaceae.**

- *campanulatus* Nichols., **H:** Japan, **F:** Bot. G.

**Escallonia Mutis, Escalloniae — Saxifragaceae.**

- **hybrida, Donard Seedling** (=*E. langleyensis* x *virgata*), die Heimat der Escallonien ist Südamerika, u. zw. kommen die meisten in den Anden vor, F: Am Grabenwald.

**Eucommia Oliv. — Eucommiaceae.**

- **ulmoides Oliv., H:** Mittelchina, F: Bot. G.

**Euonymus L., Spindelbaum — Celastraceae.**

- **alata Reg.**, Geflügelter Spindelbaum, H: Japan, Mandschurei, Korea, China, F: Bs. Grubbauer.
- **fortunei carrierei Rehd.** (=*E. radicans carrierei*), F: Bs. Grubbauer.
- **latifolia Scop.**, Breitblättriger Spindelbaum, H: Südeuropa bis Westasien, F: Bot. G.
- **nana Bieb.**, Zwerg-Spindelbaum, H: Kaukasus bis Westchina, F: Bot. G. (dort auch *E. nana* var. *rosmarinifolia*).
- **radicans gracilis Rehd.** (=*E. radicans argenteo-marginata*), alle weiß- oder gelblichbunten Formen, F: Bot. G., Bs. Kern und Ecker.
- **sachalinensis Maxim.**, Flachstieler Spindelbaum (=*E. planipes*), H: Japan, F: Bs. Grubbauer.

**Evodia Forst., Evodiae — Rutaceae.**

- **daniellii Hemsl.**, H: Nordchina, Korea, F: Bot. G.

**Exochorda Ldl., Prunkspiere — Rosaceae.**

- **edgeworthii ? H: ? F: Bot. G.**
- **giraldii Hesse**, H: Nordwestchina, F: Bs. Grubbauer.
- **korolkowii Lav.**, H: Turkestan, F: Bot. G., Bs. Grubbauer.
- **macrantha C. Schn.** (=*E. racemosa* x *korolkowii*), F: Bs. Grubbauer.
- **racemosa Rehd.** (=*E. grandiflora*), H: Ostchina; F: Bot. G., Stadtgärtnerei, Schloßberggärtnerei, Joanneumspark, Hilmteichstraße 120.

**Fagus Tourn., Buche — Fagaceae.**

- **sylvatica L.**, Rotbuche, häufig als niedrige bis hohe Hecken gepflanzt.
- **asplenifolia Sweet.**, F: Sanatorium Mariagrün, Bs. Grubbauer.
- **atropunicea West.**, Echte Blutbuche, F: Stadtpark, Geidorf: Scheidtenbergergasse Nr. 7 (Naturschutz!), Mariatrosterstraße 194 (Naturschutz!), Bs. Grubbauer (dort auch var. *Swat Magret* und var. *tricolor*).
- **castaneaefolia Bean.**, F: Bs. Grubbauer.
- **fastigiata K. Koch.** (=*F. sylvatica dawyckii*), breit pyramidaler Baum, F: Bs. Grubbauer.
- **laciniata Vignet**, Schlitzblättrige Buche, F: Stadtpark: nächst Mozartdenkmal, Schubertstraße.
- **pendula Loud.**, Hänge- oder Trauerbuche, F: Stadtpark: beim Brunnen, Am Schönborng rund, Bs. Grubbauer.

**Ficus L., Feige — Moraceae.**

- **carica L.**, Feigenbaum, H: Westasien, F: Schloßberg: Herbersteingarten.

**Fontanesia Labill., Fontanesie — Oleaceae.**

- **fortunei Carr.**, H: China, F: Bot. G.

**Forsythia Vahl., Goldglöckchen — Oleaceae.**

- **europaea Deg. et Bald.**, H: Albanien, F: Bot. G., Bs. Grubbauer.
- **intermedia Zabl.** (=*F. suspensa* x *viridissima*), F: Bot. G., Bs. Grubbauer (und var. *spectabilis*, var. *vitellina*), Bs. Ecker (und var. *spectabilis*), Bs. Kern (var. *spectabilis*).
- **ovata Nakai**, H: Korea, F: Bot. G., Bs. Grubbauer.
- **suspensa Vahl**, H: China, F: Bs. Grubbauer.
- **fortunei Rehd.**, F: Bot. G., Bs. Ecker und Grubbauer.
- **sieboldii Zabl.**, F: Bs. Ecker und Grubbauer.
- **viridissima Ldl.**, H: China, F: Bot. G., Bs. Ecker und Grubbauer.

Forsythien werden in Anlagen (Schloßberg, Stadtpark) und Gärten häufig einzeln oder in Hecken und auch in Bäumchenform (z. B. Grazbachgasse, Triesterstraße) gepflanzt.

**Fraxinus L., Esche — Oleaceae.**

- **chinensis rhynchophylla Hemsl.**, Schnabel-Esche, **H:** China, Mandschurei, Korea, Japan, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **ornus L., Blumen-Esche**, **H:** Südeuropa, Westasien, **F:** Bot. G., Stadtpark: gegen Zinzendorfgasse.
- **oxycarpa Willd.**, Spitzfrüchtige Esche, **H:** Südeuropa bis Persien und Turkestan, **F:** Bot. G.
- **paxiana Lingelsh.**, **H:** China, Himalaja, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **quadrangulata Michx.**, Blau-Esche, **H:** Nördamerika, **F:** Bot. G.

**Genista L., Ginster — Leguminosae.**

- **aethnensis DC.**, Aetna-Ginster, **H:** Sizilien, Korsika, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **radiata Scop.**, Strahlen-Ginster, **H:** Südosteuropa, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
- **tinctoria L., Färber-Ginster**, **H:** Europa bis Westasien, **F:** Bsch. Kern (*G. tinctoria* fl. pl.).

**Gleditsia L., Lederhülsenbaum, Gleditschie — Leguminosae.**

- **triacanthos L.**, „Christusdorn“, **H:** mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark, Baiernstraße (Hecke), Gaisbergstraße, Bsch. Kern.

**Grewia L., Grewie — Tiliaceae.**

- **biloba parviflora Hand.-Mazz.**, **H:** Nordchina, Korea, **F:** Bot. G.

**Gymnocladus L., Schusser- oder Geweihbaum — Leguminosae.**

- **dioicus K. Koch** (=*G. dioeca*, =*G. canadensis*), **H:** mittlere und östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark: Weg von der Franck-Eiche zum Glacis, beim Blumenpavillon.

**Halimodendron Fisch., Salzstrauch — Leguminosae.**

- **argenteum Fisch.** (=*H. halodendron*), **H:** Transkaukasien bis Turkestan und Altai, **F:** Bot. G.

**Hamamelis L., Zaubernuß — Hamamelidaceae.**

- **japonica S. et Z.**, Japanische Zaubernuß, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Klenert.

- **virginiana L.**, Virginische Zaubernuß, **H:** östliches Nördamerika, **F:** Bot. G., Stadtgärtnerei, beim Schillerdenkmal (Stadtpark), Bsch. Thalhammer.

**Helianthemum Adans., Sonnenröschen — Cistaceae.**

- Zahlreiche Gartenformen vielfältigen Ursprungs, **F:** Schloßberg: Felsensteig links, Herbersteingarten u. a.

**Hibiscus L., Eibisch — Malvaceae.**

- **syriacus L.**, Syrischer Eibisch, **H:** Indien, China, **F:** Bot. G., Schloßberg: beim Türkensprung, vor dem Opernhaus, Stadtpark, Joanneums-garten, Bsch. Ecker, Kern und Thalhammer. — Zahlreiche Gartensorten mit einfachen und gefüllten Blüten.

**Hippophaë L., Sanddorn — Elaeagnaceae.**

- **rhamnoides L.**, Gemeiner Sanddorn, **H:** Europa bis Nordchina, **F:** Bot. G., Schloßberg, Göstinger-Au am Murufer (Brunner H., seit 1938), Baierdorf (Gärtnerei Oswald).
- **salicifolia D. Don.**, Weidenblättriger Sanddorn, **H:** Himalaja, **F:** Hochsteinstraße: Anna-Schloß, Schloßberg.

**Hydrangea L., Hortensie — Saxifragaceae.**

- **arborescens L.**, Baumartige Hortensie, **H:** östliche und mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker und Kern; öfters in Anlagen und Gärten.
- **cineraria sterilis Rehd.**, **H:** Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

- **heteromalla** Don., **H:** Himalaja, **F:** Bot. G.
- **paniculata** Sieb., **Rispige Hortensie**, **H:** Japan, China, **F:** Bsch. Grubbauer und Thalhammer; oft in Vorgärten.
- **petiolaris** S. et Z., **Kletter-Hortensie** (=*H. scandens*), **H:** Japan, China, **F:** Bot. G., Bsch. Kern.
- **quercifolia** Bartr., **Eichenblättrige Hortensie**, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
- **sargentiana** Rehd., **H:** Mittelchina, **F:** Bsch. Kern.

**Hypericum L.**, Johanniskraut, Hartheu — *Guttiferae*.

- **frondosum** Mchx., **H:** südliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **hircinum** L., **H:** Mittelmeergebiet, **F:** Bsch. Kern.
- **hookerianum** Wight. et Arn., **H:** Sikkim, Westchina, **F:** Bot. G.
- **moseranum** André (=*H. calycinum* x *patulum*), **F:** Bsch. Thalhammer und Ecker.
- **patulum henryi** Bean, **H:** China, **F:** Bsch. Grubbauer.

**Idesia Maxim.**, Orangenkirsche — *Flacourtiaceae*.

- **polycarpa** Maxim., **H:** SüdJapan, Mittel- und Westchina, **F:** Bot. G.

**Ilex L.**, Hülsen, Stechpalme — *Aquifoliaceae*.

- **aquifolium** L., **H:** westliches Mittel- und Südeuropa, Nordafrika, Westasien bis China, **F:** Bot. G., Ragnitztal: Marienhof, Rosenberg 38 und 59, Schönbrunnsgasse, Jakob-Dirnböck-Gasse, Bsch. Grubbauer (dort auch *I. aquifolium foxxii* und *I. aquifolium aureo-marginata*), Bsch. Kern.
- **crenata** Thunb., **H:** Japan, **F:** Bot. G.
- **pernyi** Franch., **H:** Mittel- und Westchina, **F:** Mälzerweg (Rudersdorf), Am Grabenwald.
- **verticillata** Gray., **H:** westliches Nordamerika, **F:** Bot. G.

**Indigofera L.**, Indigostrauch — *Leguminosae*.

- **gerardiana** Wall., **H:** Himalaja, **F:** Bot. G.

**Itea L.**, Rosmarinweide — *Saxifragaceae*

- **virginica** L., **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.

**Jasminum L.**, Echter Jasmin — *Oleaceae*.

- **beesianum** Forrest et Diels., **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, Am Grabenwald.
- **nudiflorum** Ldl., Winter-Jasmin, **H:** China, **F:** Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, Am Grabenwald, Bsch. Ecker, Grubbauer und Kern.
- **officinale** L., Gebräuchlicher Jasmin, **H:** Persien bis China, **F:** Bot. G.

**Juglans L.**, Walnuss — *Juglandaceae*.

- **cinerea** L., Butternuss, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark: gegen Harrachgasse.
- **nigra** L., Schwarznuss, **H:** östliche und südliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Bsch. Kern.
- **regia** L., Welsche Nuss, Edle Walnuss, **H:** Südosteuropa bis China, **F:** Bot. G., Schloßberg: Westhang, Plabutsch u. a., Bsch. Grubbauer. — Von Formen sei erwähnt:
- — **praepaturiens** Pepin, Strauchnuss (=*J. regia* var. *fertilis*), **F:** Am Grabenwald, Bsch. Grubbauer.

**Kalmia L.**, Lorbeerrose — *Ericaceae*.

- **latifolia** L., Breitblättrige Lorbeerrose, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bsch. Grubbauer.

**Kerria DC.**, Kerrie — *Rosaceae*.

- **japonica** DC., **H:** Japan, China, **F:** Bot. G. (einfach und gefüllt), Stadtpark, Schloßberg: Abgang zur Wickenburggasse (einfach), Bsch. Ecker und Thalhammer; meist in der gefüllten Form in den Gärten.

**Koelreuteria Laxm.**, Blasenbaum — Sapindaceae.

— paniculata Laxm., H: China, Korea, Japan, F: Bot. G., BsCh. Grubbauer.

**Kolkwitzia Graebn.**, Kolkwitzie — Caprifoliaceae.

— amabilis Graebn., H: China, F: Bot. G., BsCh. Grubbauer.

**Laburnocytisus C. Sch.** — Leguminosae.

— adami C. Schn., Ppropfbastard (Chimäre): *Laburnum anagyroides* x *Cytisus purpureus*, F: Bot. G.

**Laburnum Med.**, Goldregen — Leguminosae.

— alpinum Bercht. et Prsl., Alpen-Goldregen, H: Gebirge des südlichen Mittel- und Südeuropa, F: BsCh. Grubbauer.

— anagyroides Med., Gemeiner Goldregen (=*L. vulgare*), H: südliches Mittel- und Südeuropa, F: Bot. G., Schloßberg u. a., BsCh. Ecker und Kern.

— watereri Dipp. (=*L. anagyroides* x *alpinum*), F: Rudersdorf: Mälzerweg.

**Lavandula L.**, Lavendel — Labiateae.

— officinalis Chaix. (=*L. vera*, =*L. spica*), H: Südeuropa, Nordafrika, F: Bot. G.; oft in Gärten.

**Lespedeza Michx.**, Buschklee — Leguminosae.

— bicolor Turcz., H: Nordchina bis Mandschurei und Japan, F: Bot. G., BsCh. Grubbauer.

— thunbergii Nakai (=*L. sieboldii*, =*Desmodium penduliflorum*), H: China, Japan, F: Bot. G., Burggarten: Abhang gegen das Wasserbecken im Stadtpark, BsCh. Grubbauer, Ecker, Kern und Klenert.

**Ligustrum L.**, Rainweide, Liguster — Oleaceae.

— delavayanum Hariot (=*L. prattii*), H: Westchina, F: BsCh. Grubbauer.

— obtusifolium S. et Z. (=*L. ibota*), H: Japan, F: Bot. G., BsCh. Grubbauer und Klenert.

— ovalifolium Hassk., Eiblättriger Liguster, H: Japan, F: Oft als wintergrüne Hecke, z. B. Bayernstraße; BsCh. Ecker, Klenert, Grubbauer und Thalhammer.

— vulgare argenteo-variegatum West. (=*L. vulgare* var. *albovariegatum*), Blätter weiß gescheckt, H: Europa, Nordafrika, F: BsCh. Grubbauer.

— vulgare nanum Rehd. (=*L. lodense*), eine niedrige, dichte Form, F: BsCh. Ecker, Grubbauer und Kern.

— walkeri Dunc., H: Ostindien, F: BsCh. Grubbauer (immergrün).

**Lindera Thunb.**, Fieber- oder Benzoëstrauch — Lauraceae.

— benzoïn Bl., H: östliche Vereinigte Staaten, F: Bot. G.

**Liquidambar L.**, Ambergbaum — Hamamelidaceae.

— styraciflua L., H: östliche Vereinigte Staaten, F: Bot. G. (=*L. styraciflua suberosa*), Stadtpark: Ecke Elisabethstraße zur Hauptallee, BsCh. Grubbauer.

**Liriodendron L.**, Tulpenbaum — Magnoliaceae.

— tulipifera L., H: östliches Nordamerika, F: Bot. G., Stadtpark: Weg vom Anastasius-Grün-Denkmal gegen Attemsgasse, Ecke Elisabethstraße zur Hauptallee, Rosenhain, BsCh. Grubbauer.

**Lonicera L.**, Heckensirsche, Geißblatt — Caprifoliaceae.

— alseuosmoides Graebn., H: Westchina, F: BsCh. Grubbauer.

— amoena Zbl. (=*L. tatarica* x *korolkowii*), F: BsCh. Grubbauer.

— arborea Boiss., H: Spanien, Nordafrika, F: BsCh. Grubbauer.

— bella Zbl. (=*L. tatarica* x *morrowii*), F: BsCh. Ecker.

— brownii fuchsoides Rehd., F: Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, BsCh. Grubbauer und Kern.

— brownii plantierensis Rehd., F: BsCh. Grubbauer.

— caprifolium L., Jelängerjelieber, H: Europa, Westasien, F: Bot. G., Am Grabenwald (verwildert?) u. a.

- **chaetocarpa** Rehd., **H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **chrysantha** Turcz., Gelbblütige Heckenkirsche, **H:** Nordostasien, Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
- **coerulea** L., Blaufrüchtige Heckenkirsche, **H:** Mittel- und Nord-europa, Nordasien bis Japan, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **etrusca** Santi, Etrurische Heckenkirsche, **H:** Mittelmeergebiet, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **fragrantissima** Ldl. et Paxt., Duftende Heckenkirsche, **H:** Öst-china, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **glauca** Hill., Blaugrüne Heckenkirsche (=*L. dioica*), **H:** Nord-amerika, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **glaucescens** Rydb., **H:** nördliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **gracilipes** Miq., Feinstielige Heckenkirsche, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
- **henryi** Hemsl., **H:** Westchina, **F:** Bot. G.
- **korolkowii** Stapf., **H:** Turkestan, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
- **maackii** Maxim., **H:** Korea, Mandschurei, **F:** Bot. G. (var. *podocarpa*), Bsch. Grubbauer (beide).
- **maximowiczii** Reg., **H:** Korea, Mandschurei, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **nitida** Wils., **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Plabutscherstraße, Bsch. Ecker, Kern und Thalhammer.
- **notha** Zbl. (=*L. tatarica* x *ruprechtiana*), **F:** Bot. G., Bsch. Ecker.
- **orientalis caucasica** Zbl. (=*L. schmitziana*), **H:** Transkaukasien, Armenien, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **orientalis longifolia** Dipp., **H:** Kamtschatka, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **pileata** Oliv., **H:** Mittel- und Westchina, **F:** Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, Plabutscherstraße, Bsch. Ecker, Klenert und Thalhammer.
- **prolifera** Rehd. (=*L. sullivantii*), **H:** nördliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Klenert.
- **purpusii** Rehd. (=*L. fragrantissima* x *standishii*), **F:** Mälzerweg, Am Grabenwald, Bsch. Grubbauer.
- **spinosa albertii** Rehd. (=*L. alberti*), **H:** Turkestan, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker, Grubbauer und Klenert.
- **standishii** Carr., **H:** China, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **tatarica** L., Tatarische Heckenkirsche, **H:** Südrussland bis Mittelasien, **F:** lange Hecke Am Grabenwald, Bsch. Ecker, Grubbauer und Thalhammer.
- **tibetica** Bur. et Franch., Tibetische Heckenkirsche, **H:** Westchina, **F:** Bot. G.
- **xylosteum** L., Gemeine Heckenkirsche, **H:** Europa bis Altai, **F:** Bot. G., Hilmteich bis Hilmwarte, Schöckel, Bsch. Grubbauer.

**Lycium** L., Bocks dorn — Solanaceae.

- **europaeum** L., **H:** Mittelmeergebiet, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **halimifolium** Mill., Gemeiner Bocks dorn, **H:** Südosteuropa bis West-asien, **F:** Bot. G., Schloßberg: Basteimauer. — Leicht verwildernd.
- **barbarum** L., **H:** West- und Südeuropa, Vorderasien, **F:** Bot. G.

**Maclura** Nutt., Osage dorn — Moraceae.

- **aurantiaca** Nutt. (=*M. pomifera*), **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

**Magnolia** L., Magnolie — Magnoliaceae.

- **acuminata** L., Gurken-Magnolie, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Bsch. Klenert.
- **denudata** Desrousse., Yulan-Magnolie (=*M. yulan*), **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G., Stadtpark: östlich des kleinen Rondells.
- **grandiflora** L., **H:** südliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
- **kobus** Thbg., **H:** Japan (Hondo), **F:** Bot. G., Bsch. Kern.
- **obovata** Thbg., Ho - oder Rote Magnolie (=*M. hypoleuca*), **H:** Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Klenert.
- **soulangeana** Soul. (=*M. denudata* x *liliflora*), **F:** Schubertstraße, Grasberger-

straße, Stadtpark. — Unter *M. soulangeana* gehen verschiedene Kulturformen, wie z. B.

— — **lennei Rehd.**, F: Bot. G., Stadtpark: Rondell gegenüber Trauerweide (rosa Blüte).

— **stellata Maxim.**, Stern-Magnolie, H: Japan, F: Bot. G. (und var. *rosea*), Muchargasse, Bergmannsgasse, Hilmteichstraße, Joanneumgarten, BsCh. Klenert (besonders schön).

— **tripetala L.**, Schirm-Magnolie, H: südöstliche Vereinigte Staaten, F: Bot. G., Schloß Kroisbach.

**Mahoberberis C. Schn.** (= *Mahonia x Berberis*) — *Berberidaceae*.

— **neubertii C. Schn.** (= *Berberis vulgaris x Mahonia aquifolium*), F: Bot. G.

**Mahonia Nutt.**, Mahonie — *Berberidaceae*.

— **aquifolium Nutt.**, Glanzblättrige Mahonie, H: westliches Nordamerika, F: häufig angepflanzter immergrüner Strauch (für Kränze) mit vielen, auch buntblättrigen Formen; auf Friedhöfen, im Burggarten, BsCh. Ecker und Kern.

— **bealei Carr.** (= *M. japonica*), H: China, F: BsCh. Kern.

— **repens G. Don.**, Kriechende Mahonie, H: westliches Nordamerika, F: BsCh. Grubbauer.

**Malus Mill.**, Apfelbaum — *Rosaceae*.

Die Zieräpfelbäume bilden zahlreiche Bastarde, wodurch ihre Bestimmung sehr erschwert ist.

— **arnoldiana Sarg.** (= *M. floribunda x baccata*), F: BsCh. Grubbauer.

— **baccata Borkh.**, Beerentragender Apfelbaum (= *Pirus baccata*), H: Nordostasien bis Nordchina, F: Bot. G., Rosarium, BsCh. Grubbauer.

— — **mandschurica C. Schn.**, F: BsCh. Grubbauer.

— **halliana Koehne**, Hall's-Apfelbaum, H: Japan, China, F: Universität.

— **hupehensis Rehd.**, H: China, Himalaja, F: BsCh. Grubbauer.

— **micromalus Mak.**, H: Japan, F: Bot. G.

— **prunifolia Borkh.**, Pfauenblättriger Apfelbaum, H: Nordostasien, F: Bot. G.

— **pumila Mill.**, Paradies- oder Johanniss-Apfelbaum, H: Europa, Westasien, F: Bot. G. (*M. pumila pendula*), BsCh. Grubbauer.

— — **niedzwetzkyana C. Schn.**, F: BsCh. Klenert.

— **purpurea Rehd.** (= *M. pumila niedzwetzkyana x atrosanguinea*), F: Bot. G.

— — **aldenhamensis Rehd.**, F: BsCh. Ecker.

— — **lemoinei Rehd.**, F: BsCh. Grubbauer.

— — **Ökonomierat Echtermayer** (= *Excellenz Thiel x niedzwetzkyana*), F: BsCh. Kern.

— **sargentii Rehd.**, H: Japan, F: BsCh. Grubbauer.

— **scheideckeri Zbl.** (= *M. floribunda x prunifolia*), F: Bot. G., BsCh. Grubbauer und Thalhammer.

— **sieboldii Rehd.** (= *Malus toringo*, = *Pirus toringo*), H: Japan, F: Bot. G.

— **zumi Rehd.** (= *M. baccata mandshurica x sieboldii*), F: BsCh. Grubbauer.

**Menispernum L.**, Mondsame — *Menispermaceae*.

— **canadense L.**, H: östliches Nordamerika, F: Bot. G.

— **dahuricum DC.**, H: Sibirien, Mongolei, China, F: Bot. G.

**Mespilus L.**, Mispelbaum — *Rosaceae*.

— **germanica L.**, Gemeiner Mispelbaum, H: Südosteuropa (Südtirol) bis Persien, F: Bot. G., hie und da in Gärten, z. B. Körblergasse, Lindweg, Rosenberg.

**Morus L.**, Maulbeerbaum — *Moraceae*.

— **alba L.**, Weißer Maulbeerbaum, H: China, F: Bot. G., Weg vom Karmeliterkloster, Bahnstraße (Gösting), Taubstummeninstitut u. a., BsCh. Kern.

— **nigra L.**, Schwarzer Maulbeerbaum, H: Westasien, F: Bot. G., Rosenberg beim Kreuzwirt, BsCh. Kern.

**Myrica L., G a g e l s t r a u c h — Myricaceae.**

- **carolinensis Mill.** (= *M. cerifera* der meisten Gärten), **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
- **cerifera L.** W a c h s m y r t e, **H:** südwestliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Grubbauer.

**Myricaria Desv., R i s p e l s t r a u c h, U f e r h e i d e — Tamaricaceae.**

- **germanica Desv.**, D e u t s c h e R i s p e l s t r a u c h, D e u t s c h e T a m a r i s k e, **H:** Mittel- und Südeuropa, Westasien, **F:** Bot. G.

**Neillia D. Don., T r a u b e n s p i e r e — Rosaceae.**

- **affinis Hemsl.**, **H:** Westchina, **F:** Bot. G.

**Neviusia A. Gray, S c h n e e l o c k e — Rosaceae.**

- **alabamensis A. Gray**, **H:** Alabama, **F:** Bot. G.

**Osmaronia Greene, O r e g o n p f l a u m e — Rosaceae.**

- **cerasiformis Greene** (= *Nuttallia cerasiformis*), **H:** westliches Nordamerika, **F:** Bot. G.

**Ostrya Scop., H o p f e n b u c h e — Betulaceae.**

- **carpinifolia Scop.**, **H:** Südeuropa (nördlich bis Tirol, Südkärnten und Oststeiermark) ostwärts bis Kleinasien, **F:** Bot. G.

**Pachysandra Mchx. — Buxaceae.**

- **terminalis S. et Z.**, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Am Grabenwald, Mälzerweg, Bsch. Kern.

**Paeonia L., P f i n g s t r o s e — Ranunculaceae.**

- **lutea Franch.**, G e l b e P f i n g s t r o s e, **H:** China, **F:** Bot. G.
- **suffruticosa Andr.**, B a u m p à o n i e (= *P. arborea*), **H:** Nordwestchina, viele Kulturformen meist japanischer Herkunft, **F:** in Vorgärten, in Graz-St. Peter (Besitz Friedel), Am Grabenwald, Mälzerweg.

**Paliurus Mill., S t e c h d o r n, C h r i s t d o r n — Rhamnaceae.**

- **spina-christi Mill.** (= *P. australis*), **H:** Südeuropa (Südtirol) bis Himalaja und Nordchina, **F:** Bot. G.

**Parthenocissus Planch., J u n g f e r n r e b e — Vitaceae.**

- **henryana Diels et Gilg.** (= *Vitis henryana*, = *Ampelopsis henryana*), **H:** Mittelechina, **F:** Bot. G.
- **himalayana Planch.**, **H:** Himalaja, **F:** Bot. G.
- **inserta K. Fritsch.**, W i l d e r W e i n (= *P. vitacea*, *Ampelopsis quinquefolia*), **H:** Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G. und in vielen Gärten; verwildert in den Murauen südlich Graz.
- **quinquefolia Planch.**, G e m e i n e J u n g f e r n r e b e, in den Gärten meist als *P. hederacea*, **H:** nördliche Vereinigte Staaten, Ostkanada, **F:** Schloßberg: Basteimauer, Schloßbergplatz am Stiegengeländer, Bsch. Grubbauer.
- **engelmannii Rehd.**, S e l b s t k l e t t e r n d e J u n g f e r n r e b e (= *Ampelopsis engelmannii*), **F:** Bsch. Grubbauer und Thalhammer.
- **muronorum Rehd.** (= *Parthenocissus* und *Ampelopsis radicantissima*, = *Ampelopsis hederacea*, = *Ampelopsis muralis*), **F:** Bot. G.
- **tricuspidata veitchii Rehd.**, wird als Jugendform von *P. tricuspidata* angesehen. **H:** Japan, Mittelechina, **F:** Ecke Leechgasse—Lenaugasse, Alte Poststraße (Eckert), Schubertstraße, Bleistiftfabrik Gösting u. a., Bsch. Grubbauer und Klenert.

**Paulownia S. et Z., P a u l o w n i e, B l a u g l o c k e n b a u m — Scrophulariaceae.**

- **tomentosa Steud.**, K ä i s e r - P a u l o w n i e, **H:** China, **F:** Ecke Rosarium—Hamerlinggasse, Körblergasse 76, Stadtgärtnerei, Augarten: drei Bäumchen beim Musikpavillon, Stadtpark: beim Musikpavillon, Café Rosenhain.

**Periploca L.**, Baum schlinge — *Asclepiadaceae*.

— **graeca L.**, H: Südeuropa, Westasien, F: Bot. G., Bsch. Grubbauer.

**Pernettya Gaudich.**, Torfmyrte — *Ericaceae*.

— **mucronata Gaud.**, Stachel spitze Torfmyrte, H: Chile bis Feuerland, F: Bsch. Kern.

**Perowskia Karel.**, Perowskie — *Labiatae*.

— **atriplicifolia Benth.**, Meldenlaubige Perowskie, H: Tibet und Westimalaja bis Transkaspien, F: Bot. G.

**Petteria Presl.**, Petterie — *Leguminosae*.

— **ramentacea Presl.**, H: Istrien bis Albanien, F: Bot. G.

**Phellodendron Rupr.**, Korkbaum — *Rutaceae*.

— **japonicum Maxim.**, H: Mitteljapan, F: Bot. G.

**Philadelphus L.**, Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin — *Saxifragaceae*.

— **congestus Rehd.**, (=P. verrucosus x laxus), F: Bsch. Grubbauer.

— **coronarius L.**, Gemeiner Pfeifenstrauch (=P. pallidus). — An vielen schwer zu unterscheidenden Hybriden beteiligt. H: Italien bis Kaukasus, F: Bot. G., Stadtpark, Gösting: Jungfernsprung, Reliktstandort! Bsch. Ecker, Grubbauer und Thalhammer. — Häufig und verbreitet.

— **falconeri Sarg.**, (=P. coronarius x laxus?), F: Bsch. Grubbauer.

— **floribundus Schrad.**, Blütenreicher Pfeifenstrauch (=P. coronarius x gordonianus), F: Bsch. Grubbauer, Stadtgärtnerei.

— **lemoinei Lem.**, (=P. microphyllus x coronarius), mehrere Gartenformen (auch solche anderen Ursprungs gehen unter diesem Namen), F: Bot. G., Stadtgärtnerei, Bsch. Ecker, Grubbauer, Kern, Leodolter und Thalhammer.

— **microphyllus Gray.**, Kleinblättriger Pfeifenstrauch, H: südwestliche Vereinigte Staaten, F: Bot. G.

— **polyanthus Rehd.**, (=P. lemoinei x insignis?), F: Bsch. Grubbauer (P. polyanthus Pavillon blanc).

— **pubescens Lois.**, Weichhaariger Pfeifenstrauch (=P. latifolius), H: Tennessee bis Alabama, F: Bot. G., Bsch. Ecker.

— **purpureo-maculatus Lem.**, (=P. lemoinei x coulteri), F: Bsch. Grubbauer (P. purpureo-maculatus Belle Etoile).

— **tomentosus Wall.**, Filziger Pfeifenstrauch, H: Himalaja, F: Bsch. Grubbauer.

— **virginialis Rehd.**, (=P. lemoinei x nivalis plenus? = P. lemoinei Virginal), F: Bot. G., Stadtgärtnerei, Bsch. Kern.

**Physocarpus Maxim.**, Blasenspiere, Blasenfrucht — *Rosaceae*.

— **amurensis Maxim.**, Amur-Blasenspiere, H: Mandschurei, Korea, F: Stadtgärtnerei.

— **capitatus Kuntze**, Weichhaarige Blasenspiere (Spiraea oder Neilia capitata), H: westliche Vereinigte Staaten, F: Bot. G.

— **opulifolius Maxim.**, Schneeballblättrige Blasenspiere, H: östliches Nordamerika, F: Bot. G., Leechwald, Bsch. Ecker. — Sonst als Hecke häufig gezogen.

**Pieris D. Don.** (=Andromeda), Lavendelheide, Kienporst — *Ericaceae*.

— **japonica D. Don.**, Japanische Lavendelheide, H: Japan, F: Bsch. Klenert.

**Pyrus L.** (=Pirus), Birnbaum — *Rosaceae*.

— **amygdaliformis Vill.**, Mandelblättriger Birnbaum, H: Südeuropa, Westasien, F: Bsch. Grubbauer.

— **salicifolia Pall.**, Weidenblättriger Birnbaum, H: Südosteuropa, Westasien, F: Opernring.

— **ussuriensis Maxim.**, H: Nordostasien, F: Bsch. Grubbauer.

**Platanus L.**, Platane — *Platanaceae*.

— **acerifolia Willd.**, (=P. occidentalis x orientalis), die am meisten gepflanzte

**Platane, F:** Stadtpark, Eggenbergerallee und Schloßpark, Bsch. Grubbauer.

— **orientalis L., Morgenländische Platane, H:** Südosteuropa bis Westasien, F: Stadtpark, Mariatrosterstraße 194 (zwei Exemplare — Natur-schutz!), Bsch. Grubbauer.

**Polygonum L., Knöterich — Polygonaceae.**

— **aubertii L. Henry, H:** Westchina, F: Bot. G., Schönaugasse (vor einem Gast-haus in Holzgefäßen), Schloßberg: Garten unter dem Uhrturm, Bsch. Kern und Ecker.

— **baldschuanicum Reg., H:** Bucharei, F: Schloßbergkai, Resselgasse u. a., Bsch. Ecker und Grubbauer.

**Poncirus Raf. (=Citrus), Zitrone — Rutaceae.**

— **trifoliata Raf., Dreiläufige Zitrone oder Agrume (=Citrus trifoliata = C. triptera), H:** Japan, Korea, Nordchina, F: Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, Grasbergerstraße.

**Populus L., Pappel — Salicaceae.**

— **alba nivea Ait., Silber- oder Weißpappel, Jugendform von P. alba, H:** Mittel- und Südeuropa bis Mittelasien, F: Stadtpark: Nähe des Hamer-lingdenkmals.

— **canadensis Moench., Kanadische Pappel (=P. deltoides x nigra), F:** Bsch. Klenert.

— **candidans Ait., Ontario-Pappel, H:** Ursprung unbekannt, F: Bot. G.

— **koreana Rehd., H:** Korea, F: Bsch. Grubbauer.

— **lasiocarpa Oliv., H:** Mittel- und Westchina, F: Bsch. Grubbauer und Klenert.

— **nigra L., Schwarzpappel, H:** Europa, Westasien, F: Stadtpark, Schloßberg, Augarten, Eggenberger Schloßpark u. a., Bsch. Grubbauer.

— — **italica Muenchh., Pyramiden-Pappel (=P. pyramidalis, =P. fastigiata), H:** wahrscheinlich Mittelasien, F: Paulustorgasse, Stadtpark: Nähe des Anastasius-Grün-Denkmales, Schanzelgasse, Eggenberger Stadion u. a., Bsch. Grubbauer und Kern.

— **simonii Carr., Chinesische Pappel, H:** Nordchina, F: Bsch. Grubbauer.

— **fastigiata C. Schn., F:** Bsch. Grubbauer.

— **szechuanica C. Schn., H:** Westchina, F: Bsch. Grubbauer.

— **tacamahaca Mill., Balsam-Pappel (=P. balsamifera), H:** Labrador bis Alaska und nördliche Vereinigte Staaten, F: Bsch. Grubbauer.

**Potentilla L., Fingerkraut, Fingerstrauch — Rosaceae.**

— **fruticosa L., Gemeines Fingerkraut, H:** nördliche Halbkugel, F: Bot. G., Schloßberg, Stadtgärtnerei u. a., Bsch. Ecker und Thalhammer.

— — **farreri Besant, H:** Nordwestchina, F: Bot. G., Bsch. Kern.

**Prinsepia Royle — Rosaceae.**

— **uniflora Batal., H:** Nordwestchina, F: Bot. G.

**Prunus L., Kirsch-, Mandel-, Pfirsich-, Pflaumenbaum — Rosaceae.**

Von den Zierkirschen gibt es viele Formen (besonders von P. serrulata) mit einfachen und gefüllten Blüten.

— **amygdalus Batsch., Echte Mandel (=Amygdalus communis), H:** Vorder-asien, Nordafrika, F: Bot. G., Schloßberg: Terrasse unter Kanonenbastei.

— **blireana André (=P. cerasifera x mume), F:** Bsch. Grubbauer.

— **canescens Bois., H:** Mittel- und Westchina, F: Bsch. Grubbauer.

— **cerasifera atropurpurea Jaeg., Blutpfirsiche (=P. cerasifera var. pis-sardii), F:** Schloßberg: Herbersteingarten, ober dem Krebsenkeller u. a., Bsch. Grubbauer.

— — **woodii Spaeth, F:** Stadtgärtnerei, Hecke im Urnenhain des Kremato-riums, Bsch. Grubbauer.

— **cerasus L., Sauerkirsche, H:** Südosteuropa und Westasien, viele For-men, F: Bot. G.

— **glandulosa Thunb., Drüsenzähnige Kirsche (=P. japonica), H:** Mit-tel- und Nordchina, Japan, F: Bot. G., Bsch. Ecker, Grubbauer und Kern.

— **incisa Thunb., H:** Japan, F: Bsch. Grubbauer.

- **japonica** Thunb., **H:** Mittelchina, Ostasien, **F:** Bot. G., BsCh. Grubbauer und Thalhammer.
- **nipponica kuriensis** Wils., **H:** Yezo, Kurilen, Sachalin, Nord-Hondo, **F:** BsCh. Grubbauer.
- **laurocerasus caucasica** Zbl., Kirschchlorbeer, **H:** Südosteuropa bis Kaukasus, **F:** BsCh. Klenert.
- — **schipkaensis** Zbl., Balkan-Kirschchlorbeer, **H:** Bulgarien, **F:** BsCh. Klenert, Am Grabenwald.
- **maximowiczii** Rupr., **H:** Mandschurei, Korea, Japan, **F:** Bot. G.
- **padus** L., Gemeine Traubenkirsche, **H:** Europa, Nordasien bis Korea und Japan, **F:** Schloßberg, Bergstraße u. a.
- **pumila** L., Sandkirsche, **H:** nordöstliche Vereinigte Staaten, **F:** BsCh. Grubbauer.
- **salicina** Ldl., **H:** China, **F:** BsCh. Grubbauer.
- **sargentii** Rehd. (=P. serrulata sachalinensis), **H:** Japan, Sachalin, **F:** Bot. G.
- **serrulata** Ldl., Japanische Kirsche, **H:** Japan, China, Korea. — Viele Formen meist japanischer Herkunft:
  - **lannesiana** Rehd., **F:** Bot. G., Rosenhain, Schloßberg: Herbersteingarten, Allee vom Franzosenkreuz zum Uhrturm, Joanneumgarten, Zentralfriedhof, BsCh. Grubbauer, Ecker und Thalhammer.
  - **spinosa purpurea** André, Schlehdorn, **F:** BsCh. Grubbauer.
  - **subhirtella** Miq., **H:** Japan, **F:** BsCh. Grubbauer (auch f. autumnalis und plena).
  - **tenella** Batsch., Zwergmandel, **H:** östliches Mitteleuropa bis Ostsibirien, **F:** BsCh. Grubbauer.
  - **tomentosa** Thunb., **H:** China, Japan, Himalaja, **F:** BsCh. Grubbauer.
  - **triloba** Ldl., Chinesische Mandelaprikose, Mandelbäumchen, **H:** China, **F:** Bot. G., Stadtpark mehrfach, BsCh. Ecker, BsCh. Grubbauer (meist in der gefüllten Form: P. triloba multiplex).
  - **virginiana** L., Virginische Traubenkirsche, **H:** östliches und mittleres Nordamerika, **F:** Bot. G.

**Ptelea** L., Hopfenstrauch — Rutaceae.

- **trifoliata** L., **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Gartengasse (Liebenau), Stadtgärtnerei, BsCh. Ecker und Grubbauer.

**Pterocarya** Kunth, Flügelnuß — Juglandaceae.

- **fraxinifolia** Spach., **H:** Kaukasus bis Nordpersien, **F:** Bot. G., Stadtpark: Wiese in der Nähe des Franck-Denkmales, Schloß Klingensteine, BsCh. Grubbauer.

**Pyracantha** Roem., Feuerdorn — Rosaceae.

- **angustifolia** C. Schn., **H:** Südwestchina, **F:** Bot. G.
- **coccinea** Roem., **H:** Italien bis Westasien, **F:** Bot. G., Stadtparkbrunnen, Schloßberg unter dem Uhrturm, BsCh. Grubbauer (und P. coccinea f. Kasan), BsCh. Kern.
- **crenulata** Roem., **H:** Himalaja, **F:** Bot. G., BsCh. Grubbauer (P. crenulata rogersiana).

**Quercus** L., Eiche — Fagaceae.

- **alba** L., Weißeiche, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
- **bicolor** Willd., **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G.
- **borealis maxima** Ashe. (=Q. rubra Du Roi), dies ist die in den Baumschulen übliche Roteiche! **H:** östliches Nordamerika, **F:** Stadtpark: Weg vom Wetterhäuschen zur Einspinnergasse, Schloß Hart bei Thal, BsCh. Grubbauer und Klenert. — Auch sonst nicht selten kultiviert.
- **castaneaefolia** C. A. Mey., Kastanienblättrige Eiche, **H:** Kaukasien, Persien **F:** Bot. G.
- **dentata** Thunb., Kaiser-Eiche, **H:** Japan, Korea, China, **F:** Rosenberg, Minoritenschlößl.
- **falcata** Mchx., Spanische Eiche (=Q. rubra L.), **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.

- **leana Nutt.** (=*Q. imbricaria* x *velutina*), **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
- **libani Oliv.**, Libanon-Eiche, **H:** Syrien, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **macrocarpa Mchx.**, Kletten-Eiche, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G.
- **palustris L.**, Sumpf-Eiche, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., vor dem chemischen Institut der Universität, Rosenberg, Mariagrün, Bsch. Grubbauer.
- **petraea Liebl.**, Traubен-, Stein- oder Winter-Eiche (=*Q. sessilis*, =*Q. sessiliflora*), **H:** Europa, Westasien, **F:** Lindweg 33. — Verbreitet (z. B. Schöckel).
- **pontica K. Koch**, **H:** Armenien, Kaukasus, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **robur L.**, Sommer- oder Stiel-Eiche, **H:** Europa, Nordafrika, Westasien, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer. — Verbreitet (z. B. Schöckel).
- **fastigiata Schwarz**, Pyramiden-Eiche, **F:** Stadtpark, Leonhardstraße 58 (Naturschutz!).
- **pectinata K. Koch**, **F:** Bsch. Ecker.
- **velutina Lam.**, Färber- oder Schwarz-Eiche (=*Q. tinctoria*), **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.

**Rhamnus L.**, Kreuzdorn, Faulbaum — *Rhamnaceae*.

- **cathartica L.**, Gemeiner Kreuzdorn, **H:** Europa, West- und Nordasien, **F:** Bot. G. — Verbreitet.
- **crenata S. et Z.**, **H:** Japan, Korea bis Mittelchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **saxatilis Jacq.**, Felsen-Kreuzdorn, **H:** Mittel-, Süd- und Südosteuropa, **F:** Bot. G.

**Rhododendron L.**, Alpenrose, Azalee — *Ericaceae*.

Ungefähr tausend Arten mit Hunderten von Kreuzungen, die z. T. in Vorgärten und Gärten der Stadt zu finden sind. Ich führe hier nur drei Arten an, die meist unter falschem Namen gehen, aber an vielen Kreuzungen beteiligt sind, beziehungsweise als Unterlage für Veredlungen verwendet werden.

- **catawbiense Mchx.**, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Bsch. Kern.
- **flavum G. Don.**, Pontische Azalee (=*R. luteum*, nicht *Azalea lutea L.*, =*A. pontica L.*, aber nicht *R. ponticum L.*), **H:** Kleinasien, Kaukasus, Osteuropa, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **ponticum L.**, **H:** Kleinasien, Balkan, Spanien, Portugal, **F:** Bsch. Klenert.

**Rhodotypos S. et Z.**, Scheinkerrie — *Rosaceae*.

- **scandens Mak.** (=*R. kerrioides*), **H:** Japan, Mittelchina, **F:** Bot. G., Schloßberg, Göstingerstraße, Bsch. Ecker, Grubbauer (einfach und gefüllt).

**Rhus L.**, Sumach — *Anacardiaceae*.

- **chinensis Mill.**, **H:** China, Japan, **F:** Bot. G.
- **copallina L.**, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
- **radicans L.**, Gift- oder Efeu-Sumach, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
- **toxicodendron L.**, Gift-Sumach, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
- **typhina L.**, Essigbaum, Hirschkolben-Sumach, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Schloßberg: vom Starckehäuschen westwärts, Stadtgärtnerei, Stadtpark u. a., Bsch. Ecker, Grubbauer und Thalhammer.
- **dissecta Rehd.** (=*R. typhina laciniata Manning*), **F:** Bsch. Ecker und Grubbauer.
- **laciniata Wood**, **F:** am Schloßberg, beim Sockel des ehemaligen Sendemastes.
- **verniciflua Stokes**, Firnis- oder Lackbaum, **H:** Japan, China, Himalaja, **F:** Bot. G.

**Ribes L.**, Johannisbeere, Ribisel, Stachelbeere — *Saxifragaceae*.

- **alpinum L.**, Alpen-Johannisbeere, **H:** Europa bis Kaukasus, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker und Thalhammer.
- **americanum Mill.**, Amerikanische Johannisbeere (=*R. floridum*), **H:** östliche und mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.

- **aureum** Pursh., Goldtraube, **H:** Mittel- und Westamerika, **F:** Bot. G., Stadtpark (mehrfach), Schloß St. Martin, Bsch. Ecker.
  - **fasciculatum** S. et Z., Büschel-Johannisbeere, **H:** Japan, Korea, **F:** Bot. G.
  - **glaciale** Wall., **H:** Nepal bis China, **F:** Bot. G.
  - **glutinosum** Benth., **H:** Kalifornien, **F:** hinter der Universität.
  - **sanguineum** Pursh., Blutrote Johannisbeere, echt wohl nicht in Kultur, aber in verschiedenen Formen, **H:** Britisch-Kolumbien bis Kalifornien, **F:** Bot. G., Johann-Fux-Gasse, Bsch. Ecker, Kern und Thalhammer.
- Robinia** L., Robinie, Falsche Akazie, Schotendorn — Leguminosae.
- **hispida** L., Borstige Robinie, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Rosarium, Joanneumgarten, Stadtgärtnerei, Bsch. Grubbauer.
  - **luxurians** C. Schn., **H:** Kolorado bis Neumexiko, Arizona und Utah, **F:** Bsch. Grubbauer.
  - **pseudacacia** L., Gemeine Robinie, **H:** östliche und mittlere Vereinigte Staaten, in Europa häufig verwildert (z. B. Plabutsch, Roseggerweg), **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer. — Sehr formenreiche Art:
  - — **decaisneana** Carr., **F:** Bsch. Grubbauer.
  - — **monophylla** Carr. (=R. pseudacacia unifoliola), **H:** östliche und mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Bsch. Klenert.
  - — **umbraculifera** DC., Kugelakazie, **F:** vor der Elisabethinenkirche, Eckertstraße.
  - **viscosa** Vent., Klebrige Robinie, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Am Grabenwald, Bsch. Klenert.

**Rosa** L., Rose — Rosaceae.

Da es über 200 Arten (sog. Wildrosen) und Zehntausende von Gartenformen gibt, habe ich mich auf die Aufzählung einiger Wildrosen beschränkt. Viele Gartenformen sind nicht winterhart, gehören daher nicht hieher.

- **alba** L., Weiße Rose, Herkunft unbekannt, **F:** Bot. G.
- **banksiae** Ait., **H:** China, **F:** Bot. G.
- **blanda** Ait., Virginische Rose, **H:** nördliche Vereinigte Staaten, Kanada, **F:** Bot. G.
- **centifolia** L., Zentifolie, Kohlrose, **H:** Ostkaukasus, **F:** Schloßberg: Schweizerhaus, Türkengarten.
- **chinensis** Jacq., China- oder Bengal-Rose, hieher gehören die „Miniaturorosen“, wie R. rouletti Corr., **H:** China, **F:** Bot. G.
- **damascena** Mill., Damaszener-Rose, **H:** Kleinasien, **F:** Bot. G.
- **foetida bicolor** Willm., Kapuziner-Rose (=R. lutea bicolor), **H:** Westasien, **F:** Grasbergerstraße, Bsch. Grubbauer.
- **hugonis** Hemsl., **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
- **moyesii** Hemsl. et Wils., **H:** Nordchina, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
- **multiflora** Thunb., Büschel-Rose, **H:** Japan und China, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
- **omeiensis** Rolfe, **H:** Westchina, **F:** Bot. G.
- **rubrifolia** Vill., Rotblättrige Rose, **H:** Gebirge Mittel- und Südeuropas, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
- **rugosa** Thunb., Japanische Apfel- oder Runzel-Rose, Kartoffel-Rose, **H:** Nordchina, Korea, Japan, **F:** Bot. G., Schloßberg: Felsensteig, Rosenberg: Minoriten Schlössl, Harterstraße (Klusemannsiedlung), Bsch. Thalhammer (auch R. rugosa alba).
- **setigera** Mchx., Prärie-Rose, **H:** Nordamerika, **F:** Bot. G.
- **spinosissima** L., Bibernell-Rose (=R. pimpinellifolia), **H:** Europa, Westasien, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
- **virginiana** Mill., Glänzende Rose (=R. lucida), **H:** östliche Vereinigte Staaten und östliches Kanada, **F:** Bot. G.
- **wichuraiana** Crép., Hiawatha-, Wichuras-Rose, **H:** Japan, Korea, Formosa, Ostchina, **F:** Grasbergerstraße, Am Grabenwald.

**Rubus L., Brombeere, Himbeere — Rosaceae.**

- *amabilis* Focke, H: Westchina, F: Bot. G.
- *henryi* Hemsl., H: Mittel- und Westchina, F: Bot. G.
- *laciniatus* Willd., Schlitzblättrige Brombeere, Herkunft unsicher, F: Bot. G.
- *occidentalis* L., Abendländische Himbeere, H: östliche und mittlere Vereinigte Staaten, F: Bot. G.
- *odoratus* L., Wohlriechende Himbeere, H: östliches Nordamerika, F: Bot. G., Am Grabenwald, Auersperggasse, Bs. Ecker.
- *phoenicolasius* Maxim., Japanische Weinbeere, H: Japan, Korea, Nordchina, F: Plabutscherstraße, Mälzerweg (Rudersdorf), Auersperggasse, Bs. Ecker; öfters in Gärten.
- *tibitanus* Franch., H: Westchina, F: Bs. Grubbauer.

**Ruscus L., Mäusedorn — Liliaceae.**

- *aculeatus* L., Stechender Mäusedorn, H: West-, Süd- und Südost-europa, Vorderasien bis Persien, Nordafrika, F: Schloßberg: Felsensteig.

**Salix L., Weide — Salicaceae.**

- *alba tristis* Gaud., Trauer-Dotterweide (= *S. alba vitellina* f. *pendula*), F: Stadtpark, Hilteich, Schanzelgasse, Leechgasse, Göstingerstraße, Eggenthaler Schloßpark u. a., Bs. Kern, Klenert, Grubbauer und Thalhammer.
- *angustifolia* Willd., Schmal-Weide, H: Kaukasus bis Ostasien, F: Bs. Grubbauer.
- *babylonica* L., Trauer-Weide, H: China, F: Hochsteinstraße: Anna-Schloß.
- *bebbiana* Sarg., H: nördliche Vereinigte Staaten und Südkanada, F: Bs. Grubbauer.
- *gracilistyla* Miq., H: Japan, Korea, F: Bot. G.
- *herbacea* L., Kraut-Weide, H: europäische Hochgebirge, nördliches und arktisches Europa, Nordasien, arktisches und boreales Nordamerika, F: Bot. G.
- *irrorata* Anderss., H: westliche Vereinigte Staaten, F: Bs. Grubbauer.
- *matsudana tortuosa* C. Schn., H: Transbaikalien, Nordchina, Mandschurei, Korea, F: Bs. Grubbauer.
- *pentandra* L., Lorbeer-Weide, H: Europa bis Kaukasus, F: Bot. G.
- *phylicifolia* L., Zweiarbige Weide (= *S. bicolor*), H: Europa bis Nord-ostasien, F: Bs. Grubbauer.
- *reticulata* L., Netz-Weide, H: europäisches Gebirge, Nordasien, arktisches Nordamerika, F: Bot. G.
- *retusa* L., Stutz-Weide, H: europäische Gebirge, Altai, F: Bot. G.

**Sambucus L., Holunder — Caprifoliaceae.**

- *canadensis* L., Kanadischer Holunder, H: östliche Vereinigte Staaten, Südost-Kanada, F: Bs. Ecker und Grubbauer.
- *coerulea* Raf., H: westliches Nordamerika, F: Bs. Grubbauer.
- *nigra albo-variegata* West. (= *S. nigra argentei-marginata*), F: Bs. Grubbauer.
- *nigra laciniata* L., Zerschlitzblättriger Holunder, F: Am Grabenwald, Bs. Ecker und Grubbauer.

**Santolina L., Heiligenblume — Compositae.**

- *chamaecyparissus* L., H: Südeuropa, F: Bot. G., Am Grabenwald, Schloßberg.
- *viridis* Willd., (= *S. virens* Mill.), H: Südeuropa, F: Am Grabenwald, Schloßberg.

**Sarcococca Ldl., Schleimbeere — Buxaceae.**

- *hookerana humilis* Rehd. et Wils., H: Westchina, F: Bs. Grubbauer.

**Securinega Juss., Hartholz — Euphorbiaceae.**

- *suffruticosa* Rehd. (= *S. ramiflora*), H: Nordostasien bis Mittelchina, F: Bot. G.

**Sibiraea Maxim., Blauspiere — Rosaceae.**

- *laevigata* Maxim., H: Sibirien, F: Bot. G., Schloßberg (Wiednerplatzl).

**Smilax L., Stechwinde — Liliaceae.**

— *aspera* L., H: Südeuropa bis Indien (Macchien), F: Bot. G., BsCh. Grubbauer.

**Sophora L., Schnurbauern — Leguminosae.**

— *japonica* L., Japanischer Schnurbauern, H: China, Korea, F: Bot. G.,  
Stadtpark: Ecke Parkstraße—Geidorfplatz, Am Eisernen Tor, Neutor-  
gasse, Radetzkystraße, Oeverseegasse, Lendplatz, Theodor-Körner-  
Straße, BsCh. Grubbauer (auch *S. japonica pendula*) und Thalhammer.

**Sorbaria Ser., Fiederspiere — Rosaceae.**

— *itchisonii* Hemsl. (=*S. angustifolia*), H: Afghanistan, Kaschmir, F: BsCh.  
Grubbauer.

— *arborea* C. Schn., H: Mittel- und Westchina, F: BsCh. Grubbauer.

— *sorbifolia* A. Br., Ebereschen-Fiederspiere (=*Spiraea sorbifolia*),  
H: Nordasien, F: Bot. G.

— *tomentosa* Rehd. (=*Spiraea Lindleyana*, *Sorbaria Lindleyana*), H: Himalaja,  
F: Bot. G.

**Sorbus L., Eberesche — Rosaceae.**

— *aucuparia* L., Gemeine Eberesche, Vogelbeerbaum, H: Europa  
bis Westasien und Sibirien, F: verbreitet; mit wertvollen Formen, wie  
— — *edulis* Dieck, Mährische Eberesche (eßbar!), (=*S. aucuparia*  
*moravica*), F: Bot. G., BsCh. Kern und Grubbauer (dort auch *S. aucuparia*  
*intermedia*, — — *pendula*, — — *prattii*).

— *hybrida* L., Bastard-Mehlbeerbaum (=*S. aucuparia x intermedia*),  
H: Skandinavien, F: Ecke Alberstraße—Lessingstraße.

— *intermedia* Pers., Schwedischer Mehlbeerbaum, H: Nordeuropa,  
F: Leonhardstraße gegenüber Parkhotel, Weingarten oberhalb Schloß  
St. Martin, Bot. G., BsCh. Grubbauer.

— *prattii* Koehne, H: Westchina, F: BsCh. Grubbauer.

— *vilmorinii* C. Schn., H: Himalaja, F: Bot. G.

**Spartium L., Pfriemen — Leguminosae.**

— *junceum* L., Binsenpfriemen, H: Macchien des Mittelmeergebietes,  
F: Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, Joanneumgarten.

**Spiraea L., Spierstrauch — Rosaceae.**

— *albiflora* Zbl., Weißer Spierstrauch, H: Japan, F: Bot. G., Stadt-  
gärtnerei, BsCh. Ecker.

— *arguta* Zbl., Spitzblättriger Spierstrauch (=*S. multiflora* x  
*thunbergii*), F: Stadtpark, BsCh. Ecker, Grubbauer, Kern und Thal-  
hammer.

— *billiardii* Herincq. (=*S. douglasii* x *salicifolia*), F: BsCh. Ecker.

— *blanda* Zbl., Niedlicher Spierstrauch (=*S. chinensis* x *cantonien-  
sis*), F: BsCh. Grubbauer.

— *bullata* Maxim., Runzeliger Spierstrauch, H: Japan, F: Bot. G.,  
BsCh. Grubbauer.

— *bumalda* Burv. (=*S. albiflora* x *japonica*, =*S. pumila*, =*S. japonica* var.  
*Bumalda*), Typ nicht in Kultur, meist die f. „Anthony Waterer“, F: Bot. G.  
(dort auch *S. bumalda crispa*), Stadtgärtnerei, Stadtpark, Georgigasse  
(Grünanlage mit Hecke), BsCh. Ecker, Grubbauer, Kern und Thalhammer.

— — *pruhoniciana* Rehd. (=*S. japonica ovalifolia* x „Anthony Waterer“),  
F: BsCh. Grubbauer.

— *canescens* D. Don., Weißgrauer Spierstrauch, H: Himalaja,  
F: Bot. G.

— *cantoniensis* Lour., Kanton-Spierstrauch, H: China, Japan, F: Bot. G.,  
BsCh. Grubbauer.

— *chamaedryfolia* L., Gamander-Spierstrauch (=*S. flexuosa*), H: Süd-  
osteuropa bis Nordostasien, F: Bot. G., nicht selten als Hecken gezogen.

— — *ulmifolia* Maxim. (=*S. ulmifolia*), F: Bot. G.; nicht selten kultiviert.

— *douglasii* Hook., Douglas-Spierstrauch, H: westliches Nordamerika,  
F: Bot. G., Am Grabenwald, BsCh. Ecker.

— *fontenaysii* Billiard (=*S. canescens* x *salicifolia*), F: BsCh. Ecker.

- **japonica** L. f., Japanischer Spierstrauch, **H:** Japan, **F:** Bot. G.  
(*S. japonica ovalifolia*).
- **latifolia** Borkh., Breitblättriger Spierstrauch, **H:** Nordostamerika, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **menziesii** Hook., **H:** Nordwestamerika, **F:** Mühlriegel, Tegetthoffplatz.
- **mollifolia** Rehd., **H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **nipponica** Maxim., **H:** Japan, **F:** Bot. G.
- **prunifolia plena** C. Schn., Pfauenblättriger Spierstrauch,  
**H:** China, Korea, Formosa, **F:** Stadtpark, Stadtgärtnerei u. a., Bsch. Ecker, Grubbauer und Thalhammer.
- **rubra** Zbl., Roter Spierstrauch (=*S. fastigiata x douglasii*), **F:** Bsch. Grubbauer.
- **salicifolia** L., Weidenblättriger Spierstrauch, **H:** Südosteuropa bis Nordostasien und Japan, **F:** Bot. G. — Sonst kultiviert.
- **superba** Zbl., Pracht-Spierstrauch (=*S. albiflora x corymbosa*), **F:** Bsch. Ecker.
- **thunbergii** Sieb., Thunbergs-Spierstrauch, **H:** China, Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker, Kern und Thalhammer.
- **trichocarpa** Nakai, **H:** Korea, **F:** Bsch. Grubbauer.
- **trilobata** L., Dreilappiger Spierstrauch, **H:** Nordchina bis Turkestan, **F:** Bot. G.
- **vanhouttei** Zbl. (=*S. cantoniensis x trilobata*), **F:** Stadtpark, Bsch. Ecker, Grubbauer, Kern und Thalhammer.

**Stachyurus** S. et Z., Schweißfahre — *Stachyuraceae*.

- **chinensis** Franch., **H:** China, **F:** Bot. G.

**Staphylea** L., Pimpernuß — *Staphyleaceae*.

- **bolanderi** A. Gr., **H:** Kalifornien, **F:** Bot. G.
- **pinnata** L., Gefiederte Pimpernuß, **H:** Europa bis Westasien, **F:** Schloßberg: unterhalb des Starcke-Häuschens, Hilmteich. — In Graz nur kultiviert.
- **trifolia** L., Dreizählige Pimpernuß, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G.

**Stephanandra** S. et Z., Kranzspiere — *Rosaceae*.

- **incisa** Zbl., Fliederspaltige Kranzspiere, **H:** Japan, Korea, **F:** Bot. G., Gärtnerei Penitz in Liebenau, Bsch. Ecker und Grubbauer.
- **tanakae** Franch., Gelappte Kranzspiere, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, Stadtpark, Bsch. Grubbauer und Thalhammer.

**Symporicarpus** Juss., Schneebiere — *Caprifoliaceae*.

- **albus laevigatus** Blake, Gemeine oder Traubige Schneebiere (=*S. racemosus*), **H:** westliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Stadtpark, Schloßberg, Eckertstraße (Hecke), Schloßpark Eggenberg, Sanatorium Eggenberg u. a. häufig.
- **occidentalis** Hook., Westliche Schneebiere, **H:** mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
- **orbiculatus** Moench, Rotfrüchtige oder Rundblättrige Schneebiere, Korallenbære, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtgärtnerei, Bsch. Ecker und Grubbauer (in letzterer auch *S. orbiculatus variegatus*).

**Syringa** L., Flieder — *Oleaceae*.

- **amurensis japonica** Fr. et Sav. (=*S. japonica*), **H:** Japan, **F:** Bot. G.
- **chinensis** Willd. (=*S. persica x vulgaris*, =*S. rothomagensis*), **F:** Schloßpark Eggenberg, Bsch. Ecker.
- **emodi** Wall., Himalaja-Flieder, **H:** Himalaja, Afghanistan, **F:** Stadtpark, Stadtgärtnerei, Bsch. Grubbauer.
- **josikaea** Jacq., Ungarischer Flieder, **H:** Ungarn, Galizien, **F:** Bot. G., Ecke Schubertstraße—Hilmteichstraße, Bsch. Grubbauer, Kern und Thalhammer.
- **komarovii** C. Schn., **H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

- **oblata giralddii** Rehd., **H:** Nordchina, **F:** Bs. Grubbauer.
- **persica** L., **Persischer Flieder**, **H:** Persien bis Nordwestchina, **F:** Bot. G., beim Blumenhaus Panning, in der Nähe des Mozart-Denkmales, u. a.
- **reflexa** C. Schn., **H:** Mittelchina, **F:** Bs. Grubbauer.
- **sweginzowii** Koehne et Lingelsh., **H:** Nordchina, **F:** Bot. G., Bs. Grubbauer.
- **vulgaris** L., **Gemeiner Flieder**, **H:** Südosteuropa, **F:** häufig in Gärten und Anlagen mit rund 500 bekannten Formen, z.B. „Andenken an L. Späth“ im Herbersteingarten mit einfachen, dunkelpurpurroten Blüten.

**Tamarix** L., **Tamariske** — *Tamaricaceae*.

- **gallica** L., **Gemeine Tamariske**, **H:** Mittelmeergebiet, **F:** Weingartenweg (Eggenberg), Josef-Pock-Straße (Unterfahrt).
- **odessana** Stev., **Russische Tamariske**, **H:** Südrussland, **F:** Herbersteingarten, Bs. Grubbauer und Thalhammer.
- **parviflora** DC., **H:** Südosteuropa, **F:** Bot. G.
- **tetrandra** Pall., **Viermännige Tamariske**, **H:** Südosteuropa, Westasien, **F:** Bs. Grubbauer und Kern, Weichselbaumgasse (Gösting).

**Tilia** L., **Linde** — *Tiliaceae*.

- **americana** L., **Schwarz-Linde** (=*T. glabra*, =*T. nigra*), **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Stadtpark.
- **cordata** Mill., **Winter- oder Stein-Linde**, **H:** Europa bis Kaukasus, **F:** Bot. G., Bs. Kern u. a.
- **platyphyllus** Scop., **Sommer-Linde**, **H:** Europa, **F:** Bot. G., Maria-trosterstraße 194 (Naturschutz!), Bs. Kern u. a.
- **tomentosa** Moench, **Silber-Linde**, **H:** Südosteuropa, Westasien, **F:** Bot. G., Stadtpark (Anfang der Allee von der Leonhardstraße zur Burg), bei der Weinzödlbrücke.

**Ulmus** L., **Ulme, Rüster** — *Ulmaceae*.

- **carpinifolia** Gleditsch., **Feld-Ulme** (=*U. campestris* p. pte, =*U. foliacea*, =*U. glabra*), **H:** Europa, Nordafrika, Westasien, **F:** Stadtpark, Schloßberg, Grabenstraße 36 (Naturschutz!). — Verbreitet.
- — **wredei** Rehd., **Gold säulen-Ulme** (=*U. campestris dampieri wredei*), **F:** Rosenberg: Villa Luschin, Bs. Grubbauer.
- **glabra** Huds., **Berg-Ulme** (=*U. scabra*), **H:** Nord- und Mitteleuropa, Westasien, **F:** Bot. G., Stadtpark, Schloßberg, Rosenberg: Minoriten-schlößl, Bachwirt (Gösting) u. a.
- — **pendula** Rehd., **Hänge- oder Trauer-Ulme**, **F:** Bot. G., Bs. Grubbauer.
- **laevis** Pall., **Flatter-Ulme** (=*U. effusa*), **H:** Mitteleuropa bis Westasien, **F:** Stadtpark, Schloßberg. — Wildwachsend in den Murauen.
- **parvifolia** Jacq., **H:** China, Korea, Japan, **F:** Bot. G., Bs. Grubbauer.

**Viburnum** L., **Schneeball, Schlinge** — *Caprifoliaceae*.

- **barkwoodii** Burkw. (=*V. carlesii* x *utile*), **F:** Bs. Grubbauer.
- **carlesii** Hemsl., **H:** Korea, **F:** Bot. G., Mälzerweg (Rudersdorf), Bs. Grubbauer.
- **fragrans** Bge., **H:** Nordchina, **F:** Bot. G., Bs. Grubbauer.
- **opusum** L., **Gemeiner Schneeball**, **H:** Europa bis Nordasien, **F:** Bot. G., Bs. Kern. — Sonst häufig wildwachsend.
- — **roseum** L., **Gefüllter Schneeball** (=*V. opulus sterile*), **F:** Schloßberg: Nähe des alten Senders u. a., Bs. Ecker, Grubbauer und Thalhammer.
- **plicatum tomentosum** Miq., **Filziger Schneeball** (=*V. tomentosum*), **H:** Japan, China, **F:** Bs. Ecker.
- **prunifolium** L., **Pflaumenblättriger Schneeball**, **H:** östliche und mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
- **rhytidophyllum** Hemsl., **H:** West- und Mittelchina, **F:** Bot. G., Joanneum-garten, Landeskrankenhaus, Bs. Grubbauer.

- **trilobum Marsh.**, Amerikanischer Schneeball (=*V. oxycoccus*, =*V. opuloides*), **H:** nördliche Vereinigte Staaten bis Britisch-Kolumbien, **F:** Bot. G.
- **utile Hemsl.**, **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G., BsCh. Grubbauer.

**Vitex L.**, K e u s c h b a u m — Verbenaceae.

- **agnus-castus L.**, **H:** Südeuropa, Westasien, **F:** BsCh. Klenert.

**Vitis L.**, R e b e — Vitaceae.

- **amurensis Rupr.**, A m u r - R e b e, **H:** Mandschurei, Amurgebiet, **F:** Bot. G., BsCh. Grubbauer.
- **coignetiae Pulliat.**, R o s t r o t e R e b e, **H:** Japan, **F:** BsCh. Grubbauer.
- **vulpina L.**, U f e r - R e b e (=*V. odoratissima*, =*V. cordifolia*, =*V. riparia*), **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., BsCh. Grubbauer.

**Weigela Thunb.**, W e i g e l i e — Caprifoliaceae.

- **floribunda C. A. Mey.**, Reichblütige Weigelia (=*Diervilla floribunda*), **H:** Japan, **F:** Stadtgärtnerei, BsCh. Klenert und Thalhammer.
- **versicolor Rehd.**, **F:** BsCh. Grubbauer.
- **florida S. et Z.**, Schönblütige Weigelia (=*Diervilla florida*), **H:** Nordchina, Korea, **F:** Bot. G., BsCh. Ecker.
- **variegata Bailey.**, **F:** Bot. G.
- **hybrida Jaeg.**, meist wiederholte Kreuzungen verschiedener Arten, mit verschiedenen Phantasienamen, z. B. Eva Rathke, Styriaca (Klenert) usw., **F:** BsCh. Kern, Stadtpark u. a.

**Wisteria Nutt.**, (=*Wistaria Spreng.*), G l y c i n e, Blauregen, Wistarie — Leguminosae.

- **floribunda macrobotrys Rehd. et Wils.**, Vieljochiger Blauregen (=*W. multijuga*), **H:** Japan, **F:** Bot. G.
- **sinensis Sweet.**, Chinesischer Blauregen, **H:** China, **F:** Schloßberg: Aufgang Sackstraße, Pergola unter Kanonenbastei, Kriegerdenkmal (f. *alba*), Humboldtstraße u. a., BsCh. Grubbauer (dort auch f. *alba* und *rosea* fl. pl.), BsCh. Kern und Thalhammer.

**Xanthoxylon L.**, G e l b h o l z — Rutaceae.

- **americanum Mill.** (=*X. fraxineum*), **H:** nördliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.

**Yucca L.**, Palmenlilie — Liliaceae.

- **filamentosa L.**, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten unter der großen Basteimauer, Am Grabenwald, Mälzerweg (Rudersdorf).
- **flaccida Haw.**, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** BsCh. Ecker.

**Zelkova Spach.**, Z e l k o w e — Ulmaceae.

- **carpinifolia K. Koch.**, K a u k a s i s c h e Z e l k o w e, **H:** Kaukasus, **F:** Stadtpark: nordwestlich vom Anastasius-Grün-Denkmal.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Franz H a n s e l m a y e r, Graz-Eggenberg, Am Grabenwald 14.

Für den Inhalt ist der Verfasser verantwortlich.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie und Botanik am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1956

Band/Volume: [H06\\_1956](#)

Autor(en)/Author(s): Hanselmayer Franz

Artikel/Article: [In Graz gepflanzte Laubhölzer 3-30](#)