

Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum	Heft 48	S. 63—64	Graz 1994
---	---------	----------	-----------

***Phyllotreta zieglerei* LOHSE, 1980 –  
neu für die Steiermark  
(Col., Chrysomelidae, Alticinae)**

Von Andreas KAPP

Eingelangt am 21. April 1994

**Inhalt:** *Phyllotreta zieglerei* LOHSE wird erstmals im Hochschwabgebiet nachgewiesen und kann als neu für die Steiermark gemeldet werden. Die bisher bekannte Verbreitung wird anhand einer Karte dokumentiert.

**Abstract:** *Phyllotreta zieglerei* LOHSE can be reported as new from Styria.

**Bisherige Funde**

*Phyllotreta zieglerei* wird von LOHSE 1980 nach einem ♂ aus Rauris (Salzburg) beschrieben, wo sie in 2000 m Seehöhe gesammelt wurde. KOFLER 1990 berichtet über das Vorkommen in einem Hochmoor bei Obertilliach (1400 m) im Osttiroler Gailtal; als Fraß- und Entwicklungspflanze wird *Cardamine amara* vermutet. Ein weiterer Fundort in Osttirol liegt im Patschertal in 2050 m Seehöhe (Döberl in lit.).

DÖBERL 1994 gibt im 3. Nachtragsband zu FREUDE-HARDE-LOHSE *Arabis alpina* als Entwicklungspflanze an.

Die nachstehend angeführten Funddaten dieser Art sollen die bisher bekannte Verbreitung etwas veranschaulichen:

**Salzburg:**

Hohe Tauern, Rauris, 2000 m, 21. 6. 1978, leg. Ziegler (Holotypus).

**Osttirol:**

Obertilliach, Niedermoor Schwalen, 14. 8. 1987, 1986 (1♀), leg. et. det. Kofler, vid. Döberl.

Riesenfernergruppe, Patschertal (46° 58' N/12° 13' E), 2050 m, in Anzahl an *Arabis alpina*, 29. 6. 1990, leg. et det. Kahlen, vid. Döberl, am selben Platz in Anzahl an *Arabis alpina* (Lochfraß), 26. 6. 1992, leg. et. det. Döberl und Siede.

**Steiermark:**

Hochschwabgebiet, Weichselboden, Edelbodenalm nach Samstatt, 1600–1650 m, 14. 7. 1993, an *Arabis alpina*, leg. Kapp, det. Döberl (1♀).

Der Fundort liegt auf der Hochschwab-Nordseite in einem spärlich bewachsenen Schuttkar. *Arabis alpina* wurzelt hier tief in grobem Blockwerk, der Käfer ließ sich bei Annäherung sofort fallen.




Abb. 1: Fundpunktkarte von *Phyllotreta zieglerei* LOHSE

**Biodaten:** Bisher nachgewiesen an *Cardamine amara* und *Arabis alpina* (mit Lochfraß). Döberl (in lit.) teilt mit, daß die Tiere vom Fundort Patschertal nicht nur im Blockschutt, sondern auch im Rasen gefunden wurden.

### Dank

An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei Herrn Döberl für die Determination und Mitteilung der ihm bekannten Fundpunkte.

### Literatur

- DÖBERL M. 1994. Alticinae. In: LOHSE G. A. und LUCHT W.: Die Käfer Mitteleuropas, 14, 3. Suppl.Bd. — Goecke & Evers, Krefeld.
- KOFLER A. 1990. Zum Vorkommen von *Phyllotreta zieglerei* LOHSE und *Notaris aethiops* (FABRICIUS) in Osttirol. — Koleopt. Rdsch., 60: 131–137.
- LOHSE G.A. 1980. Eine neue mitteleuropäische Art der Gattung *Phyllotreta* STEPHENS (Col. Chrysom.). — Ent. Bl., 75(3): 155–156.

Anschrift des Verfassers: Ing. Andreas KAPP  
Sulzerweg 2  
A-6830 Rankweil.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [48\\_1994](#)

Autor(en)/Author(s): Kapp Andreas

Artikel/Article: [Phyllotreta zieglerei LOHSE, 1980 - neu für die Steiermark \(Col., Chrysomelidae, Alticinae\) 63-64](#)