

Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum	Heft 49	S. 23–47	Graz 1995
---	---------	----------	-----------

Erstnachweise und Wiederfunde für die Käferfauna der Steiermark (Coleoptera)

Von Erwin HOLZER

Eingelangt am 30. Mai 1995

Inhalt: Die wesentlichsten Ergebnisse meiner 20jährigen faunistischen Forschungsarbeit über Käfer der Steiermark werden bekanntgegeben: 135 Arten werden erstmals für die Steiermark gemeldet (11 davon erstmals für Österreich), von 47 weiteren Arten existierten bisher nur Fundangaben aus dem vorigen Jh. oder um die Jahrhundertwende.

Abstract: The most essential results of my faunistic research over the last 20 years concerning Styrian beetles are presented: 135 species are reported for Styria for the first time (11 out of them for Austria for the first time). For 47 other species there have been recorded data up to now from the previous century or the turn of the century only.

Einleitung

Die Arbeit umfaßt Angaben über Erstnachweise oder erste sichere Meldungen für die Steiermark bzw. für Österreich sowie Daten über Wiederfunde (Arten, die bisher nur im vorigen Jh. bzw. knapp nach der Jahrhundertwende für die Steiermark nachgewiesen wurden).

Aufgenommen wurden auch Funddaten von einigen Arten, die in der Literatur (z.B.: Catalogus Faunae Austriae, Faunistik von HORION) für ganz Österreich gemeldet sind und eine Fundangabe für die Steiermark nicht eruierbar war.

Zum Großteil stammen die Nachweise aus der östlichen Steiermark.

Die große Anzahl von Erstnachweisen und Wiederfunden ergibt sich daraus, daß die wenigen derzeit in der Steiermark tätigen Spezialisten nur bestimmte Familien bearbeiten. Ein weiterer Grund liegt vielleicht in der Anwendung differenzierter Sammelmethoden wie z. B. Ködern, Sieben, Eintragen von befallenem Holz und vor allem Lichtfang mittels Misch- oder Schwarzlichtgeräten.

Die Nomenklatur richtet sich nach LUCHT 1987. Die in den Supplementbänden 12–14 der „Käfer Mitteleuropas“ vorgenommenen Änderungen werden jedoch berücksichtigt.

Die Nachweise stammen fast zur Gänze aus meinen Aufsammlungen bzw. Beobachtungen. Bei Ausnahmen ist der Name des Sammlers genannt.

Sofern kein Determinator angegeben ist, wurde auch die Bestimmung der Arten von mir durchgeführt.

Verwendete Abkürzungen:

E = Erstnachweis

W = Wiederfund

BR = BRANCSIK 1871

ST = Steiermark

B = Burgenland

N = Niederösterreich

FR	=	FRANZ 1970–1974	K	=	Kärnten
FHL	=	FREUDE/HARDE/LOHSE 1965–1983	O	=	Oberösterreich
HC	=	HOLZSCHUH 1971–1983	W	=	Wien
HO	=	HORION 1941–1974	T	=	Tirol
K/M	=	KIEFER/MOSSBRUGGER 1940–1942	S	=	Salzburg
KO	=	KODERMANN 1865–1868	Ö	=	Österreich

Dank

Mein Dank gilt Dr. Karl Adlbauer, Graz, für die fachliche Beratung zur Abfassung der Publikation, weiters Dr. Erich Kreissl, Graz, für wertvolle Hinweise zu einigen Arten sowie den in der Folge angeführten Spezialisten, die Arten bestimmter Familien für mich determiniert haben:

K. Adlbauer, L. Behne, P. Cate, H. Daffner, L. Dieckmann †, M. Döberl, J. Fremuth, K. Graser, F. Hieke, F. Hebauer, C. Holzschuh, J. Horák, M. Jäch, C. Johnson, M. Kahlen, E. Kirschenhofer, J. Kodada, A. Kofler, J. Kolibac, A. Olexa, J. Reibnitz, M. Reška, W. H. Rucker, H. Schillhammer, R. Schuh, K. Spornraft, W. Suppantitsch, J. Strejcek, V. Švihla, G. Wewalka, W. Wittmer.

Artenliste und Faunistik

CARABIDAE

Harpalus rufibarbis (F.) W
Graz, Eggenberg, Plabutsch, 450 m, 16.7.1985, 1 ♂; Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 12.8.1988, 1 ♀; beide Lichtanflug, Kirschenhofer det.

Nur aus dem vorigen Jh. gemeldet: BR, HO, KO, K/M.

Acupalpus luteatus (DUFT.) W
Graz, Eggenberg, Plabutsch, 450 m, 22.5.1986, 1 Ex., Lichtanflug, Kirschenhofer det.
Von HO 1941 für die östl. ST ohne nähere Angaben genannt.

Pterostichus rhaeticus HEER E
Etzersdorf bei Weiz, Busental, 400 m, 18.5.1990, 1 ♂ in sumpfigem Gelände; Stubenberg, Schielleiten, Teichnähe, 400 m, 12.5.1991, 1 ♂; beide in Köderbechern mit Weinessig.

Bisher als var. von *P. nigrita* (PAYK.) geführt und in denselben Biotopen vorkommend. ♂♂ durch die Bildung der Parameren eindeutig zu trennen.

Agonum lugens (DUFT.) W
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 30.6.1994, 1 Ex. im Uferbereich des Gartentümpels.
Nur eine alte Angabe von HO 1941: „Graz beim Licht.“

Amara majuscula CHAUD. E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 5.8.1984, 1 Ex.; 23.8.1984, 1 Ex.; 29.7.1985, 1 Ex.; 10.8.1986, 1 Ex.; 14.8.1989, 1 Ex.; ausschließlich Lichtanflug, Hieke und Kirschenhofer det.

Aus Ö nur wenige Funde (B, W, K).

Badister lacertosus STURM W
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 17.6.1986, 1 ♀, Lichtenflug, Kirschenhofer vid.
K/M melden *B. bipustulatus* a. *lacertosus* STURM.
Die Art wurde früher genauso wie die folgende nicht von *B. bipustulatus* (F.) unterschieden.

Badister meridionalis PUEL E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 17.6.1986, 1 ♂; 4.7.1988, 1 ♀; beide Lichtenflug,
Kirschenhofer vid.

Badister dilatatus CHAUD. E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 4.7.1988, 1 ♂, Lichtenflug, Kirschenhofer det.

Badister anomalus PERRIS E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 14.7.1984, 1 Ex.; St. Johann, Tierpark Herberstein,
400 m, 8.6.1993, 1 ♂; beide Lichtenflug, Kirschenhofer det.

Dromius sigma ROSSI E
Anger, Zetz, Wittgruber, 900 m, 31.3.1989, 1 Ex. am Rand eines Forstweges unter
Stein, Kirschenhofer det.

DYTISCIDAE

Graphoderus cinereus (L.) W
Anger, Rohrhof, Gradwohl-Teiche, 450 m, 28.6.1978, 3 Ex., Wewalka det.
Die beiden großen Teiche im Ortsgebiet von Anger wurden noch im selben Jahr
zugeschüttet.
Sonst nur eine alte Angabe von FR: Ziegelteiche bei Premstätten, Penecke leg.

HYDROPHILIDAE

Helophorus aequalis THOMS. E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 5.10.1990, 1 Ex. im Gartentümpel, Kodada det.
Im Katalogteil von FHL/12 für Ö noch nicht angeführt.

Helophorus obscurus MULS. E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 2.6.1983, 20.4.1985, je 1 Ex. im Gartentümpel,
Hebauer det.

Vermutlich nicht selten, jedoch früher unerkannt und mit *H. flavipes* (FABR.) vermischt.
Im Katalogteil von FHL/12 ebenfalls noch nicht für Ö genannt.

Helophorus minutus (FABR.) E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 18.5.1982, 1 Ex. im Gartentümpel; Pöls/Wieser-
bahn, Kaiserwald, 330 m, 9.6.1990, 1 Ex. auf Sumpfwiese; beide Hebauer det.

Bisher nur vereinzelte Nachweise aus N und B.

Cercyon marinus THOMS.

W

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 17.6.1986, 1 Ex., Lichtanflug, Hebauer det.

Nur von BR 1871 gemeldet.

Cercyon laminatus SHARP.

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m; erstmals am 14.7.1984 festgestellt, seitdem immer wieder recht zahlreich, aber ausschließlich durch Lichtanflug (Mai–Juni) nachgewiesen; Hebauer vid.

Zuerst aus Japan beschrieben, unter Tang an Meeresküsten. Erst 1957 in Deutschland gefunden. Seither ziemlich rasche Verbreitung in ganz Mitteleuropa. Seit 1960 auch in Ö (HC 1983).

Cryptopleurum subtile SHP.

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 17.8.1987, 7 Ex.; 19.9.1991, 1 Ex.; alle Lichtanflug, Hebauer det.

Aus Japan eingewandert, seit 1959 in Deutschland. Wahrscheinlich auch in Ö schon überall heimisch (HC 1983).

Hydrobius fuscipes rottenbergi GERH.

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, seit 1982 mehrfach im Gartentümpel (April bis August), auch Lichtanflug, alle Ex. Hebauer det.

Anacaena lutescens (STEPH.)

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, zahlreich (April–Juli) im Gartentümpel, auch Lichtanflug, alle Hebauer det.; Preding, W-Stmk., 300 m, 9.3.1989, 3 Ex. an faulenden Kürbissen auf Sumpfwiese, Jäch det.

Wurde früher als Synonym von *A. limbata* (F.) angesehen. Nach HEBAUER 1989 in FHL eher montan verbreitet. Meine angeführten Funde stammen jedoch ausschließlich aus dem Vorland.

Helochaeres obscurus (MÜLL.)

E

Anger, Steger Waldteich, 500 m, 19.5.1990, 2 Ex. an der Unterseite eines schwimmenden Holzstückes, Hebauer det.

Artberechtigung lange Zeit umstritten. Sicher überall neben *H. livida* (FORST.) vorkommend.

Hydrochara flavipes (STEV.)

E

Anger, Oberfeistritz, 450 m, 2.6.1983, 1 Ex. in Tümpel auf Sumpfwiese; Rohrbach/Lafnitz, 500 m, 30.7.1981, 1 Ex., an Auto angeflogen, Adlbauer leg., in coll. Adlbauer.

Der von BR angegebene Fundort (St. Leonhard) liegt heute auf slowenischem Staatsgebiet.

HISTERIDAE

Plegaderus dissectus ER.

E

St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 6.3.1992, 6 Ex. in weißfaulem Eichenholz.

Nur wenige Funde aus N und W bekannt.

Carcinops pumilio (ER.)

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 8.8.1980, 20.9.1981, 11.6.1982, 4.7.1986, je 1 Ex.; alle unter faulendem Gras; 17.6.1986, 1 Ex., Lichtanflug; Anger, Ortsgebiet, 480 m, 5.7.1988, 3 Ex. am späten Nachmittag schwärmend; 22.6.1991, 2.7.1991, je 1 Ex.; alle Olexa det.

LEIODIDAE

Leiodes obesa (SCHM.)

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 12.8.1988, 1 Ex., Lichtanflug, Daffner det.

Nur eine Angabe von FR aus dem Grenzgebiet (Koralpe, ohne genauere Lagebezeichnung, Ganglbauer leg.).

SCYDMAENIDAE

Neuraphes strupii MACH.

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 20.5.1987, 1 Ex., Kahlen det.

Bisher nur aus K nachgewiesen.

Scydmaenus hellwigi (HBST.)

E

St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 24.6.1991, 2 ♀♀, Kahlen det.

In weißfaulem Eichenholz. Nur wenige Funde in Ö.

SCAPHIDIIDAE

Scaphisoma boleti (PANZ.)

W

St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 25.7.1989, 1 Ex. an verpilztem Eichenholz.

Von BR gemeldet. FR gibt die Art aus dem Wechselgebiet ohne präzise Lagebezeichnung an.

STAPHYLINIDAE

Proteinus ovalis STEPH.

E

Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1000 m, 3.5.1986, 1 Ex. unter verpilzter Rinde; Preding, W-ST, 300 m, 9.3.1989, 5 Ex.; alle Schillhammer det.

Angaben vor 1935 sind wegen der Vermengung mit *P. crenulatus* PAND. und *P. longicornis* DOD. nicht sicher verwertbar; nach SCHEERPELTZ 1968 in Ö.

Proteinus brachypterus (F.)

W

Anger, Zetzbachgraben, 550 m, 23.9.1989, 1 Ex., Schillhammer det.

Nur Angaben aus dem vorigen Jh.: BR, KO.

Phyllodrepa ioptera (STEPH.)

W

Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1100 m, 4.2.1988, 1 Ex. unter Rinde von *Acer pseudoplatanus*, Schillhammer det.

Nur von BR aus dem vorigen Jh. gemeldet.

- Platytethus cornutus* (GRAV.) W
Stubenberg, Schielleiten, 400 m, 7.5.1988, 1 Ex. in Teichnähe, Schillhammer det.
Nur von BR aus dem vorigen Jh. gemeldet.
- Astenus pulchellus* (HEER) E
Graz, Eggenberg, Plabutsch, 400 m, 22.5.1986, 1 Ex. Lichtanflug, Schillhammer det.
Bisher erst wenige Angaben aus W und B; nach SCHEERPELTZ 1968 in Ö.
- Gyrophypnus scoticus* (JOY) E
Stubenberg, Schielleiten, 400 m, 7.5.1988, 1 Ex., Schillhammer det.
Bisher nicht von *G. angustatus* getrennt. Im Katalogteil von FHL/12 noch kein Nachweis für Ö angegeben.
- Othius myrmecophilus* KIESW. W
Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1100 m, 6.5.1989, 1 Ex., Schillhammer det.
Von BR aus dem vorigen Jh. gemeldet. Nur wenige Angaben für Ö von FR: Wechsel, Umg. Vöslau.
- Philonthus subuliformis* (GRAV.) E
Anger, Rabenwaldgebiet, Reith-Petz, 550 m, 20.10.1985, 1 Ex., leg. Mauerhofer, Schillhammer det.
SCHEERPELTZ 1968 meldet die Art für Ö.
- Philonthus spinipes* SHP. E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 28.4.1988, 1 Ex., Schillhammer det.
Erst in letzter Zeit aus Ostasien nach Mitteleuropa eingewandert.
- Ontholestes haroldi* (EPPH.) W
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 5.6.1980, 10.7.1994, je 1 Ex. in Kompost; Stubenberg, Siegersdorf, Geierwand, 600 m, 5.2.1989, 1 Ex. aus Bodenstreu von Wurzel-nischen gesiebt, Schillhammer det.; St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 19.5.1993, 1 Ex.
Eine alte Angabe von SCHEERPELTZ 1968 für ST (Ganglbauer leg.). Sonst nur vereinzelt in N gefunden.
- Quedius invreae* GRID. E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 11.5.1983, 1 Ex. unter faulendem Gras, Kofler det.
Bisher erst eine Angabe aus Ö bekannt (FR): Brühl, Pachole leg.
- Quedius curtipennis* BERNH. E
Weiz, Etzersdorf, Busental, 400 m, 15.5.1990, 3 Ex., 18.5.1990, 5 Ex. in Köderbecher mit Weinessig, aufgestellt in versumpftem Waldbereich, alle Ex. Schillhammer det.
SCHEERPELTZ 1968 meldet die Art für Ö.
FR gibt nur einen Fundort für Ö an: Purgstall, N.

Mycetoporus despectus STRAND E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 11.7.1985, 1 Ex. in Kompost, Schillhammer det.
FR nimmt an, daß sich zahlreiche Angaben für *M. bimaculatus* BOISD. & LAC. auf diese Art beziehen.

CANTHARIDAE

Rhagonycha improvisa DAHLGR. E
Anger, Ortsgebiet, 480 m, 18.5.1978, 1 Ex.; Heilbrunn, Brandlucken, 1200 m, 15.6.1978, 1 Ex.; Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 22.5.1979, 20.5.1987, je 1 Ex.; Baierdorf bei Anger, Löffelbergl, 600 m, 21.5.1989, 1 Ex.; Ardning, Ennstal, 600 m, 30.5.1989, 2 Ex.; alle Ex. Švihla det.

Malthodes europaeus WITTMER E
Oberfeistritz bei Anger, 450 m, 8.5.1989, 1 ♂, Wittmer det.
Bisher erst eine Angabe für Ö (HC 1983): Spillern, N.

Malthodes transeuropaeus WITTMER E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 25.5.1990, 1 ♂, Wittmer det.
Bisher nur aus K bekannt.

Malthodes penninus icaricus WITTMER E
Hohentauern, Großer Hengst, 2000 m, 12.7.1983, 1 Ex. auf *Senecio carniolicus*, Wittmer det.
Bisher nur in T nachgewiesen.

MALACHIIDAE

Anthocomus coccineus SCHALL. E
Weiz Umgebung, Patschagipfel, 1270 m, 7.9.1977, 1 Ex. auf *Cirsium* sp.
Bemerkenswert ist auch, daß die Art auf Kalkmagerrasen gefunden wurde, da sie sonst meist von *Phragmites*- und *Juncus*-Arten aus sumpfigen Gegenden bekannt ist.

Sphinginus coarctatus (ER.) E
St. Anna/Aigen Umg., Waltra-Felsen, 400 m, 30.5.1991, 1 Ex.
Erst einige Angaben aus Ö.

CLERIDAE

Korynetes coeruleus (GEER) E
Anger, Ortsgebiet, 480 m, 30.7.1976, 4.6.1978, je 1 Ex.; Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 25.6.1982, 19.6.1984, 5.7.1990, 20.6.1994, je 1 Ex.; Graz, Eggenberg, Plabutsch, 400 m, 16.7.1985, 1 Ex.

Alle Funde auf Holzvorräten, Kolibac det.

FR gibt an, nur 1 Ex. dieser Art aus K gesehen zu haben und stellt alle übrigen österreichischen Nachweise zu *K. ruficornis* STURM (Syn.: *rufipes* STURM, *coeruleus* OBBG., *obenbergi* JANS.).

Obengenannte Funde beweisen, daß *K. coeruleus* (DE GEER) zumindest auch in der O-ST neben *K. ruficornis* STURM vorkommt. Die ♂ beider Arten sind durch die Bildung des Aedoeagus – entgegen den Ausführungen von HO – eindeutig voneinander zu unterscheiden.

TROGOSITIDAE

Tenebroides mauritanicus (L.)

E

Weiz, Stadtgebiet, 480 m, 17.12.1986, 1 Ex. zwischen Mehlsäcken in einer Bäckerei, Steidl leg.

Die Angabe von BR kann sich auf Grund der Fundumstände („an Baumstämmen, unter Rinde“) nur auf *T. fuscus* (GOEZE) beziehen, da *T. mauretanicus* ausschließlich synanthrop lebt.

LYMEXYLONIDAE

Lymexylon navale (L.)

W

Stubenberg, Siegersdorf, Hoferberg, 550 m, 28.8.1991, 1 ♀ am späten Nachmittag im Flug in Mischwald.

Von BR aus dem vorigen Jh. „in alten Baumstämmen um Graz“ gemeldet. Äußerst selten, nur wenige Angaben aus Ö.

ELATERIDAE

Ampedus megerlei (LACORD.)

E

Graz, Eggenberg, Plabutsch, 400 m, 22.5.1986, 1 Ex., Lichtanflug, Cate vid.

Wird als Nachttier nur selten gefunden, lebt in alten Baumbeständen und überwintert im Mulm.

Von HO aus dem heutigen Slowenien (Umg. Marburg) angegeben.

Ampedus sinuatus GERM.

W

Anger, Baierdorf, Löffelbertl, 11.6.1980, 600 m, 1 Ex.; Stübing, Pfaffenkogel, 600 m, 29.4.1989, 1 Ex.

Nur Meldungen aus dem vorigen Jh.: BR, HO.

Ampedus nemoralis BOUWER

E

Anger, Oberfeistritz, 450 m, 10.3.1986, 2 Ex.; 20.3.1986, 26.3.1986, 1.4.1986, je 1 Ex. aus Kiefernstrünken, Steidl leg.; alle Cate det.

Im Katalogteil von FHL/13 für Ö noch nicht verzeichnet.

Melanotus castanipes (PAYK.)

W

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 26.8.1984, 4.7.1988, 22.7.1992, je 1 Ex., Lichtanflug; Anger, Zetz, Ochenbauer, 1100 m, 31.5.1982, 9.2.1992, je 1 Ex. aus Baumstrunk gehackt; Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1100 m, 3.5.1986, 1 Ex. aus altem Buchenholz; Anger, Zetz, Südseite, 1100 m, 16.6.1991, 1 Ex.; St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 19.5.1993, 1 Ex., Lichtanflug; alle Ex. Cate vid.

Von BR aus dem vorigen Jh. gemeldet, wegen der Konfusion mit *M. rufipes* (HERBST) noch keine sicheren Meldungen für ST.

Zorochrus dufouri (BUYSS.)

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 17.5.1979, 1 Ex., Cate det.

Vermutlich weiter verbreitet, Angaben von FR über *Z. dermestoides* (HERBST) dürften sich teilweise auf diese Art beziehen.

EUCINETIDAE

Eucinetus haemorrhoidalis (GERM.)

W

Hartberg, Ringkogel, 500 m, 12.5.1980, 1 Ex. aus Laubstreu in leerem Schwimmbecken gesiebt.

Nur alte Meldungen: BR, HO.

DERMESTIDAE

Dermestes frischii KUG.

W

St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 23.6.1994, 1 Ex. an Aas in sonnenexponierter Lage.

Nur von BR eine Meldung aus dem vorigen Jh.

Globicornis corticalis (EICHH.)

E

Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1000 m, 13.7.1984, 2 Ex.; Anger, Zetz, Wittgruber, 900 m, 12.6.1980, 1 Ex.

Alle Funde auf der Unterseite von trockenen Buchenästen am Boden.

Anthrenus verbasci (L.)

E

Weiz, Stadtgebiet, 480 m, 3.10.1987, 1 Ex. in Wohnung.

BYRRHIDAE

Lamprobyrrhulus nitidus (SCHALL.)

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 20.4.1985, 1 Ex.; 15.5.1985, 5 Ex.; 6.5.1986, 1 Ex.; alle an Hausmauer bzw. den anschließenden Steinplatten am Boden. St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 24.6.1991, 1 Ex. aus Bodenstreu gesiebt.

Cytilus auricomus (DUFT.)

E

Leibnitz, Retzhof, Murauen, 270 m, 28.3.1990, 1 Ex. unter Holz in sumpfigem Gelände.

NITIDULIDAE

Carpophilus marginellus MOTSCH. E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 10.7.1986, 1 Ex., Spornraft det.

Eingeschleppt und bereits eingebürgert, aus Ö jedoch erst wenige Meldungen.

Meligethes longulus SCHILSKY E
Anger, Zetz, Südseite, 1100 m, 22.6.1991, 1 Ex. von Trockenrasen gestreift, Spornraft det. Bisher erst aus B bekannt. Von mir auch vom Spitzerberg bei Hundsheim erstmals für N festgestellt.

Meligethes ochropus STURM W
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 15.5.1992, 1 Ex., Spornraft det.

Nur von KO aus dem vorigen Jh. gemeldet.

Meligethes incanus STURM W
St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 17.7.1992, 1 Ex., Spornraft det.

Nur aus dem vorigen Jh. gemeldet: BR, KO.

Meligethes gagatinus ER. E
Bad Gleichenberg, Rudorfkogel, 300 m, 8.6.1991, 1 Ex., Spornraft det.
Früher als var. von *M. lugubris* Sturm geführt. Von mir auch in B (St. Andrä) festgestellt. Erstmeldung für Ö.

Meligethes distinctus STURM E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 13.5.1990, 1 Ex.; Anger, Zetz, Südseite, 13.7.1992, 1 Ex., beide Spornraft det.

Von mir auch in B (Jois) und in N (Hundsheim) festgestellt.
Die Art ist ebenfalls neu für Ö.

Cryptarcha strigata (F.) W
Etzersdorf bei Weiz, Busental, 400 m, 18.5.1990, 3 Ex. in Köderbecher mit Weinessig, Spornraft det.; St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 3.8.1993, 1.7.1994, zahlreich an Obstköder im Kronenbereich einer Eiche.

Nur von BR Meldungen aus dem vorigen Jh.

Cryptarcha undata (OL.) E
St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 3.8.1993, 5 Ex. zusammen mit *C. strigata* (F.) an Obstköder.

Die Angabe von BR (Spitzky leg.) bezieht sich auf das heutige Slowenien.

Glischochilus quadrisignatus (SAY) E
Anger, Riegersburg, Auffen, Herberstein, seit 1980 zahlreiche Funde (April bis August); unter verpilzter Rinde, an ausfließenden Baumsäften, im Keller an faulenden Äpfeln, im Kompost u. a.

Nearktische Art, seit 40 Jahren auch in Ö, mittlerweile zumindest in ST die häufigste Art der Gattung.

CRYPTOPHAGIDAE

Cryptophagus inaequalis RITT. E

Anger, Löfflbirtl, 550 m, 11.5.1991, 1 Ex. von verpilzten Laubholzästen, Kahlen det.

Bisher nur von zwei Fundstellen in K bekannt.

Cryptophagus hexagonalis TOURN. E

Weizklamm, Rablloch, 800 m, 21.6.1994, 1 Ex. in Köderbecher, vermutlich von verpilztem Holzstück, mit dem der Becher abgedeckt war, Kahlen det.

Bisher ist erst ein Nachweis aus Ö bekannt (FR 1974): Wienerwald, Mader leg.

Cryptophagus pallidus STURM E

Anger, Zetzbachgraben, 550 m, 28.9.1985, 1 Ex.; Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 13.5.1990, 25.11.1990, je 1 Ex.; alle Ex. Reška det.

Bisher noch keine sicheren Angaben aus der ST (FR: Wechselgebiet, ohne genauere Lagebezeichnung).

Atomaria lewisi RITT. E

Anger, Kulm bei Siegersdorf, seit 1982 zahlreiche Funde von April bis September, im Detritus einer Dachrinne, häufig auch Lichtanflug, alle Ex. Johnson det.

Ursprünglich in Ostasien beheimatet, importiert und mittlerweile in ganz Mitteleuropa eingebürgert, seit 1966 auch in Ö (HC 1983).

Atomaria fimetarii HBST. E

Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1000 m, 3.8.1985, 1 Ex. an verpilzter Rinde; Anger, Zetz, Südseite, 1100 m, 10.6.1988, 1 Ex.; beide Ex. Johnson det.

Die Meldung von BR bezieht sich lt. HO sicher auf eine andere Art.

Atomaria elongatula ER. E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 3.6.1993, 1 Ex., Johnson det.

Von HC 1983 als neu für Ö publiziert (Orth/Donau), von BR jedoch für ST gemeldet, was von HO nicht bestätigt wird. Im Katalogteil von FHL/13 ist die Art noch nicht für Ö angeführt.

Curelius exiguus (ER.) W

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 30.4.1994, 15.4.1994, je 1 Ex. an faulendem Heu, Kahlen det.

Bisher nur von KO aus dem vorigen Jh. gemeldet.

PHALACRIDAE

Olibrus baudueri FLACH E
Anger, Zetz, Südseite, 1000 m, 5.8.1989, 1 ♂, Graser det.
Nach HO „große Seltenheit“, bisher nur aus N bekannt.

LAEMOPHLOEIDAE

Placonotus testaceus (F.) W
Siegersdorf, Bez. Hartberg, Geierwand, 600 m, 22.4.1984, 2 Ex. unter Eichenrinde,
Holzschuh det.; 11.3.1990, 2 Ex., Schuh det.; St. Johann, Tierpark Herberstein,
6.3.1992, 1 Ex., 24.9.1992, 2 Ex., alle Schuh det.

Nur von BR aus dem vorigen Jh. gemeldet.

Notolaemus castaneus (F.) E
Bad Gleichenberg, NSG Steinbruch Klausen, 380 m, 30.5.1992, 1 Ex.

Die von BR angegebenen Funde von Spitzzy stammen aus St. Leonhard bei Marburg.

Cryptolestes pusillus (SCHÖNH.) E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 7.9.1981, 4 Ex. an Vogelfuttervorrat, Holzschuh
det.; 16.11.1981, 1 Ex.; Siegersdorf, 600 m, 1.4.1982, 2 Ex. unter Eichenrinde; Anger,
Auersbachsiedlung, 500 m, 3.8.1993, 1 Ex.; alle Schuh det.

Nach bisherigen Meldungen ausschließlich synanthrop.

Von HC 1983 erstmals für Ö (Schlierbach, Sautern) gemeldet. Von mir auch in B
(St. Andrä) unter Laubholzzrinde festgestellt.

LATRIDIIDAE

Latridius hirtus (GYLL.) E
Anger, Zetz, Flach, 1100 m, 1.10.1986, 1 Ex. unter loser Baumrinde, Holzschuh det.

Der von HO für ST genannte Fundort Radstadt/Untertauern (Franz leg.) liegt in S!

Enicmus testaceus (STEPH.) E
Anger, Zetz, Ostseite, 1000 m, 20.8.1984, 1 Ex. unter verpilzter Buchenrinde, Daffner
det.

Bisher nur aus W und N bekannt.

Corticaria pineti LOHSE E
Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1000 m, 14.5.1985, 1 Ex. unter Kiefernrinde, Holzschuh
det.; 10.5.1988, 1 Ex., Rücker det.; Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 15.4.1991,
1 Ex., Rücker det.

Nur sehr wenige Funde aus dem nördlichen Mitteleuropa. FR gibt die Art nicht für Ö
an. Von LUCHT 1987 wird sie aber für unser Bundesgebiet angeführt.

Melanophthalma curticolis (MANNH.) E
Gosdorf bei Mureck, Murauen, 230 m, 28.5.1988, 2 Ex.; Bad Gleichenberg, südlich
Rudorfkogel, 270 m, 8.6.1991, 1 Ex.; alle Ex. Rücker det.

Melanophthalma maura MOTSCH. E
Bad Gleichenberg, NSG Steinbruch Klausen, 380 m, 30.5.1992, 1 Ex.; Anger, Zetz,
Südseite, 1100 m, 13.7.1992, 1 Ex.; beide auf Disteln in Trockenrasenzonen, Rücker det.

MYCETOPHAGIDAE

Mycetophagus salicis BRIS. E
St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 17.7.1992, 1 Ex., 19.9.1993, 3 Ex. an
Laetiporus sulphureus.

Mycetophagus fulvicollis F. W
St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 23.6.1994, 2 Ex. unter verpilzter Rinde von
Pinus sylvestris.

Nur von BR aus dem vorigen Jh. gemeldet.

CORYLOPHIDAE

Orthoperus mundus MATTH. E
Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1000 m, 2.6.1984, 1 Ex. unter verpilzter Buchenrinde,
Daffner det.

Möglicherweise weiter verbreitet, da früher als Form von *O. atomus* (GYLL.) angesehen.

Orthoperus intersitus Bruce E
Anger, Zetz, Südseite, 1100 m, 5.8.1989, 22.6.1991, je 1 Ex., Kahlen det.

CISIDAE

Cis rugulosus MELL. E
Anger, Zetz, Flach, 1100 m, 20.11.1987, 1 Ex.; Anger, Baierdorf, Löffelbertl, 600 m,
30.4.1991, 2 Ex.; Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1100 m, 16.8.1992, 1 Ex.; St. Johann,
Tierpark Herberstein, 17.7.1992, 1 Ex.; alle Reibnitz det.

Cis castaneus MELL. W
St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 6.3.1992, 2 Ex., Reibnitz det.

Nur von BR aus dem vorigen Jh. gemeldet.

Cis fissicornis MELL. E
Weiz, Weizklamm, Jägersteig, 750 m, 22.6.1992, 5 Ex. an Baumschwämmen auf einem
liegenden Buchenstamm, Reibnitz det.; 1 Ex. in coll. Reibnitz.

Ausgesprochen seltene Art mit wenigen Fundstellen in Mitteleuropa, nach LOHSE 1967
in FHL vom Aussterben bedrohte Art. Zweitfund für Ö. Nur von HO aus S (Tamsweg,
Lohse leg. 1959) gemeldet.

ANOBIIDAE

Xestobium rufovillosum (GEER.)

W

St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 24.6.1991, 1 Ex. unter Rinde einer anbrüchigen Eiche:

Nur von BR aus dem vorigen Jh. gemeldet.

Oligomerus brunneus (OL.)

E

St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 30.6.1993, 2 Ex. (1 Ex. in coll. Brandstetter), Lichtanflug; 1.7.1994, 1 Ex. 7 mm groß (lt. CYMOREK 1969 in FHL nur bis 6,5 mm) auf rindenloser Stelle auf *Quercus robur* in der Nacht durch Ableuchten des Stammes gefunden.

Die Meldung von BR bezieht sich auf das heutige Slowenien.

Gastrallus immarginatus (MÜLL.)

W

St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 30.6.1993, 1 Ex., Lichtanflug.

Nur von BR aus dem vorigen Jh. gemeldet.

Gastrallus laevigatus (OL.)

E

St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 30.6.1993, 1 Ex., Lichtanflug.

Anobium nitidum F.

W

St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 23.6.1994, 1 ♂ am Abend auf liegendem Ahornstamm am Boden durch Ableuchten gefunden.

Dorcatoma serra PANZ.

E

St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 9.6.1993, 1 Ex., Lichtanflug.

Bisher erst wenige Funde aus N und B.

Dorcatoma robusta STRAND

E

St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 6.3.1992, zahlreiche tote Ex. aus *Fomes fomentarius*.

Von mir auch im Lainzer Tiergarten festgestellt.

PTINIDAE

Ptinus rufipes OL.

W

Gosdorf bei Mureck, Murauen, 230 m, 28.5.1988, 1 Ex. von dürren Laubholzästen geklopft, Holzschuh det.; Bad Gleichenberg, NSG Steinbruch Klausen, 380 m, 30.5.1992, 1 Ex.

BR bringt nur Meldungen aus dem vorigen Jh.

OEDEMERIDAE

Ischnomera cyanea (F.)

E

Stubenberg, Siegersdorf, Hoferberg, 1.5.1986, 500 m, 1 ♂.

Die Art wurde unter dem Namen des bisherigen Synonyms von *caerulea* (F.) eingefügt und ist äußerlich nicht von dieser unterscheidbar, die ♂♂ jedoch durch den Bau der Penisspitze und der Parameren eindeutig zu trennen.

Von mir auch in Jois (B) gefunden. Erstmeldungen für Ö, möglicherweise aber häufiger als *I. caerulea* (L.).

SALPINGIDAE

Lissodema cursor GYLL.

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 20.9.1989, 1 Ex. in der Dämmerung fliegend, 5.7.1990, 1 Ex.

Die Meldung von BR bezieht sich auf das heutige Slowenien.

SCRAPTIIDAE

Scaptia fuscula MÜLL.

E

Graz, Eggenberg, Plabutsch, 400 m, 17.1.1986, 1 totes Ex. am Fensterbrett; Stubenberg, Siegersdorf, Kulm, Auerberg, 560 m, 24.7.1992, 1 Ex.; St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 8.6.1993, 1 Ex., 15.8.1993, 1 Ex., alle Lichtenflug.

Anaspis costai EM.

E

St. Anna am Aigen Umg., Waltra-Felsen, 450 m, 30.5.1992, 1 Ex., Horák det.

Bisher erst einige Angaben aus N (FR 1974).

Anaspis flava (L.)

W

Graz, Eggenberg, Plabutsch, 400 m, 17.1.1986, 1 totes Ex. am Fensterbrett; St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 30.5.1991, 4 Ex.; 19.5.1993, 1 Ex., 30.6.1993, 1 Ex., beide Lichtenflug; alle Ex. Horák det.

Nur Angaben aus dem vorigen Jh. (BR) sowie aus Grenzbereichen (Rax, Wechsel), an Wärmestellen jedoch nicht selten.

Anaspis palpalis GERH.

W

Bad Gleichenberg, NSG Steinbruch Klausen, 400 m, 30.5.1992, 5 Ex., Horák det.

Nur Angaben von HO aus dem vorigen Jh.

ADERIDAE

Aderus oculus (PANZ.)

E

St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 23.6.1994, 1 Ex., Horák det.

Erstmeldung für Ö, Angaben für *A. pygmaeus* (DE GEER) könnten sich jedoch auf diese Art beziehen.

MORDELLIDAE

Mordellistena inexpectata ERM. E
Bad Gleichenberg, südl. Rudorfkogel, 270 m, 8.6.1991, 1 Ex., Horák det.
Neu für Ö, lt. ERMISCH 1969 in FHL bisher nur aus Sachsen bekannt.

Mordellistena purpureonigrans ERM. E
Anger, Zetz, Südseite, 1100 m, 13.7.1992, 1 Ex. von Kalkmagerrasen gestreift, Horák det.
Bisher nur aus Wärmegebieten in B und N bekannt.

Mordellistena dieckmanni ERM. E
Bad Gleichenberg, NSG Steinbruch Klausen, 400 m, 30.5.1992, 2 Ex., Horák det.
Bisher nur aus N gemeldet.

Mordellistena koelleri ER. E
Bad Gleichenberg, NSG Steinbruch Klausen, 400 m, 30.5.1992, 1 Ex., Horák det.
Nur wenige Meldungen aus Trockenrasengebieten in B und N.

Mordellistena secreta HORÁK E
Bad Gleichenberg, NSG Steinbruch Klausen, 400 m, 30.5.1992, 2 Ex.; St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 19.5.1993, 2 Ex.; alle Horák det.
Von HORÁK 1983 beschrieben; die Art gehört in die Verwandtschaft von *M. pentas* MULS. Von SCHUH et al. 1992 vom Bisamberg, 26.5.1990, gemeldet.

Von LUCHT 1987 sowie im Katalogteil von FHL/13 noch nicht geführt.

Mordellistena pseudonana ERM. E
Bad Gleichenberg, Rudorfkogel, 300 m, 8.6.1991, 1 Ex., Horák det.
Bisher nur von Trockenrasen in B und N nachgewiesen.

MELANDRYIDAE

Abdera flexuosa (PAYK.) E
Anger, Zetz, Südseite, 1000 m, 4.6.1988, 4 Ex. an einem Holzstoß mit feuchtem verpilztem Buchenholz.

Aus dem vorigen Jh. von BR vermutlich aus dem heutigen Slowenien gemeldet (Spitz leg.). Aus N und B auch nur wenige alte Angaben.

Abdera quadrifasciata (CURT.) E
Bad Gleichenberg, NSG Steinbruch Klausen, 380 m, 30.5.1992, 2 Ex. (1 Ex. Adlbauer leg.) von dünnen Eichenästen geklopft. Bisher erst zwei Fundangaben für Ö (FR. 1974, HC 1983; N, B).

LAGRIIDAE

Lagria atripes ssp. typ. MULS. & GUILL. E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 18.8.1989, 1 Ex.; Bad Gleichenberg, NSG Steinbruch Klausen, 380 m, 30.5.1992, 1 Ex.; St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 9.6.1993, 1 Ex., Lichtanflug.

ALLECULIDAE

Allecula rhenana BACH E
St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 9.6.1993, 1 Ex., Lichtanflug.
Bisher erst zwei Fundangaben für Ö (FR 1974; B, W).

Prionychus melanarius (GERM.) E
St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 15.8.1993, 2 Ex., Lichtanflug; 23.6.1994, 2 Ex., 1.7.1994, 1 Ex.; jeweils bei Nacht durch Ableuchten anbrüchiger Eichenstämme.

Mycetochara axillaris (PAYK.) W
St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 23.6.1994, 1 Ex.
Nur Meldungen aus dem vorigen Jh.: BR, HO.

Mycetochara straussi SEIDL. E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 22.5.1984, 1 Ex.; Anger, Ortsgebiet, 480 m, 26.5.1978, 1 Ex.; beide aus morschem verpilztem Holz.

Erste sichere Funde aus der ST. Bisher nur alte Meldungen von der niederösterreichischen Seite des Wechsels, von der Koralpe (Type) und aus Krumpendorf am Wörthersee.

TENEBRIONIDAE

Alphitophagus bifasciatus (SAY) E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 11.7.1985, 1 Ex. unter faulendem Heu.
Der von BR angegebene Fundort liegt heute auf slowenischem Staatsgebiet.

Palorus depressus (F.) W
St. Johann, Tierpark Herberstein, 24.6.1991, 1 totes Ex. unter Eichenrinde.
Nur von BR aus dem vorigen Jh. gemeldet.

Menephilus cylindricus (HBST.) W
Graz, Eggenberg, Plabutsch, 400 m, 1.10.1986, 4 Ex. in alten Zaunpfählen aus Lärchenholz.

Die bisher einzige Angabe für ST stammt ebenfalls aus der Umgebung von Graz (1 Ex., Tax leg., FR 1974).

Tenebrio opacus DUFT.

E

St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 6.9.1993, 6 Ex.; 30.7.1993, 2 Ex. aus trockenem Mulm einer hohlen Eiche.

Der von BR gemeldete Fundort liegt im heutigen Slowenien.

SCARABAEIDAE

Hoplia praticola DUFT.

E

Anger, Oberfeistritz, 450 m, 28.5.1986, 5 Ex. auf Blüten von *Viburnum opulus*, Adlbauer vid.

Auch Mauerhofer hat diese Art im Raum Anger gefunden.

LUCANIDAE

Aesalus scarabaeoides (PANZ.)

E

St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 9.6.1993, 2 Ex. durch Lichtenflug.

Von BR aus dem heutigen Slowenien gemeldet.

CERAMBYCIDAE

Leioderes kollari REDT.

E

Weizklamm, Jägersteig, 750 m, 14.1.1995, 3 Ex. ex larva; 18.1.1995, 1 Ex. e.l., aus Holz von *Ostrya carpinifolia*, das aus exponierter, sonniger Lage der Weizklamm eingetragen wurde.

1 Ex. in coll. Adlbauer.

Bisher nur wenige Angaben aus Ö. Der von BR gemeldete Fundort liegt im heutigen Slowenien.

Phytoecia uncinata (REDT.)

E

Bad Gleichenberg, Rudorfkogel, 270 m, 8.6.1991, 1 Ex. auf *Cerinth minor*.

Von ADLBAUER 1994 bereits publiziert.

CHRYSOMELIDAE

Pachybrachis tessellatus (OL.)

W

St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 23.6.1994, 1 Ex. von dürrem Eichenlaub geklopft.

Nur von BR aus dem vorigen Jh. gemeldet.

Cryptocephalus exiguus SCHNEID.

W

Pöls/Wieserbahn, Kaiserwald, 330 m, 9.6.1990, 1 Ex.

Nur eine alte Angabe aus der Umgebung von Graz (FR).

Galerucella nymphaeae sagittariae GYLL. E
Stubenberg, Schielleitner Teiche, 350 m, 24.4.1983, 1 Ex. von Wasserpflanzen gestreift.

Nach FR bisher erst zwei Angaben für Ö; JAKOB 1979 meldet die Art für Ö.

Phyllotreta astrachanica LOPATIN E
Anger, Zetz, Wittgruber, 900 m, 5.6.1993, 1 ♂, Döberl det.

Bisher nur aus N bekannt, auch von mir in N gesammelt (Hundsheim, Spitzerberg), von *Ph. diademata* FOUDRAS. und *Ph. atra* FBR. nur durch Genitaluntersuchung zu trennen.

Longitarsus noricus LEONARDI E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 17.9.1987, 1 ♂, Döberl det.

Von mir auch in N (Hundsheim, Spitzerberg) festgestellt.

Longitarsus scutellaris (REY) W
St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 17.7.1992, 1 ♂ (immatur), Döberl det.

Eine Meldung aus dem Grenzgebiet zu O (Totes Gebirge, ohne genauere Angabe) und eine alte Angabe aus Maria Trost sind bekannt (FR).

Longitarsus ganglbaueri HKTR. W
St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 19.5.1993, 1 Ex., Döberl det.

Nur eine Angabe aus dem vorigen Jh. in FR: Umgebung Graz, Penecke leg.

Minota carpathica HKTR. E
Strallegg, Wildwiese, 1000 m, 15.8.1983, 1 Ex.; Anger, Zetz, 900 m–1100 m, zahlreiche Funde seit 1987 (Mai bis August), alle Ex. Döberl det.

Vermutlich überall verbreitet, aber früher als ssp. von *M. obesa* (WALTL) nicht gesondert ausgewiesen.

Minota halmae (APFLB.) E
Anger, Zetz, Südseite, 1100 m, 15.5.1992, 1 Ex., Döberl det.

Psylliodes brisouti BEDEL E
Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1100 m, 21.7.1989, 1 ♂, Döberl det.

BRUCHIDAE

Bruchus affinis FRÖL. W
Graz, Reinerkogel, 500 m, 23.5.1986, 1 Ex., Strejcek det.

Nach HO 1951 existiert eine alte Meldung aus der ST. Diese konnte jedoch nicht eruiert werden.

Bruchus sibiricus occidentalis LUKJ. & TER-M. E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 28.6.1988, 2 Ex., Strejcek det.
Erstmeldung für Ö.

Bruchidius cisti (F.)

W

Anger, Zetz, Pointnergraben, 27.6.1981, 1 Ex. Mauerhofer leg.; Anger, Zetz, Südseite, 1100 m, 19.7.1989, 1 Ex., beide Strejcek det.

Nur von BR aus dem vorigen Jh. gemeldet.

Bruchidius imbricornis (PANZ.)

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 20.4.1992, 1 Ex.

Nur Meldung aus dem vorigen Jh. von BR, die sich vermutlich auf das heutige Slowenien bezieht (Spitzky leg.).

Bruchidius lividimanus (GYLL.)

E

Bad Gleichenberg, NSG Steinbruch Klausen, 400 m, 30.5.1992, 1 Ex.; St. Anna/Aigen Umg., Waltra-Felsen, 450 m, 30.5.1992, 2 Ex.

Bisher nur aus B gemeldet.

Bruchidius ganglbaueri SCHILSKY

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 30.5.1984, 4 Ex.; 31.5.1984, 2 Ex.; alle Strejcek det.; 2.7.1988, 1 Ex.

Erstmeldung für Ö. Von LUCHT 1987 und im Katalogteil von FHL/14 noch nicht geführt.

Acanthoscelides obtectus (SAY)

E

Anger, Ortsgebiet, 480 m, 20.12.83, 26 Ex.; 5.7.1989, 1 Ex.; Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 25.2.1994, zahlreich; alle Ex. an Bohnenvorräten.

Wurde mit Hülsenfrüchten importiert, hat sich bei uns eingebürgert und entwickelt sich häufig bereits im Freiland, besonders an Bohnen.

ANTHRIBIDAE

Ulorhinus bilineatus (GERM.)

W

Anger, Floing, Ruine Neuhaus, 600 m, 25.6.1980, 1 Ex.; Kapfenstein, Burgberg, 450 m, 13.5.1993, 1 Ex.

Nur von FR eine alte Angabe aus Graz.

Phaeochrotes cinctus (PAYK.)

E

Bad Gleichenberg, NSG Steinbruch Klausen, 380 m, 30.5.1992, 4 Ex.; St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 18.8.1994, 1 Ex.; von dünnen Eichenästen geklopft; Messendorfberg, Graz-St. Peter, 430 m, 7.6.1992, 3 Ex. von *Quercus* geklopft, K. Adlbauer leg., coll. LMJ.

Nur aus dem vorigen Jh. von BR gemeldet, vermutlich aus dem heutigen Slowenien (Spitzky leg.).

SCOLYTIDAE

Scolytus intricatus (RATZ.)

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 14.7.1984, 1 Ex.; 2.8.1988, 2 Ex.; 12.8.1988, 1 Ex., Lichtanflug; 30.6.1994, 1 Ex., alle Holzschuh det. Entwicklung dieser Ex. in Hecke mit

Carpinus betulus. St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, Mai/Juni, mehrfach an liegenden Eichenstämmen.

Scolytus triarmatus EGGERS E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 28.9.1987, 1 Ex., det./in coll. Holzschuh.

Hylesinus oleiperda (FABR.) E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 5.8.1989, 1 Ex. aus Brennholz (Esche), Holzschuh det.
Bisher nur aus N bekannt.

Leperisinus orni ssp. typ. (FUCHS) E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 20.4.1985, 1 Ex.; 9.3.1990, 1 Ex.; beide Holzschuh det.

Hylastinus obscurus (MARSH.) E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 10.5.1983, 3.5.1984, 10.5.1989, 22.6.1991, 3.5.1993, je 1 Ex.; an *Trifolium pratense*; alle Ex. Holzschuh det.

Pteleobius vittatus (F.) W
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 15.5.1992, 1 Ex., Holzschuh det.
Nur Angabe von BR aus dem vorigen Jh.

Dryocoetes villosus (F.) W
Siegersdorf, Geierwand, 600 m, 11.3.1990, 3 Ex.; St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 24.6.1991, 2 Ex.; 24.9.1992, 3 Ex.; alle an alten Eichenstöcken, Holzschuh det.

Ernoporus tiliae (PANZ.) E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 6.7.1987, 1 Ex. von *Carpinus betulus* (Hecke) geklopft, Holzschuh det.
Die Angabe von BR bezieht sich auf St.Leonhard bei Marburg.

Pityogenes bistridentatus (EICHH.) E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 13.6.1983, 1 Ex., Holzschuh det.
Früher als Syn. von *P. conjunctus* Rtt. geführt, erste sichere Angabe für ST.

Xyleborus saxeseni (RATZ.) W
Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1100 m, 14.7.1983, 1 Ex.; Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 3.5.1984, 15.5.1986, je 1 Ex.; St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 18.8.1994, 1 Ex.; alle Holzschuh det.
Nach FR existiert ein Ex. aus dem vorigen Jh. aus der Umg. von Peggau im Landesmuseum für O.

PLATYPODIDAE

Platypus cylindrus (F.) W
Anger, Bahndamm Richtung Steg, 500 m, 30.10.1988, 19.4.1991; St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 24.6.1991, 17.7.1992, 19.5.1993, jeweils zahlreich unter Eichenrinde. Anger, Ortsgebiet, 480 m, 1.7.1994, 1 Ex.

Nur Angaben aus dem vorigen Jh. von BR, wahrscheinlich in ST überall verbreitet, wo es alte Eichenbestände gibt.

APIONIDAE

Rhopalapion longirostre (OL.)

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, erstmals am 8.5.1993 festgestellt, seither immer wieder Massenaufreten an *Althaea rosea* (Mai bis August).

Protapion interjectum DESBR.

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 20.5.1987, 3., 12., 25.5.1991, 15.5.1992, zahlreich von *Trifolium* sp. gestreift, alle Suppantšitsch det.

Die Art wurde früher als Rasse von *A. trifolii* (L.) angesehen.

Catapion jaffense (DESBR.)

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 28.4.1983, 1 Ex., Fremuth det.

Bisher nur aus B und N bekannt.

Trichapion simile KIRBY

E

Bad Gleichenberg, südlich Rudorfkogel, 270 m, 8.6.1991, 1 Ex., Suppantšitsch det.

Eine Meldung in FR aus dem Salzkammergut (1879) ohne genauere Fundangabe.

Ischnoptera pion aeneomicans WENCK.

E

Bad Gleichenberg, Rudorfkogel, 300 m, 8.6.1991, 1 Ex., Suppantšitsch det.

Hemitrichapion reflexum GYLL.

E

Anger, Zetz, Südseite, 1100 m, 19.7.1989, 1 Ex. von Kalkmagerrasen gestreift, Suppantšitsch det.

Microon sahlbergi SAHLBG.

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 5.6.1988, 1 Ex. von Pflanzen an Tümpelufer gestreift, Dieckmann vid.

Nicht in FR. Von LUCHT 1987 jedoch für Ö bereits angegeben.

CURCULIONIDAE

Otiorhynchus megerlei (F.)

E

Rettenegg, Pfaffenbach, 1100 m, 8.6.1974, 1 Ex., Mauerhofer leg., Dieckmann det.; Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1100 m, 5.6.1983, 2.6.1984, 4.6.1988, je 1 Ex. von *Petasites albus* gestreift; Anger, Zetzwiese, 1275 m, 26.5.1982, 8.6.1986, je 1 Ex., alle Behne vid. Wegen der Verwechslung mit *O. chrysops* (HBST.) noch keine sicheren Meldungen für ST. ♂♂ durch die Bildung der Penis Spitze eindeutig unterscheidbar.

Otiorhynchus squamosus MILL.

E

Teichalpe, 1200 m, 14.6.1979, 1 Ex., Holzschuh det.; Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1100 m, 14.7.1988, 1 ♂; Anger, Baierdorf, Falkenbauer, 900 m, 13.8.1993, 1 ♂; Seetaler Alpen, Zirbitzkogel, 1800 m, 6.8.1994, 1 ♂, 1 ♀ in Kopula.

Alle Ex. von krautiger Vegetation in Waldlichtungen gestreift.

♀ kaum von der Art *O. salicis* STROEM., die sich parthenogenetisch vermehrt, zu unterscheiden. Die Meldung von BR kann daher nicht als gesichert angesehen werden.

Otiorhynchus sulcatus (F.)

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 20.5.1983, 5.6.1985, 15.5.1986, 16.3.1988, 10.5.1992, je 1 Ex.; Anger, Hauptschule, 470 m, 12.4.1985, 1 Ex.; Graz, Eggenberg, Plabutsch, 400 m, 17.1.1986, 1 Ex.; alle Ex. in unmittelbarer Nähe von Gebäuden am Boden. Anger, Oberfeistritz, 450 m, 20.4.1991, 1 Ex. aus Blumentopf mit Zierpflanze geschlüpft.

Lt. DIECKMANN 1980 durch Gärtnereien mittels Topfpflanzen verbreitet. In Gewächshäusern durch Larvenfraß oft schädlich.

In BR aus St. Leonhard bei Marburg angegeben.

Otiorhynchus crataegi GERM.

E

Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 1.11.1981, 9.4.1983, 10.11.1984, 20.6.1994, je 1 Ex. in Hausnähe. Nachtaktiv an Flieder und anderen Sträuchern.

Phyllobius vespertinus (F.)

E

Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1000 m, 14.5.1985, 1 Ex., Fremuth det.; Anger, Zetz, Südseite, 1100 m, 16.6.1991, 1 ♂, Behne det.

Bisher nicht von *Ph. pyri* (L.) getrennt. Wahrscheinlich auch in ST nicht selten, bisher jedoch nur aus N und B gemeldet (HC).

Polydrusus corruscus GERM.

E

Anger, Ortsgebiet, 480 m, 10.7.1976, 1 Ex., Fremuth det.; Anger, Floing, Feistritz-Altarm, 440 m, 8.5.1989, 1 Ex.; Pöls/Wieserbahn, Kaiserwald, 330 m, 9.6.1990, 1 Ex.; beide Behne det.

Alle Ex. von *Salix* sp. gestreift.

Sitona macularius (MARSH.)

W

Anger, Zetzbachgraben, 550 m, 31.5.1984, 1 Ex., Holzschuh det.; Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 6.5.1986, 1 Ex. auf *Trifolium*; Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1100 m, 4.7.1988, 1 Ex.; Anger, Zetz, Südseite, 1100 m, 19.7.1989, 1 Ex., Behne det.; Bad Gleichenberg, NSG Steinbruch Klausen, 380 m, 30.5.1992, 1 Ex.

BR bringt nur Angaben aus dem vorigen Jh.

Larinus obtusus GYLL.

W

Graz, Reinerkogel, 450 m, 15.6.1979, 3 Ex., Holzschuh det.; Graz, Gaisberg, 600 m, 10.6.1980, 1 Ex., Holzschuh det.; Graz, Platte, 400 m, 15.7.1985, 4 Ex. auf *Centaurea*; Siegersdorf, Hoferberg, 550 m, 28.8.1991, 1 Ex.; Siegersdorf, Kulm, Auerberg, 560 m, 24.7.1992, 1 Ex.

Alle Ex. auf Disteln in sonnenexponierter Lage.

Ebenfalls nur von BR aus dem vorigen Jh. gemeldet.

Phloeophagus lignarius (MARSH.) E
Anger, Zetz, Flach, 1100 m, 10.3.1987, 1 Ex. mit Brennholz eingetragen; St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 24.6.1991, 1 Ex. im Splintholz eines toten Eichenstammes.

Smicronyx brevicornis SOL. E
Bad Gleichenberg, Rudorfkogel, 300 m, 8.6.1991, 1 ♂, Behne det.

Lignyodes bischoffi (BLATCH. et LENG) E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 20.8.1992, 1 Ex. Lichtanflug, Suppantshitsch det.
Von mir 1980 erstmals für Ö in St. Andrä (B) festgestellt:
Massenanflug an Zeltwand in der Dämmerung.

Lt. HC 1995 vermutlich mit Eschensamen aus N-Amerika importiert.

Magdalis flavicornis (GYLL.) E
Mureck, Gosdorf, Murauen, 230 m, 28.5.1988, 1 Ex.; Bad Gleichenberg, NSG Steinbruch Klausen, 400 m, 20.5.1992, 1 Ex.; beide von Eichen geklopft.

Die Meldung aus dem vorigen Jh. von BR (Spitzzy leg.) dürfte sich auf das heutige Slowenien beziehen.

Hypera striata (BOH.) E
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 15.11.1990, 1 Ex., Behne det.

Bisher nur wenige Meldungen aus B, N, W.

Phytobius leucogaster (MARSH.) W
Anger, Auersbachsiedlung, 500 m, 3.5.1993, 1 Ex.

Nur von BR aus dem vorigen Jh. gemeldet.

Ceutorhynchus ignitus GERM. E
St. Johann, Tierpark Herberstein, 400 m, 19.5.1991, 1 Ex. von Trockenrasen gestreift.

Die Meldung von BR bezieht sich auf das heutige Slowenien.

Oprohinius suturalis (F.) E
Anger, Zetzbachgraben, 500 m, 10.4.1981, 1 Ex., Holzschuh det.

Rhynchaenus pseudostigma T. E
Ramsau, Silberkarklamm, 1400 m, 24.7.1985, 1 Ex., Fremuth det.

Erstmals in FHL/14 für Ö angegeben.

Rhampus subaeneus ILL. E
Anger, Zetz, Wrede-Weg, 1100 m, 4.7.1988, 1 Ex.; Bad Gleichenberg, Rudorfkogel, 300 m, 8.6.1991, 2 Ex. von blühendem *Crataegus* geklopft, Behne det.; St. Anna/Aigen Umg., Waltra-Felsen, 400 m, 30.5.1992, 1 Ex., Behne det.

Literatur

- ADLBAUER K. 1994. 1. Nachtrag zur Bockkäferfauna unter dem Aspekt der Artenbedrohung (Col., Cerambycidae). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 48: 41–62.
- BRANCSIK C. 1871. Die Käfer der Steiermark. — Cisar, Graz.
- DIECKMANN L. 1980. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Col.-(Brachycerinae, Otiiorhynchinae, Brachyderinae). — Beitr. Ent., Berlin, 30(1): 145–310.
- FRANZ H. 1970, 1974. Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt, 3, 4. — Wagner, Innsbruck.
- FREUDE H., HARDE K. W. & LOHSE G. A. 1965–1983. Die Käfer Mitteleuropas, 1–11. — Goecke & Evers, Krefeld.
- HOLZSCHUH C. 1971, 1983. Bemerkenswerte Käferfunde in Österreich, 1, 3. — Mitt. Forstl. Bundesversuchsanstalt Wien, 94: 3–65 und 148: 3–81.
- HOLZSCHUH C. 1977. Bemerkenswerte Käferfunde in Österreich, 2. — Koleopt. Rdsch., 53: 27–69.
- HOLZSCHUH C. 1995. Forstschädlinge, die in den letzten 50 Jahren in Österreich eingewandert sind oder eingeschleppt wurden. — Kat. des OÖ. Landesmus., NF, 84: 129–141.
- HORION A. 1941. Faunistik der deutschen Käfer, 1. — Goecke, Krefeld.
- HORION A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas, 1, 2. — Kernen, Stuttgart.
- HORION A. 1949–1974. Faunistik der Käfer Mitteleuropas, 2–9, 12. — Klostermann, Frankfurt/Main; Mus. Frey, Tutzing; Überlingen/Bodensee.
- JAKOB H. 1979. Teil XVp: Fam. Chrysomelidae. Catalogus Faunae Austriae. — Österr. Akad. Wiss., 36 pp.
- KIEFER H. & MOOSBRUGGER J. 1940–1942. Beitrag zur Coleopterenfauna des steirischen Ennstales und der angrenzenden Gebiete. — Mitt. Münchner Ent. Ges., 30(3): 787–806.
- KODERMANN C. 1865–1868. Die Käfer der St. Lambrechtger Gegend in Obersteiermark. — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 3: 89–123, 4: 32–67, 5: 56–60.
- KREISSL E. 1981. Die in der Steiermark gefährdeten Käferarten (Coleoptera). — In: GEPP J., Rote Listen gefährdeter Tiere der Stmk., Graz, 63–78.
- LOHSE G. A. & LUCHT W. H. 1989–1994. Die Käfer Mitteleuropas, 12–14, Suppl. 1–3. — Goecke & Evers, Krefeld.
- LUCHT W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. — Goecke & Evers, Krefeld.
- SCHEDL K. E. 1980. Teil XVy: Fam. Scolytidae und Platypodidae. Catalogus Faunae Austriae. — Österr. Akad. Wiss., 24 pp.
- SCHERPELTZ O. 1968. Teil XVfa: Fam. Staphylinidae. Catalogus Faunae Austriae. — Österr. Akad. Wiss., 91 pp.
- SCHUH R., SCHILLHAMMER H. & ZETTEL H. 1992. Bemerkenswerte Käferfunde aus Österreich. — Koleopt. Rdsch., 62: 219–224.

Anschrift des Verfassers: Erwin HOLZER
A-8184 Anger 204.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [49_1995](#)

Autor(en)/Author(s): Holzer Erwin

Artikel/Article: [Erstnachweise und Wiederfunde für die Käferfauna der Steiermark \(Coleoptera\) 23-47](#)