

# monticola

Organ der Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie

---

Band 1

Innsbruck, 1. Mai 1968

Nummer 13

---

## Die Vogelwelt der schweizerischen Nordalpenzone

1. Nachtrag

ULRICH A. CORTI, ZÜRICH

Seit der Herausgabe meiner „Vogelwelt der schweizerischen Nordalpenzone“ (Chur, 1952) sind nunmehr gut 15 Jahre verstrichen. Es versteht sich von selbst, daß die ornithologische Forschung auch in diesem Zeitraum und besonders in einem so weitläufigen Gebiet nicht geruht hat, so daß sich die Abfassung von Nachträgen aufdrängt, um allmählich einen Überblick über den derzeitigen Stand unseres Wissens zu ermöglichen. Die zahlreich vorhandenen Ergebnisse neuerer Beobachtungstätigkeit sind nämlich derart weit — namentlich in Fachzeitschriften — verstreut, daß man sich nur mit größter Mühe ein Bild von den erzielten Fortschritten machen kann. Ein noch nicht fertiggestelltes Verzeichnis der seit 1951/52 erschienenen Publikationen, welche sich mit der Avifauna und Ornis der helvetischen Nordalpenzone befassen, zählt z. Zt. schon weit über 500 Nummern, wozu noch ungezählte Einzeldaten kommen!

Es ist klar, daß es immer weniger möglich wird, das gesamte Datenmaterial in extenso in eine Kompilation einzubziehen. Der Bearbeiter der veröffentlichten ornithologischen Notizen sieht sich vielmehr vor die Aufgabe gestellt, aus dem Gegebenen einen Extrakt zu gewinnen, welcher mindestens die Fortschritte in unserer Erkenntnis der wesentlichen Zusammenhänge zwischen den Einzelfeststellungen möglichst deutlich zur Darstellung bringt.

Im vorliegenden ersten Nachtrag findet sich notizenhaft eine Reihe eigener Beobachtungen aus der Nordalpenzone nebst einer Anzahl Daten niedergelegt, die mir von anderer Seite zur Veröffentlichung anvertraut wurden. Den Herren E. CARRARA (Zürich), A. HAKIOS (Zürich), U. HAMMER (Heidelberg), Dr. W. LEUTHOLD (Zürich), A. K. MÜLLER (München), A. SCHWAB (Luzern), Dr. E. SUTTER (Basel) und O. WOLCKNER (Zürich) schulde ich dafür besten Dank.

Anchrift des Verfassers:

Dr. U. A. Corti,  
Waldschulweg 6, CH-8032 Zürich

Kolkrabe, *Corvus corax*. Am 20./21. Juni 1959 zwei K. im Urner Boden GL; W. Leuthold. — Am 27. Mai 1962 ein Ex. am Schnebelhorn ZH; U. A. Corti u. B. — Am 3. Oktober 1963 sieben K. bei Sonnenhalb-Helchen AI auf einen Schuß hin aus alter Esche abfliegend; am folgenden Tage 1 Ex. auf Kräzeren (Schwägalp AI) bei 1300 m und 1 Ex. bei zirka 1650 m auf der Ebenalp AI rufend. — Am 6. Oktober 1963 zwei K. beim Eggli, 1190 m ü. M., ob Weißbad AI; U. A. Corti, Oberes Toggenburg SG: Sommer 1956, 1957 und 1958: K. mehrfach beobachtet, 2 Ex. zusammen; W. Leuthold. — Am 31. März 1956 ein Ex. auf der Schwägalp am Säntis, 1500 m, am 11. April 1956 ein K. bei Einsiedeln SZ und am 20. August 1960 ein Ex. auf der Gotthardpaßhöhe; U. Hammer (Heidelberg).

Rabenkrähe, *Corvus corone*. Am 20./21. Juni 1959 R. im Urner Boden; W. Leuthold. — Schnebelhorn ZH, 1200 m, 2 R. am 27. Mai 1962; U. A. Corti u. B. — Weißbad AI: 2. — 7. Oktober 1963, R. mehrfach, vereinzelt und in kleinen Trupps von 820 bis 1190 m ü. M. festgestellt. Am 5. Oktober 1963 in Wiesen am oberen Ende des Scalpsees AI 12 R.; U. A. Corti. — Oberes Toggenburg SG: Sommer 1956, 1957 und 1958, R. nur in Siedlungsnähe, jedoch ziemlich zahlreich; W. Leuthold.

Elster, *Pica pica*. Simmental BeO, Boden bei Lenk, 1000 m ü. M.: vom 19. August bis 7. September 1962 regelmäßig 2 E. nahrungssuchend. — Bühlberg oberhalb Lenk, 1700 m, 20. August 1962: 1 E. in lichtem Tannenwald. — Am 26. August 1962 auf zirka 1500 m im Fermeltaal, zwischen Gruben und Fermelläger 1 E. in dichtem Tannenwald (11 Uhr), um etwa 17 Uhr ebenda 2 Ex.; E. Carrara. — Weißbad AI: 3. Oktober 1963, 1 Ex., am folgenden Tage 2 Ex.; U. A.

Corti. — Oberes Toggenburg SG: Sommer 1956, 1957 und 1958, eine E. am 31. Juli 1958 bei 1050 m (einzige Beobachtung); W. Leuthold.

Eichelhäher, *Garrulus glandarius*. Oberes Toggenburg SG: Sommer 1956, 1957 und 1958. Die E. kommen in spärlicher Anzahl bis zirka 1400 m ü. M. vor; W. Leuthold. — Sonnenhalb-Helchen ob Weißbad AI: 2. Oktober 1963, mehrere E. und rufende Ex. bei Lehmen gegen Pottersalp, am folgenden Tage 1 Ex. bei Weißbad sowie mehrere Indiv. bei Kräzeren (Schwägalp) rufend. Am 5. Oktober 1963 zwei E. bei Weißbad überhinfliedig; U. A. Corti.

Arvenhäher, *Nucifraga caryocatactes*. Oberes Toggenburg SG: Sommer 1956, 1957 und 1958, A. nur ganz vereinzelt beobachtet: 30. Juli, 2. und 3. August 1957 sowie 25. Juli 1958 je 1 Ex.; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, A.; W. Leuthold. — Weißbad AI: 2. Oktober 1963, 1 Ex., 820 m, ein weiteres Ex. bei Brülisau, 920 m. Am folgenden Tage pflücken 4 A. unmittelbar bei Häusern von Weißbad still Nüsse in mächtigen Haselsträuchern. Weitere Ex. überall vereinzelt, hoch streichend; U. A. Corti.

Alpendohle, *Pyrrhocorax graculus*. Oberes Toggenburg: Sommer 1956, 1957 und 1958, A. sehr zahlreich. Sie wechselt bei schlechtem Wetter in tiefere Lagen und ist dann auf Wiesen im Dorf Wildhaus in Menge zu sehen, während sich bei schönem Wetter nur wenige Ex. im Dorf aufhalten; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, A.; W. Leuthold. — Am 9. Oktober 1959 kreisten um 12 Uhr (sonnig, warm) etwa 12 ad. und 2 juv. A. um den Gipfel des Fronalpstocks bei Brunnen SZ. Sie waren sehr zutraulich. Minimale Fluchtdistanz 40 cm; die Jungvögel waren am zutraulichsten. Die A. fraßen in großer Nähe Brot und Apfels-

reste. Gangart: Schreiten, bei größerer Eile oder auf stark abfallendem Boden Hüpfen; A. Hakios. — Am 4. Oktober 1963 auf Ebenalp AI, zirka 1650 m, mind. 2 ad. und ein jüngeres Indiv. mit schwärzlicher Schnabelspitze. Am folgenden Tage etwa 1 Dutzend A. in Appenzell, ferner zirka 50 Indiv. in Weißbad, 820 m, überhinfließend. Gleichtags zirka 6 A. an den Hängen ob dem Seetalpsee. Am 7. Oktober 1963 um 15.30 Uhr 14 A. über Weißbad hoch Richtung Alpstein fliegend; U. A. Corti.

Star, *Sturnus vulgaris*. Am 29. Juli 1958 etwa 10 Ex. in einer frisch gemähten Heuwiese bei Schwende, zirka 1100 m, im oberen Toggenburg SG; W. Leuthold. — Strahlegg ZH, 1050 m, 27. Mai 1962, Star bei der Nisthöhle; U. A. Corti u. B. — Sonnenhalb-Helchen ob Weißbad AI, 3. Oktober 1963, Trupp von 7 St. Richtung Alpsiegel fliegend. Am nächsten Tage Trupp von zirka 50 St. in Weißbad AI auf Fichte und Leitungsdrähten. Am 5. Oktober 1963 Stare bei Appenzell; U. A. Corti.

Grünfink, *Chloris chloris*. Oberes Toggenburg (Wildhaus) SG: Sommer 1956, 1957 und 1958: G. im Siedlungsgebiet ziemlich zahlreich; W. Leuthold. — Am 3. Oktober 1963 zwei G. bei Lehmen AI, gegen Pottersalp, auf Spitze einer alten Fichte. Am folgenden Tage G. in Weißbad AI, am 6. Oktober 1963 G. auf Eggli, 1190 m, ob Weißbad; U. A. Corti.

Distelzeisig, *Carduelis carduelis*. Am 10. Juli 1955 zwei D. beim „Waldli“ oberhalb Wasserwendi-Hasleberg BeO, etwa 1250 Meter; A. Hakios — Oberes Toggenburg SG: Sommer 1956, 1957 und 1958: D. zahlreich im Siedlungsgebiet und in der näheren Umgebung bis zirka 1300 m ü. M.; W. Leuthold.

Erlenzeisig, *Carduelis spinus*. Am 20./21. Juni 1959 E. recht zahlreich im Wängwald (Urner Boden); W. Leuthold.

Birkenzeisig, *Carduelis flammea*. Urner Boden, 20./21. Juni 1959, B. spärlich; W. Leuthold.

Zitronfink, *Chloroptila citrinella*. Oberes Toggenburg SG (Wildhaus); Sommer 1956, 1957, 1958, Z. ziemlich zahlreich in locker bewaldetem Weidegebiet, bis 2000 m; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, Z. recht zahlreich im Wängwald; W. Leuthold. — Am 4. Oktober 1963 auf der Ebenalp AI 20 — 25 Z. bei zirka 1650 m; U. A. Corti.

Bluthänfling, *Linota cannabina*. Gegend von Wildhaus SG, 1. August 1958, 5 bis 6 B. auf 1350 m; W. Leuthold.

Gimpel, *Pyrrhula pyrrhula*. Gegend von Wildhaus SG, Sommer 1956, 1957, 1958, G. stark an Fichtenwald gebunden, dort aber gut vertreten; W. Leuthold. — Urner Boden GL: 20./21. Juni 1959, G. gut vertreten; W. Leuthold. — Schnebelhorn ZH, 1200 m, G. am 27. Mai 1962; U. A. Corti u. B. — Am 4. Oktober 1963 G. auf Kräzernen (Schwägalp), 1300 m, rufend; U. A. Corti.

Fichtenkreuzschnabel, *Loxia curvirostra*. Urner Boden: 20./21. Juni 1959, F. gut vertreten; W. Leuthold. — Weißbad AI, 6. Oktober 1963, 3 F. (1 rotes ♂) auf Eggli, 1190 m; U. A. Corti.

Buchfink, *Fringilla coelebs*. Wildhaus SG, Sommer 1956, 1957, 1958, B. zahlreich in locker bewaldetem Gebiet; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, B.; W. Leuthold. — Strahlegg ZH: 27. Mai 1962, B., auch am Schnebelhorn bei 1200 m wahrgenommen; U. A. Corti u. B. — Weißbad AI, 2. Oktober 1963, einige B.—♂ auf Fahrstraße (regnerisch). Am folgenden Tag bei Sonnenhalb-Helchen viele B., 1 ♀. Am 4. Oktober 1963 B.-Zug auf Kräzernen (Schwägalp), 1300 m (sehr schön), um 10.45 Uhr, Richtung Rietbad; U. A. Corti.

**Goldammer, *Emberiza citrinella*.** Wildhaus SG, Sommer 1956, 1957, 1958, G. nur wenig beobachtet; am 14. Juli 1958 an zwei Stellen, am 31. Juli 1958 auf 1300 Meter; W. Leuthold. — Am 5. Oktober 1963 eine G. ob Bühlai AI; U. A. Corti.

**Haussperling, *Passer domesticus*.** Wildhaus SG, Sommer 1956, 1957, 1958, H. nur im Siedlungsgebiet; W. Leuthold. — Weißbad AI: 2. Oktober 1963, H., ebenso 2 Tage später; U. A. Corti.

**Feldsperling, *Passer montanus*.** Simmental BeO: 7. September 1962, 12 F. bei unbewohntem Haus oberhalb Boden, zirka 1100 m; E. Carrara.

**Schneesperling, *Montifringilla nivalis*.** Gotthardpaßhöhe, 20. August 1960, 3 Ex.; U. Hammer (Heidelberg), in litt.

**Baumpieper, *Anthus trivialis*.** Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, B. bis zirka 1400 m gut vertreten; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, B. bis zirka 1800 m ansteigend; W. Leuthold. — Schnebelhorn ZH: 27. Mai 1962, B. bei etwa 1150 m; U. A. Corti u. B.

**Bergpieper, *Anthus spinosetta*.** Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, B. zahlreich, vor allem in höheren Lagen; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, B. zahlreich; W. Leuthold. — Kräzeren (Schwägalp) AI, 1300 m, 4. Oktober 1963, 3—4 B. in mooriger Niederrung. Gleichtags einige B. auf der Ebenalp, zirka 1650 m. Am 5. Oktober 1963 vier B. am Seelalpsee und am 6. Oktober 1963 B. auf Eggli, 1190 m, ob Weißbad; U. A. Corti.

**Bergstelze, *Motacilla cinerea*.** Oberes Toggenburg SG: B. im Sommer 1956, 1957, 1958 auf dem Lauälpli, 1100 m, beobachtet, am 15. August 1957 ein Ex. bei Lisighaus; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, B.; W. Leuthold. — Wasserauen, 3. Oktober 1963, 1 B., ferner je 1 Ex. am 5. Oktober 1963 am

Seelalpsee und am 7. Oktober 1963 in Weißbad; U. A. Corti.

**Bachstelze, *Motacilla alba*.** Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, B. vorwiegend im Siedlungsgebiet bis zirka 1300 m; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, B. — Weißbad AI: 2. Oktober 1963, ziemlich viele, B. aber nur neben weidenden Rindern und Kühen; am folgenden Tage B. bei Sonnenhalb-Helchen AI und am 4. Oktober 1963 1 B. bei Weißbad, ebenso am 5. Oktober 1963 in Hotelpark; U. A. Corti.

**Waldbaumläufer, *Certhia familiaris*.** Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957 und 1958, einzige Beobachtung am 1. August 1957; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, W.; W. Leuthold.

**Kleiber, *Sitta caesia*.** Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, K. nur wenige Male festgestellt, bis zirka 1400 m; W. Leuthold. — Strahlegg ZH: 27. Mai 1962, K.; U. A. Corti u. B.

**Kohlmeise, *Parus major*.** Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, K. spärlich und nur im Siedlungsgebiet; W. Leuthold. — Weißbad AI: 3. Oktober 1963, 1 K., ein weiteres Ex. auf Sonnenhalb-Helchen. Am 5. Oktober 1963 in Weißbad 1 Ex. in Hotelpark; U. A. Corti.

**Tannenmeise, *Parus ater*.** Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, T. sehr zahlreich in Nadelwald; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, T. zahlreich; W. Leuthold. — Lehmen, gegen Potersalp AI, 3. Oktober 1963 T. Rufe. Kräzeren (Schwägalp), 1300 m, 4. Oktober 1963, T.; U. A. Corti.

**Haubenmeise, *Parus cristatus*.** Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, H. nicht oft beobachtet; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, H. spärlich; W. Leuthold. — Ebenalp AI, zirka 1650 Meter, 4. Oktober 1963, 1 H. im Legföhrengürtel; U. A. Corti.

Nonnenmeise, *Parus palustris*. Strahlegg ZH: 27. Mai 1962, N. bei 1050 m; U. A. Corti u. B.

Mönchsmeise, *Parus montanus*. Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, M. überall in geringer Anzahl im zusagenden Biotop auftretend; W. Leuthold. — Rigi-Stafel, 1604 m: 11. Februar 1958, 6 M. auf Baum und Futterstelle; O. Wölkner. — Lehmen gegen Pastersalp AI: 3. Oktober 1963, 1 M.; U. A. Corti.

Wintergoldhähnchen, *Regulus regulus*. Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, W. eher spärlich vertreten; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, W.; W. Leuthold. — Strahlegg ZH, 1140 m, 27. Mai 1962, W., ebenso am Schnebelhorn bei 1200 m; U. A. Corti u. B. — Sonnenhalb-Helchen ob Weißbad AI, 3. Oktober 1963, 1 W. auf Fichte; U. A. Corti.

Sommergoldhähnchen, *Regulus ignicapillus*. Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, S. öfters beobachtet als Wintergoldhähnchen; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, S.; W. Leuthold.

Dornwürger, *Lanius collurio*. Am 15. Juli 1955 D. bei etwa 1150 m oberhalb Weißtannen bei Hohfluh-Hasleberg BeO; A. Hakios. — Am 21. Juli 1958 ein Paar D. in einem Obstgarten mit Gebüsch ob Unterwasser SG, zirka 1050 m; W. Leuthold.

Seidenschwanz, *Bombycilla garrulus*. Rigi-Stafel, 1604 m, 11. Februar 1958, 1 S. auf Vogelbeerbaum; O. Wölkner.

Trauerschnäpper, *Ficedula hypoleuca*. Strahlegg ZH: 27. Mai 1962, T.-♂ bei 1050 m auf Fichtenspitze singend, ein weiteres ♂ ebenso bei 1130 m. Der T. ist hier reiner Waldvogel; U. A. Corti u. B.

Weidenlaubvogel (Zilpzalp), *Phylloscopus collybita*. Wildhaus SG: W. im Juli und August 1958 bis zirka 1800 m festgestellt; W. Leuthold. — Schnebelhorn ZH,

1200 m, 27. Mai 1962, W.; U. A. Corti u. B. — Weißbad AI, 3. Oktober 1963, 1 W. auf Rosskastanien im Hotelpark, ebenda 1 Ex. am folgenden Tage; U. A. Corti.

Waldlaubvogel, *Phylloscopus sibilatrix*. Schnebelhorn SG, 1200 m, 27. Mai 1962, W. singt; U. A. Corti u. B.

Berglaubvogel, *Phylloscopus borellii*. Schnebelhorn, 1200 m, B. singt am 27. Mai 1962 auf der St. Galler und Zürcher Seite, hier auf Hainbuche; U. A. Corti.

Rohrschwirl, *Locustella luscinioides*. 20. Juni 1964, Wichensee OW, auch am 25. und 30. Juni d. J., später nicht mehr gehört. Ebenda vom 19. bis 26. Juni 1965 gehört, am letzteren Tage 2 Ex. gesehen, dann still bis 9. und 10. Juli d. J., wieder gehört, ebenso am 24. Juli mit kurzen Unterbrechungen. Ob Brutversuch? Ende Juni entstand Hochwasser, dann vielleicht Nachgelege und deshalb erneut Gesang ab 9. Juli 1965; A. Schwab, in litt.

Schilfrohrsänger, *Acrocephalus schoenobaenus*. Fussacher Ried (Vorarlberg): 9. August 1966, 1 ausdauernder Sänger beim Camping-Platz; U. Hammer (Heidelberg), in litt.

Gartengrasmücke, *Sylvia borin*. Urner Boden: 20./21. Juni 1959, G. im Talboden am Fätschbach, zirka 1350 m, 2 Ex.; W. Leuthold. — Schnebelhorn ZH, 27. Mai 1962, G. bei 1200 m; U. A. Corti u. B.

Mönchsgrasmücke, *Sylvia atricapilla*. Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, nur 2 Daten: 14. und 16. Juli 1958, Gesang in ca. 1200 m; W. Leuthold. — Luzern: 19. August 1960, 1 M. singt; U. Hammer (Heidelberg), in litt. — Strahlegg ZH, 1050 m, 27. Mai 1962, Mn.

Zaungrasmücke, *Sylvia curruca*. Wildhaus SG: 1. August 1957, 1 Z. in Erlengebüsch bei zirka 1350 m; W. Leuthold.

Wacholderdrossel, *Turdus pilaris*. Oberes Toggenburg SG: am 29. Juli 1958 etwa 10 W. am Schwendesee, wahrscheinlich Brutplatz; W. Leuthold. — Steg ZH: 27. Mai 1962, W. trägt Futter; U. A. Corti u. B. — Am 20. August 1962 auf Bühlberg ob Lenk, zirka 1700 m, 1 W. Am 2. September 1962 bei Matten (Simmental), ca. 1000 m, etwa 12 W. in einer Wiese (Waldnähe), nahrungssuchend; E. Carrara. — Kräzernen (Schwägalp) AI, 1300 m, 4. Oktober 1963, 4 — 5 W. in mooriger Niederung; U. A. Corti.

Misteldrossel, *Turdus viscivorus*. Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, M. zahlreich, in lockerem Wald und an Waldrändern; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, M. ziemlich sporadisch vorhanden; W. Leuthold. — Strahlegg ZH, 1050 m, bis Schnebelhorn, 1200 Meter, 27. Mai 1962, M. singend; U. A. Corti u. B. — Sonnenhalb-Helchen ob Weißbad AI, 3. Oktober 1963, 2 M. — Am folgenden Tag etwa 1 Dutzend Ex. bei Kräzernen (Schwägalp), 1300 m, U. A. Corti.

Singdrossel, *Turdus philomelos*. Oberes Toggenburg (Wildhaus) SG: Sommer 1956, 1957, 1958, S. ziemlich zahlreich in Wäl dern der unteren Lagen; W. Leuthold. Urner Boden: 20./21. Juni 1959, S. ziemlich sporadisch vertreten; W. Leuthold. — Strahlegg ZH, 1050 m, 27. Mai 1962, S.; U. A. Corti u. B. — Sonnenhalb-Helchen ob Weißbad AI, 3. Oktober 1963, 2 S. — Kräzernen (Schwägalp) AI, 1300 m, 4. Oktober 1963, 2 S.; U. A. Corti.

Ringdrossel, *Turdus torquatus*. Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, R. nicht zahlreich, oberhalb 1200 — 1300 bis 2000 m; W. Leuthold. — Urner Boden, 20./21. Juni 1959, R. in höheren Lagen, zirka 1800 m, gut vertreten; W. Leuthold.

Schwarzdrossel, *Turdus merula*. Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, Amsel bis ca. 1300 m ziemlich spärlich vertreten; W. Leuthold. — Strahlegg ZH: 27. Mai 1962, Sch. singt bei zirka 1100 m; U. A. Corti u. B. — Sonnenhalb-Helchen ob Weißbad AI, 3. Oktober 1963, 1 ♂ bei 900 m. Am 5. Oktober 1963 zwei Ex. auf Rasen im Park des Kurhauses Weißbad; U. A. Corti.

Blaumerle, *Monticola solitarius*. Felsental bei Andermatt-Hospental, 12. August 1966, 1 B.-♂ bei zirka 2450 m im NW-Gemsstock; U. Hammer, in litt.

Steinmerle, *Monticola saxatilis*. 28. Mai 1904 (!), 1 St.-♀ an Felsen zwischen Furka und Realp; A. K. Müller, in litt. — Am 12. August 1966 ein St.-♂ bei 2300 Meter, Gemsstock-Felsental ob Andermatt; U. Hammer, in litt.

Steinschmätzer, *Oenanthe oenanthe*. Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958. St. nur in höheren Lagen, vereinzelt auftretend, 7. und 15. August 1957; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, 1 St.; W. Leuthold. — Simmental BeO: 3. September 1962, 1 St. vertreibt am frühen Nachmittag am Fluhseeli, 2050 m, mit Warnrufen und durch „Stoßen“ ein Bergwiesel; E. Carrara.

Braunkehlchen, *Saxicola rubetra*. Mitte Juli 1955 ein Paar B. in Mähwiese bei Wasserwendi-Hasleberg BeO, B. auch in Mähwiese auf „Würzivorsiß“, etwa 1300 m, oberhalb Hohfluh-Hasleberg; A. Hakios. — Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, B. zahlreich in allen Heuwiesen bis zirka 1300 m; W. Leuthold.

Gartenrötel, *Phoenicurus phoenicurus*. Gegend von Wildhaus SG: 15. August 1957, 1 ♂ bei ca. 1300 m; W. Leuthold. — Schnebelhorn ZH: 27. Mai 1962, G. auf Strahlegg, 1050 m; U. A. Corti u. B.

Hausrötel, *Phoenicurus ochruros*. H. am 6. April 1950 bei „Egg“ oberhalb Wasserwendi-Hasleberg BeO, ca. 1250 m; A. Hakios. — Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, H. zahlreich im Siedlungsgebiet, um Alphütten, an Felsen, bis 2000 m; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, H.; W. Leuthold. — Strahlegg ZH, 1050 m, H.; U. A. Corti u. B. — Weißbad AI: 2. Oktober 1963, 1 H., ebenda am folgenden Tag 1 ♂ auf Kurhausdach singend, 2 Ex. bei Sonnenhalb-Heldens ob Weißbad auf „Heumanndln“, ebenda, weitere Ex. Am 4. Oktober 1963 ein H. in Weißbad, 1 Ex. auf Kräzeren (Schwägalp), 1300 m, und 3 H. (1 graues ♂ mit weißem Flügelspiegel) auf Ebenalp, ca. 1650 m. Am 5. Oktober 1963 singt 1 H. in Weißbad, ferner 1 H. am Ufer des Seealpsees (♂ aschgrau mit Flügelspiegeln); U. A. Corti.

Rotkehlchen, *Erythacus rubecula*. Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, R. verbreitet, jedoch nicht zahlreich vorkommend, in buschreichem Wald, bis zirka 1300 m; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, R.; W. Leuthold. — Strahlegg ZH: 27. Mai 1962, R. bei 1140 m; U. A. Corti. — Weißbad AI: 5. Oktober 1963, 1 R. im Park des Kurhauses; U. A. Corti.

Heckenbraunelle, *Prunella modularis*. Gegend von Wildhaus SG: H.-Gesang im Juli 1958 mehrfach gehört; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, H. gut vertreten; W. Leuthold. — Schnebelhorn ZH: 27. Mai 1962, 2 H. bei 1200 m; U. A. Corti u. B.

Alpenflüvogel, *Accentor collaris*. Gegend von Wildhaus SG: 1 A. im August 1956, 1 Ex. am 7. August 1957; W. Leuthold. — Am 20./21. Juni 1959 nahe der Klausen-Paßhöhe 4—5 A.; W. Leuthold.

Zaunkönig, *Troglodytes troglodytes*. Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958: Z. zahlreich, oft Gesang bis zirka 1800 m; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, Z.; W. Leuthold. — Strahlegg ZH, 1050 m, 27. Mai 1962, Z.; U. A. Corti u. B.

Wassersamsel, *Cinclus cinclus*. Gegend von Wildhaus SG: W. im August 1956 an größerem Bach bei 1000 m; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, 1 W. am Fätschbach; W. Leuthold. — Wasserauen AI: 3. Oktober 1963, 1 W. Ebenda am 5. Oktober 1963 eine W. in Bach mit vielen bemoosten Steinen und relativ geringem Gefälle schwimmend und tauchend; U. A. Corti.

Rauchschwalbe, *Hirundo rustica*. Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, R. ziemlich zahlreich im Siedlungsgebiet und auf den untersten Alpen, 1200 bis 1300 m; W. Leuthold. — Am 11. September 1960, 10—12 Uhr, R. am Nordhang des Regelstein oberhalb Wattwil SG, bei sonnigem Wetter jagend; A. Hakios.

Mehlschwalbe, *Delichon urbica*. Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, M. im Siedlungsgebiet, jedoch bedeutend weniger zahlreich vorkommend als die Rauchschwalbe; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, M. im Talboden, ob brütend? W. Leuthold. — Am 11. September 1960, 10—12 Uhr, M. bei sonnigem Wetter am Nordabhang des Regelsteins oberhalb Wattwil SG jagend; A. Hakios. — Schnebelhorn ZH, 1200 m, 27. Mai 1962, 1 M.; U. A. Corti u. B. — Am 9. September 1962, 11 Uhr, 3—4 M. am Roßberg bei Arth SZ um den Gipfel des Gnippen jagend; A. Hakios.

Felsenschwalbe, *Ptyoroprogne rupestris*. 20. August 1960, 2 F. über Hospental, 1600 m, an der Gotthardstraße; U. Hammer (Heidelberg).

Mauersegler, *Apus apus*. 2 M. am 29. Juli 1957 bei Wildhaus SG, am 15. August 1957 mehrere Ex. über dem Gamserrugg, ca. 2100 m, am 12. — 14. Juli 1958 einige Indiv. im Dorf Wildhaus, am 29. Juli 1958 ein Ex. über dem Schwendisee; W. Leuthold. — Schnebelhorn ZH, 1200 Meter, 27. Mai 1962, einige M.; U. A. Corti u. B. — Meiringen BeO: 30. August 1963, 1 M. über der Ortschaft; U. A. Corti.

Wiedehopf, *Upupa epops*. Am 4. April 1953 W. bei Ibiikon oberhalb Rotkreuz LU. Gleichtags auf der „Egg“ oberhalb Wasserwendi-Hasleberg BeO von Frau A. Böhny-Fisler beobachtet; A. Hakios.

Blauracke, *Coracias garrulus*. H. Wallimann beobachtete am 11. Juni 1933 eine B. in Kilcherli bei Alpnach; A. Schwab.

Grünspecht, *Picus viridis*. Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958. G. spärlich vertreten bis zirka 1500 m; W. Leuthold.

Grauspecht, *Picus canus*. Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, G. eher seltener als der Grünspecht, mehr im Laubwald, bis zirka 1300 m; W. Leuthold.

Großbuntspecht, *Dendrocopos major*. Am 11. April 1950 klopfte 1 G. eifrig an hölzerne, in einer Wiese stehende und von verstreuten Häusern und Baumgruppen umgebene Kraftleitungsstange im „Waldli“ oberhalb Wasserwendi-Hasleberg BeO, etwa 1250 m; A. Hakios. — Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, G. ziemlich selten, am 13. August 1957 ein Ex. auf zirka 1200 m, am 14. Juli 1958 ein Ex. auf 1350 m; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, G.; W. Leuthold.

Kuckuck, *Cuculus canorus*. Am 14. April 1950, K. bei „Egg“ oberhalb Wasserwendi-Hasleberg BeO, etwa 1250 m; A. Ha-

kios. — 24. April 1955, K.-Rufe am Regelstein ob Uznach SG; A. Hakios. — Am 29. Juni 1958, 11.30 Uhr (schön), K.-Rufe aus Tannenwald, Tschiengelalp ob Elm GL; A. Hakios. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, K.-Rufe auf zirka 1350 m am Fätschbach; W. Leuthold. — Am 3. Juli 1960, 13.30 Uhr, K.-Rufe aus Erlengebüsch am Chneugrat ob Braunwald GL (bewölkt, kühl); A. Hakios. — Schnebelhorn ZH: 27. Mai 1962, K. bei zirka 1150 m; U. A. Corti u. B.

Turmfalke, *Falco tinnunculus*. Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, T. häufigster Greifvogel. Brütet in Felsen bis zirka 2000 m; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, T.; W. Leuthold. — Seetalpsee AI: 5. Oktober 1963, 1 rüttelnder T.; U. A. Corti.

Steinadler, *Aquila chrysaetos*. Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, St. Brutvogel. Anno 1957 ein besetzter Horst am nördlichen Hang des Gulmen, oberhalb Tesselalp. 1958 Horst an einer anderen Stelle, die mir von Alplern angegeben wurde; W. Leuthold. — Am 20./21. Juni 1959 jagen 2 St. auf der Glarnerseite des Urner Bodens; W. Leuthold. — Am 26. August 1966 ein ad. + ein immat. (+ ein vermutlich immat. Ex.): bei 2500 m westl. Rawilpaß/Schneebelhorn BeO; U. Hammer, in litt.

Mäusebussard, *Buteo buteo*. Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, M. ziemlich oft beobachtet. Er dürfte im Gebiet in 2 — 3 Paaren brüten; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, M.; W. Leuthold. — Schnebelhorn ZH, 1200 m, 1 M. am 27. Mai 1962; U. A. Corti u. B.

Rotmilan, *Milvus milvus*. Gegend von Wildhaus, am 2. August 1957 ein Ex. zirka 1500 m hoch über der Südseite des Tales; W. Leuthold.

Wespener, *Pernis apivorus*. Am 12. Juli 1958 zwei W. bei Ebnat-Kappel SG; W. Leuthold.

Seeadler, *Haliaeetus albicilla*. Offensichtlich ein Jungvogel (Schwanz noch braun, die innere Hälfte der Fahne der Schwanzfedern grau-weißlich marmoriert), der am 21. November 1917 am Schlierendossen (Sarneraa) in Alpnach geschossen wurde, befindet sich heute als Belegstück im Heimatmuseum Sarnen; A. Schwab, in litt., 7. Januar 1967.

Graureiher, *Ardea cinerea*. 21. Mai 1956, 2 besetzte Horste am Utohorn bei Kastanienbaum LU, später nicht mehr bezogen, vielleicht wegen Holzschlags und weil sich Häuser in der Nähe befinden. Am 6. Juli 1963 etwa 10 bis 12 G., die im Schloßpark Buonas ZG auf mindestens 6 Horsten stehen. Eine aus zirka 5 bis max. 10 Horsten bestehende, regelmäßig besetzte G.-Kolonie am Hinterberg-Alpnachstad; A. Schwab.

Purpureiher, *Ardea purpurea*. Am 24. Juni 1964 bei Horw mittags 2, abends nur noch 1 P. Am 3. August 1965 wieder 1 Ex. bei Horw, das laut R. Calvetti seit etwa 3 Wochen da ist; A. Schwab.

Seidenreiher, *Egretta garzetta*. Augustin fand am 18. Juni 1962 im Aaried am Sarnensee bei Giswil einen verletzten S. Am 8. Juni 1964 sah H. Schmidiger 1 Ex. am Wichensee OW. Am 15. Mai 1965 hielten sich 10 S. im Aaried bei Giswil am Sarnensee auf; A. Schwab.

Zwergreiher, *Ixobrychus minutus*. Am 13. September 1959 ein juv. Z. bei Horw. Brutvogel im Steinibachried. Wichensee OW: 1 Ex. am 26./27. Mai 1963, 2 Indiv. am 4. August 1963 und 1 Z. am 20. Juni 1964. Calvetti stellte diese Art etwa am 20. Juni 1964 bei Horw fest; hier fand er im Herbst 1965 das Nest und am 12. August 1965 einen Jungvogel, der am Kopf noch Flaum trug; A. Schwab.

Stockente, *Anas platyrhynchos*. Oberes Toggenburg SG: Im August 1956 ein St.-♀ mit 5—6 Jungen auf dem Gräppelensee, 1300 m. Ebenda 1 Ex. am 31. Juli 1957 und am 29. Juli 1958 ein Ex. auf dem Schwendesee, 1165 m; W. Leuthold. — Urnerboden: 20./21. Juni 1959, 1 Paar St. fliegt überhin; W. Leuthold.

Mittelente, *Anas strepera*. Etwa ab 1952/1953 ein M.-♂ in der Luzerner Bucht. Dieser Vogel ließ einen Flügel hängen und blieb bis mind. 27. April 1956; er paarte sich dann mit einem Stockenten-♀. Ein daraus hervorgegangener Bastard (♂) ließ sich noch im Dezember 1965 auf der Reuss in Luzern beobachten. Vom 6. bis 27. April 1956 bei der Seebrücke Luzern 2 ♂, 1 ♀, am 1. Februar 1964 beim Lido Luzern 1 ♂, 1 ♀; A. Schwab. — Am 31. Dezember 1965 am Lido-Luzern 2 ♂, 1 ♀; Prof. Mugglin.

Spießente, *Anas acuta*. 9. März 1963, 1 ♂ beim Lido Luzern, vom 13. Februar bis 7. März 1965 ein ♂ beim Trottli-Luzern, am 30. August 1965 ein ♂ bei der Seebrücke Luzern; A. Schwab.

Löffelente, *Spatula clypeata*. Am 17. November 1957 ein Ex. bei Küßnacht a. R. Vom 17. bis 23. Januar 1960 ein ♂ bei der Seebrücke, Luzern. Ebenda 1 juv. ♂ vom 16. Februar bis 16. März 1963. Am 6. April 1963 ein ♂ bei Horw; A. Schwab.

Moorente, *Aythya nyroca*. R. Calvetti sichtete am 12. August 1965 eine M. bei Horw. Ich selbst sah den Vogel erst am 8. November d. J. Es handelte sich um ein vermutlich flugunfähiges Ex. (juv. ♂?), weil im rechten Flügel die längsten Handschwingen fehlten; A. Schwab. — Am 31. Dezember 1965 ein ♀ unter Tafelenten in der Luzerner Bucht (Trottli); A. Schwab.

Bergente, *Aythya marila*. 10. Dezember 1955, 1 ♀ auf der Reuß-Luzern (St. Karli). Auf dem Zugersee bei Arth 1 ♂ vom 15. bis 19. Februar 1956. Am 19. Februar 1956 ein ♀, am 13. Dezember 1959 zwei ♀ auf der Reuß-Luzern (St. Karli); A. Schwab.

Kolbenente, *Netta rufina*. Seit zirk. 5. und auch am 10. November 1958 ein ♀ an der Emmenmündung bei Luzern (Ibach) (fide A. Schifferli). Am 6. Dezember 1958 zwei Paar K. beim Trottli-Luzern (fide E. Benz); A. Schwab.

Samtente, *Melanitta fusca*. 3. Dezember 1955, 1 ♀ bei Alpnachstad. — 8. Januar 1956, 3 ♂, 1 ♀ bei Kastanienbaum, ebenda 4 Ex. am 15. und 21. Januar 1956, 2 Ex. am 25. Februar und 2 ♂, 3 ♀ am 18. März 1956. Am 7. April 1956 dasselbst noch 2 Ex., am 21. d. M. keine mehr. — 1. Januar 1959: 2 ♀ bei Buochs, am 15. November 1959 zwei S. bei Alpnachstad. — Anfang Januar 1960 ein ♀ bei Horw, am 17. Januar 1960 ein ♀ bei Greppen (Eichholtern). — 3. Februar 1960: 3 ♀ bei Alpnachstad, ebenda am 13. und 20. März 1960 3 ♂, 2 ♀. — 16. Dezember 1961, 1 ♀ bei Luzern; 20. Dezember 1961 1 Ex. (ev. juv. ♂) bei Arth. — Luzerner Bucht: 26. Januar bis 1. Februar 1963 1 ♂, 1 ♀, ebenda am 2. und 8. Februar 1963 noch 1 ♂, ferner (dasselbst) am 10. Februar 1963 beim Lido 7 ♀, am 16. Februar 1963 4 ♂, 4 ♀ und am 23. Februar 1963 noch 1 ♂. — 1 ♀ am 2. März 1963 bei Kastanienbaum, ebenda 2 Ex. am 9. Februar 1964 und 4 ♀ oder juv. am 29. Februar 1964. — Am 6. Februar 1965 2 Ex., am 13. d. M. noch 1 Ex. bei Kastanienbaum. Am 28. November 1965 ein Ex. bei Kastanienbaum (fide Portmann, Prof. Mugglin); A. Schwab.

Trauerente, *Melanitta nigra*. Vom 21. bis 23. Oktober 1959 hielt sich beim Trottli-Luzern ein T.-♀ auf, das auch von E.

Haueter, Bern, beobachtet wurde. Es handelt sich vielleicht um dasselbe Ex., welches laut Meldung von J. Hofer (Sursee) im Dezember 1959 in einem Fischer-netz ertrank; A. Schwab.

Eiderente, *Somateria mollissima*. E. Haue-ter (Bern) traf am 10. November 1959 ein juv. ♂ bei Luzern an. Anfang Okto-ber 1961 geriet ein juv. ♂ in den Rechen des Elektrizitätswerkes Luzern; es starb 3 Tage später. Am 1. Januar 1964 ein ♀ bei Horw (Haltiwald) fide Schmidiger, Luzern; A. Schwab.

Mittelsäger, *Mergus serrator*. Alpenquai Lu-zern: 1 ♀ vom 17. Januar bis 18. Fe-bruar 1959, 1 ♂ am 16. Januar 1960, 1 ♀ vom 12. bis 19. November 1960. — Horw-Spießenegg: vom 10. Februar bis 2. März 1963 zwei ♀; am 9. März d. J. noch 1 ♀. — Kastanienbaum: 2. Februar 1964, 1 ♀ (U. Glutz v. Blotzheim), am folgenden Tag 2 ♀ (H. Schmidiger), am 29. Februar 1964 ein ♀; A. Schwab.

Zwergsäger, *Mergus albellus*. Am 18. Fe-bruar 1956 ein Paar bei Luzern-Tribschen, am 9. März 1963 ein ♀ bei Horw. In beiden Fällen herrschte große Kälte. Aus-nahmeerscheinung; A. Schwab.

Haubentaucher, *Podiceps cristatus*. Im Fe-bruar 1963 fanden rings um den Vier-waldstättersee infolge Seegefrörne außer-ordentliche Ansammlungen von H. statt: am 3. d. M. 840 Ex. bei Horw-Hergiswil, ebenda 1500 Indiv. am 17. Februar. Am 21. Februar 1965 dasselbst 520 H. — 6. März 1965: mind. 300 bis 350 Ex. von Immensee bis Arth (Zugersee), am folgen-den Tag 310 Indiv. und am 14. März 1965 mind. 500 Ex. auf dem Vierwald-stättersee (Horwerbucht-Hergiswil); A. Schwab.

Orentaucher, *Podiceps auritus*. Küßnacht a. R.: 8. Dezember 1955, 1 Ex., das am 11. d. M. nicht mehr da ist. — Zugersee-Arth, Schattenberg: 21. Februar 1956, 2

Ex. — Küßnacht a. R.: 18. November 1956, 1 Ex. — Meggen: 14. Februar 1960, 1 Ex. — Ennetbürgen NW und Buechs: 3. Februar 1963, je 1 Ex. — St. Niklausen LU (Langensand): 23. Februar bis 9. März 1963, 1 Ex., ebenda 1 Ex. am 9. und 29. Februar 1964. — Zugersee-Arth (am Schattenberg): 6. März 1965, 1 Ex.; A. Schwab.

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis*.

1. bis 9. Januar 1955, Kastanienbaum, 1 Ex., 23. Januar 1955, Küßnacht a. R., 2 Ex., 1. Januar 1956, Weggis, Ennetbürgen je 1 Ex., 29. Januar 1956, Küßnacht a. R., 1 Ex., 1. Januar 1958, Weggis, 1 Ex., 1. Januar 1959, Weggis, 1 Ex., 16. Januar 1959, Weggis, 1 Ex., 1. Januar 1963, Meggen, 3 Ex., 20. Februar 1955, Küßnacht a. R., 3 Ex., 21. Februar 1956, Arth, Schattenberg (Zugersee), 2 Ex., 18. Februar 1956, Meggen, 1 Ex., 25. Februar 1956, Horw, 2 Ex., 3. Februar 1963, Buochs, 1 Ex., 10. Februar 1963, Vordermeggen, 1 Ex., 23 Februar 1963, Kastanienbaum, 1 Ex., 29. Februar 1964, St. Niklausen LU, 14. Februar 1965, Küßnacht a. R., 1 Ex., 10. März 1959, Arth (Zugersee), 1 Ex., 6. März 1960, Vordermeggen, 3 Ex., 6. März 1960, Horw (fide Jngold) 4 Ex., 2. März 1963, Kastanienbaum, 1 Ex., 9. März 1963, St. Niklausen LU, 3 Ex., 14. März 1964, Seeburg LU, 1 Ex. (fast ausgefärbt), 6. März 1965, Merlischachen SZ, 2 Ex., 6. März 1965, Arth (Zugersee), 5 Ex., 5. April 1964, Merlischachen SZ, 1 Ex. (fast ausgefärbt), 10. August 1965, Horw (bis 8. September), 3 Ex., 12. September 1965, Horw, 1 Ex., 13. Oktober 1956, Horw, 1 Ex., 14. Oktober 1965, Arth (Zugersee), zirka 20 Ex., 19. Oktober 1965, Arth, 25 Ex., 28. Oktober 1965, Arth, 21 Ex., 20. November 1955, Küßnacht a. R., 2 Ex., 26. November 1955, Küßnacht a. R., 2 Ex., 5. November 1960, Vordermeggen, 2 Ex., 12. November 1960, Luzern, 1 Ex., 19. Novem-

ber 1960, Luzern, 1 Ex., 26. November 1960, Luzern, 1 Ex., 16. November 1963, Luzern, 2 Ex., 2. November 1964, Luzern, 1 Ex., 5., 14. November 1964, Luzern, 1 (2) Ex., 9. November 1964, Horw (H. Schmidiger) 3 Ex., 13. November 1965, Luzern-Lido, 1 Ex., 31. Dezember 1954, Meggen-Küßnacht, 2 Ex., 8., 18., 31. Dezember 1955, Küßnacht a. R. je 1 Ex., 8. Dezember 1956, Küßnacht a. R., 1 Ex., 31. Dezember 1956, Weggis, 1 Ex., 3., 8., 22. Dezember 1957, Küßnacht a. R., 4:3:2 Ex., Anfang Dezember 1959, Arth (Zugersee), 2 Ex., 1. Dezember 1960, Luzern, 1 Ex., 3. Dezember 1960, Meggen, 2 Ex., 31. Dezember 1960, Seeburg (Luzern), 2 Ex. (bis 13. Januar 1961), 9. Dezember 1963, Luzern, 2 Ex., 14. bis 18. Dezember 1963, Luzern, 1 Ex., 8./9. Dezember 1964, Luzern (Seebrücke), 1 Ex., 26. Dezember 1964, Luzern, 1 Ex.

Alle vorstehenden Daten nach A. Schwab.

Prachtseetaucher, *Gavia arctica*. Horw. LU: 20. November 1954, 1 Ex. — Luzerner Bucht (Trottli), 3. November 1956, 1 indeterm. Seetaucher. — Horw: 24. Januar bis 13. März 1960, 1 Ex., wohl der gleiche Vogel, mehrmals festgestellt — Luzern: 19. November 1960, 1 Ex. nahe vor der Seebrücke; am folgenden Tag ist es nicht mehr da. — Luzerner Bucht: 16. Januar 1965, 1 Ex., das später über Kastanienbaum in die Horwerbucht disloziert. Hier am 24. Januar 1965 zwei P. Am 21. Februar 1965 ist nur noch 1 Ex. anwesend, vermutlich dasjenige vom 16. Januar. Es wurde immer wieder im gleichen Abschnitt Horw-Kastanienbaum beobachtet, zuletzt am 7. März, dann nicht mehr. Erst im Laufe des Sommers zeigte sich der Vogel wieder, ganz nahe des Ufers vor der Schilfflur bei Horw (Steinibachmündung), so am 10. Juli und regelmäßig bis im Spätherbst, z. B. am 6. November 1965. Am 27. November 1965 befand sich der Seetaucher wieder vor

St. Niklausen-Kastanienbaum, hier auch am 26. Dezember d. J. Der Vogel ließ keine Verletzung erkennen; er wurde von andern Beobachtern fliegend gesehen. Der Platzwechsel ist wohl auf verschiedenen Standort der Fischschwärme zurückzuführen. Tauchzeiten: 70, 90, 110, max. 120 sec. Im Sommer 1965 trug der P. das Ruhekleid; A. Schwab.

Sternseetaucher, *Gavia stellata*. Horwerbucht-Spießenegg: 22. Januar 1961, 1 Ex. Ebenda am 28./29. Januar 1961 zwei Ex., am 4. Februar d. J. nur noch eines, am 19. Februar 1961 aber wieder 2 St., vermutlich stets dieselben; A. Schwab.

Ringeltaube, *Columba palumbus*. Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, R. überall in kleiner Anzahl bis zirka 1400 m beobachtet; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, R. nur vereinzelt; W. Leuthold. — Sonnenhalb-Helchen ob Weissbad AI: 3. Oktober 1963 (Hochnebel), ein Verband von etwa 500 R., der sich auf einem bewaldeten Hügel auf Bäumen niederlässt; U. A. Corti.

Türkentaube, *Streptopelia decaocto*. Thun BeO: 28. August 1966, 2 T.; U. Hammer.

Thorswassertreter, *Phalaropus fulicarius*. Ein Ex. im Ruhekleid, nach H. Wallimann vom 19. März 1938, nach der Anschrift auf dem Ständer des Balges „1934“, vom Sarnersee, befindet sich heute in der Vogelsammlung des Kollegiums Sarnen; A. Schwab.

Zwergschnepfe, *Limnocryptes minimus*. Horw LU: 4. Dezember 1965, ein verletztes Ex., das dann einging; A. Schwab.

Tüpfelralle, *Porzana porzana*. Horw LU: 15. Oktober 1956, 1 T.; A. Schwab.

Kleinralle, *Porzana parva*. Das Naturhist. Museum Basel erhielt von der Vogelwarte Sempach ein ♂ vom 28. Mai 1959 aus Sennwald SG (Rheintal) sowie ein juv. ♂ vom 6. April 1951 aus Abfrutt bei Göschenen (1157 m), ebenfalls von der Vogelwarte; E. Sutter, in litt.

Uruhuhn, *Tetrao urogallus*. Gegend von Wildhaus SG: Sommer 1956, 1957, 1958, mehrfach U.-Losung gefunden; W. Leuthold. — Urner Boden: 20./21. Juni 1959, 1 ♀ mit zirka 6 Jungen im Wängwald; W. Leuthold. — Schneebelhorn ZH: 27. Mai 1962, 1 U.-Henne hoch auf Fichte; U. A. Corti u. B.

Birkhuhn, *Lyrurus tetrix*. Gegend von Wildhaus SG: Am 1. August 1958 eine Henne mit etwa 6 Jungen am südlichen Gulmenhang; W. Leuthold. — Simmental BeO: 26. August 1962, im Fermeltal unterhalb Muriboden an der Waldgrenze, zirka 1900 m, eine B.-Familie (6 Junge) aus Erlengebüsch aufgescheucht; E. Carrara.

Haselhuhn, *Tetrastes bonasia*. August 1936, H. in der Gegend von Wildhaus, SG; fide W. Leuthold.

Schneehuhn, *Lagopus mutus*. Oberes Toggenburg SG: Das Sch. ist früher von W. Höhn und meinem Vater verschiedentlich auf den höchsten Churfürsten (Gamserrugg und Chäserrugg) beobachtet worden; W. Leuthold. — Urnerboden: 20./21. Juni 1959, 1 Paar Sch. auf zirka 2000 m; W. Leuthold. — Am 26. August 1966 beobachtete U. Hammer 3 Ex. bei 2500 m in der SE-Ecke des Niesenbergs W Rawilpaß BeO.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monticola](#)

Jahr/Year: 1966-1968

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Corti Ulrich A.

Artikel/Article: [Die Vogelwelt der schweizerischen Nordalpenzone. 1.  
Nachtrag. 121-132](#)