

- Bembidium fasciol. ascendens* Dan.: St Martin-Vésubie, bords du Borréon.
 — Isère; Entre deux-guiers (V. Planet).
Bembidium coeruleum Serv.: Nice, bords du Paillon. — Var: Cuers. — Avignon (Dr. Chobaut).
Bembidium coeruleum Bugnioni Dan.: Avignon (Dr. Chobaut).
Bembidium tibiale Dft.: St Martin-Vésubie. — Aude, environs de Belcaire (coll. Puel, Béziers).
Bembidium Redtenbacheri Dan.: Mont Dore en Auvergne (coll. Puel, Béziers) — Isère, les Echelles (massif de la Grande-Chartreuse) (V. Planet) — St Martin-Vésubie.
Bembidium complanatum Heer: St Martin-Vésubie.
Bembidium longipes Dan.: St Martin-Vésubie, bords du Borréon.
Bembidium atrocoeruleum Steph.: Aude, environs de Belcaire (coll. Puel, Béziers).
Amara lantoscana Fauvel: M^t Scandaïl, alp. marit. 1902.
Polydrosus (Chlorodrosus) Abeillei Desbr.: Courmes, alp. marit. 1902.

K. Holdhaus, Wien:

Vom Monte Pavione in den cadorischen Dolomiten (1902, Holdhaus): *Plectes Creutzeri* Kircheri Germ. hfg. — *Orinocarabus alpestris* Bertolini Kr., Linnei Panz. — *Trechus pallidulus* Gglbr. nicht selten, *Breiti* Gglbr., 4 Stück unter tief liegenden Steinen unterhalb des Gipfels. — *Abax parallelopipedus* Dej., *Beckenhaupti-Eccheli* Bert. — *Pterostichus baldensis* Palae Müll. — *Tapinopterus placidus* Rosh., 3 Stücke unterhalb des Gipfels. — *Broscosoma baldense* Rsh., selten. — *Amara pasubiana* Dan. (nicht *dolomitana* Dan.!) in Anzahl. — *Absidia Birnbacheri* Krauss, in geringer Anzahl, auch 1 ♀, die Stücke sind, wie jene vom Rolle-Pass, ganz schwarz. — *Otiorrhynchus tridentinus* Dan. nicht selten. *Orinocarabus concolor* Redtenbacheri Géh.: In der Rauris (Otto) und auf dem Hoch-Obir (Klimsch).

Orinocarabus alpestris Hoppei Germ.: 1 Stück von den Gailtaler Alpen (Gugg-Alm in der Sifflitz), das eine Mittelstellung zwischen *alpestris*-Stammform und *Hoppei* einnimmt (Holdhaus).

Orinocarabus Linnei Panz.: Gailtaler Alpen (Sifflitz) 1 Stück (Holdhaus). *Cychrus angustatus* Hoppe: Dobratsch (Berger).

Cychrus Schmidti Chaud.: Wolaya-See in den karnischen Alpen (Holdhaus). *Asmerinx Knauthi* Gglbr.: Dobratsch, 1 Stück (Holdhaus).

Reichenbachia Klimeschi Holdh.: Admont (Steiermark), 3 ♂♂ (Hauptmann Zellich) (Holdhaus det.).

Bythinus Halberri Rtr.: Campo grosso (Piano della Fugazza, Südtirol), 1 ♂ oberhalb der Finanz-Kaserne unter einem tief in grasreichen Boden eingebetteten Stein (25. 7. 1902, Holdhaus), 1 ♀ ebenda (Ganglbauer, Holdhaus det.).

Hypocyptus Pirazzolii Baudi: Am Ufer des Loibl-Baches bei Ferlach in Kärnten (17. 8. 1902, Holdhaus leg. et det.) unter Steinen, welche auf nicht allzu feuchtem Letten aufliegen, schwärmt abends, 2 Exemplare.

Pteroloma Forströmi Gyll.: Bei Metnitz in Kärnten (Klimsch).

Agyrtes bicolor Cast.: 1 Stück am Wullanig bei Villach (Holdhaus leg. et det.).

Ptinus austriacus Rtrr.: Villach und Sachsenburg in Oberkärnten, einige Stücke (Holdhaus leg. et det.).

Liodes carpathica Gglbr.: Braunsberg in Mähren (Janaček).

Hymenorus Doublieri Muls.: Villach, 1 Stück (Holdhaus leg., Gglbr. det.).

Dirrhagus Sahlbergi Mannh.: 1 Stück bei Sachsenburg in Oberkärnten an frisch gescheitertem Buchenholz (Holdhaus leg., Gglbr. det.).

Troglorrhynchus baldensis Czwal.: Monte Baldo unterhalb des Gipfels unter sehr grossen Steinen, welche in grasreichem Boden eingebettet sind, gewöhnlich in den tieferen Partien an den Graswurzeln: 14 Stück (22. 7. 1902, Holdhaus et Otto leg.).

Alle Belegstücke für meine Angaben im k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien.

J. Breit, Wien:

Carabus violaceus Müller Born (cf. Ref. 152): Auf der Passhöhe des Arlberg.

Carabus Linnei Panz.: Hochalpin auf dem Monte Pasubio (Lessinische Alpen).

Nebria austriaca Gglbr.: Hochalpin auf dem Wolfendorn am Brenner.

Nebria Bremii Germ.: Hochalpin auf dem Hafelekar (Karwendelgebirge).

Scarites laevigatus thelonensis Bon.: Am Lido von Venedig.

Dyschirius extensus Putz.: Am Neusiedlersee (Ungarn).

Patrobus assimilis Chaud.: Auf der Passhöhe des Arlberg.

Perigona nigriceps Dej.: Im Wienerwald, Windisch-Garsten (Dr. Skalitzky).

Platynus longiventris Mannh.: Prater in Wien; Ober-Weiden (Marchfeld, östl. Nieder-Oesterr.).

Platynus cyaneus Dej.: Am Ufer des Inn bei Innsbruck.

Pterostichus inquinatus Sturm: Neusiedlersee.

Pterostichus elongatus Dft.: Neusiedlersee.

Pterostichus Kokeili Mill.: Hochalpin auf dem Wolfendorn am Brenner.

Pterostichus micans Heer: Campo grosso (Lessinische Alpen), Monte Baldo, Monte Generoso (Tessin).

Tapinopterus placidus Rsh.: Campo grosso (Lessinische Alpen).

Molops edura Dej.: Monte Grigna, Campo grosso.

Amblystomus metallescens Dej.: Am Neusiedlersee.

Bythinus simplex Baudi: Piano della Fugazza (Lessinische Alpen).

Ptiliolum Sahlbergi Flach: Untersberg (Südliches Niederösterreich).

Spaniophaenus laticollis Mill.: Oberweiden (Marchfeld, östl. Niederösterreich).

Meligethes humerosus Rtrr.: Subalpin, Stuhleck (Semmering-Gebiet).

Hypocorus lathridioides Motsch.: Brucker Haide (Oestl. Niederösterreich).

Aphodius plagiatus L. (*forma typica*): Hochalpin auf dem Monte Pasubio; auch am Neusiedlersee.

Anoxia scutellaris Muls.: Monte Pasubio (Lessinische Alpen).

Bruchus Schlerethi Rtrr.: Prag (Dr. Skalitzky).

Meloe tuccius Rossi: Neusiedlersee.

Otiorrhynchus Heeri Strl.: Monte Grigna.

Otiorrhynchus velutinus Germ.: Südliche Umgebung von Wien.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Münchne Koleopterologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [001](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Beiträge zur Koleopteren-Geographie.](#)

[Originalmitteilungen \(2\) 256-257](#)