

- Barypithes Pirazzolii* Strl.: Piano della Fugazza (Lessinische Alpen).
Lepyryus armatus Weise: Neusiedlersee, Brucker Haide (Oestl. Nieder-
 österreich), Karwendelgebirge, Lessinische Alpen (Monte Pasubio, Campo
 grosso), Monte Baldo, Monte Generoso (Tessin).
Tropiphorus Bertolinii Strl.: Rolle-Pass (Cadorische Dolomiten).
Hylostinus Frankhauseri Rttr.: Krain (Fuchs).
Orestia Electra Gredl.: Campo grosso (Lessinische Alpen), Monte Gene-
 roso (Tessin).

Dr. J. Daniel, Ingolstadt:

- Tapinopterus placidus* Rosh.: Val Sugana: Lalensola-Pass, 15. 5. 1894
 (K. Daniel). — Venetianer Alpen: M^{te} Grappa, 10. 6. 1897 (K. Daniel).
Veleiopsis marginiventris Fairm.: Konia, 12. 6. 1899 (Korb).
Aphodius parallelus Muls.: Konia, 1899 (Korb), bisher nur aus Frank-
 reich, Spanien und Istrien bekannt.
Aphodius satyrus Rttr.: Judicarien: Val Daone, 3. 7. 1894 (J. Daniel).
 — Bernina-Alpen: Val Masino, 26. 7. 1893 (J. Daniel). — Penni-
 nische Alpen: M^{te} Bo, 8. 8. 1894 (K. Daniel). — Grajische Alpen:
 Valle di Viù, 22. 6. 1893 (J. Daniel). — Seealpen: Vesubiataler,
 7. 1896 (J. Daniel). — Ligurische Alpen: Val Pesio, 3. 8. 1890
 (K. Daniel). — Dobratsch (Strasser).
Homalilus taurinensis Baudi: Südl. cottische Alpen: Val Maira, 4. 6. 1898
 (J. Daniel).
Nacerdes fulvicollis v. *media* Grdl.: Judicarien: Cima Tombea, Val Daone,
 Condino. Wohl sicher nur Varietät des ♂, die ♀♀ von denselben
 Localitäten normal. (J. Daniel).
Clytra puberula Weise: (Arch. Nat. 1898, 181) ♂♀, Lanjaron, 1. 7.
 u. 18. 7. 1895 (Korb), aus Barcelona (Mont Serrat) beschrieben.
Labidostomis armenica Lac. und *Gynandrophthalma biornata* Lefr.: Eriwan,
 1898 (Korb), im Cat. Col. Eur. Cauc. nachzutragen.
Cryptocephalus albolineatus Sffr.: Südtirol: Col Santo, 26. u. 27. 6. 1894
 (J. Daniel).
Cryptocephalus tardus Weise: Lombardei: Val Borleggia, 8. 8. 1899
 (K. Daniel). Bisher nur vom M^{te} Rosa bekannt.
Orina viridis ignita Com.: Hospice de France, 6. 8. 1884 (K. Daniel)
 bei Bagnères de Luchon (Hautes-Pyrénées).
Orina melanocephala melancholica Heer: Mühlebach-Alpe, 29. 7. 1896
 (K. Daniel) im Canton Glarus. — Val Piora, im Canton Tessin
 (Strasser). Heer kannte sie vom Bergliseeli (Canton Glarus) und
 vom M^t Joli in Savoyen.
Luperus gularis Grdl.: Seealpen: Tenda, 6. 7. 1896 (J. Daniel), häufig
 auf Föhren.

Dr. K. Daniel, München:

- Nebria diaphana* Dan.: Langkofel-Hütte, 1900. — Contrin-Hütte, Marmo-
 lada, 1900. — Tosa-Hütte, Brenta, 1901 (Röttgen).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Münchner Koleopterologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [001](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Beiträge zur Koleopteren-Geographie.
Originalmitteilungen \(4\) 258](#)