

J. Schilsky: Die Käfer Europas. (Küster & Kraatz, Heft 42., 1906. — 295.
Nürnberg bei Bauer & Raspe; Preis 3 Mk.)

Beschreibung von 74 *Apion*-Arten, 4 *Apoderus*-Arten, 6 *Rhynchites*-Arten, 1 *Byctiscus*-Art, 3 *Attelabus*-Arten, 2 *Euscelus*-Arten, 3 *Euops*-Arten, 1 *Spermophagus*-Art, 3 *Bruchidius*-Arten, 1 *Dasytes*-Art und 2 *Haplocnemus*-Arten.

Davon neu: *Apion clavatum* aus Südspanien, zu *armatum* Gerst. — *Apion longiceps* aus Daghestan, zu *clavatum* Schilsk. — *Apion quadricostatum* aus Syrien, zu *onopordi* Kirb. — *Apion transylvanicum* aus Siebenbürgen, zu *macrorrhynchum* Epp. — *Apion monticola* aus Südtirol, zu *compactum* Dbr. — *Apion judaicum* aus Palästina, zu *oblongulum* Dbr. — *Apion Chobauti* aus Algerien, zu *batnense* Dbr. — *Apion Laufferi* aus Centralspanien, zu *A. compactum* Dbr. — *Apion sublineatum* aus Armenien (?) oder Turkestan (?) zu *uliciperda* Pand. — *Apion puncticolle* aus Persien, zu *A. dispar* Germ. — *Apion Lesnei* aus der Mandschurei, ein *Synapion*. — *Apion acuminatum* von der Sa. Nevada und Sa. Guadarrama, zu *argentatum* Gerst. — *Apion deletum* aus Dschilarik, isolirt stehend. — *Apion rectirostre* aus der Mandschurei, zu *ervi* Kirb. — *Apion lenense* aus dem Lenagebiet, zu *reflexum* Gyll. — *Apoderus rugicollis* von Peking, zu *Jekeli* Roel. — *Apoderus affinis* von Peking, zu *carbonicolor* Motsch. — *Rhynchites flavipes* von Tokio und *Rosti* aus Okuru (Japan), beide zu *unicolor* Roel. — *Rhynchites gracilicornis* von Tokio, zu *olivaceus* Gyll. — *Rhynchites cylindricollis* von Tokio, zu *coeruleus* Deg. — *Byctiscus gibbistrostris* von Tokio, zu *populi* L. — *Attelabus spinipes* von Peking, zu *nitens* Scop. — *Euscelus chinensis* und *gibbicollis* von Peking. — *Euops puncticollis* von Tokio, zu *splendens* Roel. — *Spermophagus japonicus* von Tokio, zu *variolosopunctatus* Gyll. — *Bruchidius Reitteri* aus Transkaukasien, zu *lucifugus* Boh. — *Bruchidius Koenigi* aus Russisch-Kurdistan, zu *cinerascens* Gyll. — *Bruchidius modestus* aus der Mandschurei, zu *apicipennis* Heyd. — *Dasytes Laufferi* aus Centralspanien, zu *subalpinus* Baudi. — *Haplocnemus similis* von Ak-Schehir (Kleinasien), zu *aestivus* Ksw. — *Haplocnemus serrulatus* aus Spanien, zu *Aubei* Ksw.

(Dr. K. Daniel.)

Druckfehler-Berichtigung.

In dem Aufsätze »*Laria* oder *Bruchus*?« von L. Ganglbauer (M. K. Z. 3., 65—68) blieben bedauerlicherweise einige Druckfehler unbeachtet,*) deren Richtigstellung hiemit erfolgt:

Seite 65	Zeile 24	(von unten)	zu ändern:	<i>foliiformes</i>	in	<i>filiformes</i>
				<i>crassicores</i>	»	<i>crassiores</i>
» 67	» 2	» » » »	dabei	»	daher	
» 67	» 5	» » » »	das	»	der	

Die Redaction.

*) Wegen drängender Zeit konnte damals die Correctur dem Herrn Autor leider nicht mehr vorgelegt werden und wurde daher diesseits gelesen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Münchner Koleopterologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [003](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Druckfehler-Berichtigung. 122](#)