

Literatur:

1. W. Herrmann: Myk. Mitt. Bl. 11, S. 19 und 41, 1967.
2. W. Pohle: Myk. Mitt. Bl. 14, S. 23, 1970.
3. Th. Wieland: Science 159, S. 946–952, 1968.
4. Th. Wieland and O. Wieland: Pharmacol. Review 11, S. 87, 1959
5. F. Stirpe and L. Fiume: Biochem. J. 105, S. 779, 1967.
6. K. H. Seifart, C. E. Sekeris: Z. Naturforsch. 24 b, S. 1538, 1969.
7. C. Kedinger, M. Gniazdowski J. L. Mandel jr., F. Gisinger, P. Chambon: Biophys. Biochem. Res. Comm. 38, S. 165, 1970.
8. M. Meihlac, C. Kedinger, P. Chambon, H. Faulstich, M. A. Govindau, Th. Wieland: Febs Letters 9, S. 258, 1970.
9. C. J. Chesterton, P. H. W. Butterworth: Febs Letters 12, S. 301, 1971.
10. C. Sekeris et al.: Febs Letters 9, S. 103–104, 1970.

Dr. J. Langner, Physiologisch-chemisches
Institut der Martin-Luther-Universität, 402 Halle/S.

Exkursionstagung vom 9.—13. September 1970 in Martinfeld (Eichsfeld)

Heinrich Dörfelt

Die Arbeitsgruppe Mykologie (Sektion Mikrobiologie) der Biologischen Gesellschaft der DDR kam im Spätsommer 1970 in Martinfeld gerade rechtzeitig, um reichlich Pilze ernten zu können. Die organisatorischen Dinge lagen in den bewährten Händen von Dr. Peter Hübisch, wodurch ein reibungsloser Ablauf garantiert war. Exkursionen führten die nahezu 20 Teilnehmer während der ersten beiden Tage in die nähere Umgebung von Martinfeld, am dritten Tag in das Pferdebachtal bei Flinsberg. Meist wurden die Pilze in Buchenwäldern über Kalkgesteinen gesammelt, aber auch die Fichtenforste, Gebüsche, Weiden und Wiesen blieben nicht unbeachtet. Zur Bestimmungsarbeit standen mehrere Mikroskope und sehr viel einschlägige Fachliteratur zur Verfügung. Jeder war bemüht, die große Fülle des angefallenen Materiales zu bewältigen. Ohne den selbstlosen Einsatz von Prof. H. H. Handke und von F. Gröger, die einen Mammutanteil der Arbeit bewältigten, wäre sicher die Ausbeute viel geringer gewesen. Besonders zu erwähnen ist auch die Arbeit von Dr. G. Arnold, der kleine Ascomyceten, z. B. der Ordnung *Sphaeriales*,

bestimmte und verschiedene gelungene Präparate vorstellte. Auf diese Weise erhielten interessierte Teilnehmer einen kleinen Einblick in eine Pilzgruppe, die oftmals bei ähnlichen Veranstaltungen unbeachtet bleibt. Das Ergebnis der Exkursionstagung ist beachtlich. In der Umgebung von Martinfeld (10. und 11. 9.) wurden 192 Arten festgestellt, im Pferdebachtal bei Flinsberg 125 Arten, insgesamt an allen drei Tagen 254 Arten. Bei diesen Zahlen ist mit Ausnahme einiger von Dr. Arnold bestimmter Ascomyceten, die nachträglich in die folgende Liste aufgenommen wurden, nur berücksichtigt, was an Ort und Stelle bestimmt werden konnte. Fragliche und unsichere Bestimmungsergebnisse wurden nicht aufgenommen, einige Ausnahmen bilden besonders interessante Funde, die nicht sicher determiniert werden konnten; sie sind in der folgenden Liste mit Fragezeichen versehen. Zahlreiche unbestimmte bzw. unsicher bestimmte Fruchtkörper wurden exsikiert und von den Teilnehmern der Tagung zur weiteren Bearbeitung mitgenommen, sie konnten in der Liste nicht berücksichtigt werden.

Zu den pilzfloristischen Besonderheiten der Exkursionsgebiete gehören u. a.

1. kalkliebende und an Kalk gebundene Arten

1.1. In den Laubwäldern wurden folgende Arten ermittelt, die im Mitteldeutschen Gebiet¹ als kalkliebend gelten können bzw. nur auf Kalkboden gefunden werden: *Geastrum fimbriatum*, *Lactarius acris*, *Lactarius cilicioides* und *Lycoperdon echinatum*.

1.2. An Nadelgehölze gebunden sind folgende kalkliebende bzw. kalkstete Arten, die teils in Mischwäldern, teils in reinen Koniferenforsten gefunden wurden: *Geastrum quadrifidum*, *Lactarius sanguifluus* und *Suillus tridentinus*.

2. demontan verbreitete Pilze


Lactarius scrobiculatus und *Russula mustelina* sind in Mitteleuropa mit Ausnahme weniger Funde auf gebirgige Gebiete beschränkt. Beide wurden in einem Fichtenforst bei Flinsberg gefunden.

3. Seltenheiten

Als pilzfloristische Seltenheiten des Mitteldeutschen Gebietes¹ können folgende Arten angesehen werden: *Boletus lupinus* (Bestimmung unsicher), *Cordyceps militaris*, *Gomphus clavatus*, *Inocybe fibrosa*, *Lepiota bucknallii*, *Pluteus luteomarginatus*, *Russula farinipes*, *Russula gracilis*. *Cordyceps militaris* wurde an verschiedenen Stellen bei

1) im geographischen Sinne, vergl. Schlüter und Blume (1929)

Martinfeld und bei Flinsberg im Pferdebachthal gefunden. Vom Fund bei Flinsberg (leg. J. Pelcz, Jena) wurde von H. Giehler (Ilmenau) das Substrat bestimmt. Es handelt sich um eine Puppe von *Phalera bucephala* L. Wahrscheinlich gehörten die Puppen der anderen Funde ebenfalls zu dieser Art.



Cordyceps militaris (L. ex St. Amans) Link

links: reifes Stroma auf einer Puppe, rechts: zwei junge Fruktifikationen auf einer Puppe, in der Mitte: ein reifes Stroma, das vom Substrat abgerissen wurde und mit dem Stiel im Moos steckt.

Foto: H. Dörfelt

Artenlisten der Exkursion

Die Einteilung in Klassen und Ordnungen (und z. T. in Familien) mit Ausnahme der Klasse *Myxomycetes* entspricht dem System von Kreisel (1969).

I. Liste: Exkursionen vom 10. 9. und 11. 9. in der Umgebung von Martinfeld, besonders in das Wagental (hauptsächlich Fageten über Kalk-, jedoch auch Misch- und Nadelwälder)

Klasse *Ascomycetes*

Ordnung *Pezizales*

Helvella lacunosa Afz. ex Fr.; *Humaria hemisphaerica* (Wiggers ex Fr.) Fuckel; *Otidea alutacea* (Pers.) Mass.; *Peziza succosa* Berk.;

Ordnung Helotiales

Coryne sarcoides (Jaqu. ex Fr.) Tul.; *Microglossum viride* (Pers. ex Fr.) Gill.; *Trichoscyphella willkommii* (Hartig) Nannf.;

Ordnung Xylariales

Ustulina deusta (Fr.) Petrak; *Xylaria hypoxylon* L. ex Fr.; *X. polymorpha* (Pers. ex Fr.) Grev.;

Ordnung Hypocreales

Claviceps microcephala (Wallr.) Winter; *Cordyceps militaris* (L. ex St. Amans) Link; *Nectria cinnabarina* (Tode ex Fr.) Fr.; *N. sinopica* Fr.;

Ordnung Sphaeriales

Diatrype disciformis (Hoffm. ex Fr.) Fr.; *Melogramma spiniferum* (Wallr.) de Not.;

Klasse Basidiomycetes

Ordnung Nidulariales

Cyathus striatus (Huds.) Willd. ex Pers.;

Ordnung Lycoperdales

Bovista pusilliformis (Kreisel) Kreisel; *Calvatia saccata* (Vahl.) Morg.; *Lycoperdon echinatum* Pers.; *L. perlatum* Pers.; *L. pyriforme* Schff.;

Ordnung Geastrales

Geastrum fimbriatum Fr.; *G. quadrifidum* Pers.;

Ordnung Phallales

Mutinus caninus (Huds.) Fr.; *Phallus impudicus* L. ex Pers.;

Ordnung Russulales

Russula alutacea Fr. em Melz.; *R. cyanoxantha* Schff. ex Fr.; *R. delica* Fr.; *R. densifolia* Secr.; *R. farinipes* Rom. ap Britz.; *R. fellea* Fr.; *R. foetens* Fr.; *R. gracilis* Burl.; *R. laurocerasi* Melz.; *R. lutea* (Huds. ex Fr.) Fr.; *R. mairei* Sing.; *R. ochroleuca* (Pers.) Fr.; *R. olivacea* (Schff. ex Secr.) Fr.; *R. rosacea* Pers. ex S. F. Gray; *R. virescens* (Schff.) Fr.; *Lactarius acris* Bolt. ex Fr.; *L. blennius* Fr.; *L. cilicioides* Fr.; *L. deterrimus* Gröger; *L. fluens* Boud.; *L. fuliginosus* Fr.; *L. pergamenus* (Swartz ex Fr.) Fr. sensu Moser (1967); *L. pterosporus* Romagn.; *L. sanguifluus* Paulet ex Fr.; *L. subdulcis* Bull. ex Fr.; *L. torminosus* (Schff. ex Fr.) S. F. Gray; *L. vellereus* (Fr.) Fr.;

Ordnung Boletales

Familie Strobilomycetaceae

Strobilomyces floccopus (Vahl. ex Fr.) P. Karst.;

Familie Boletaceae

Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr.; *Leccinum scabrum* (Bull. ex Fr.) S. F. Gray; *Suillus aeruginascens* (Secr.) Snell; *S. collinitus* (Fr.) O. Kuntze; *S. grevillei* (Klotzsch) Sing.; *S. granulatus* (L. ex Fr.) Kuntze; *S. luteus* (L. ex Fr.) S. F. Gray; *S. tridentinus* (Bres.) Sing.; *S. variegatus* (Sow. ex Fr.) Kuntze; *X. subtomentosus* (L. ex Fr.) Quél.; *X. chrysenteron* (Bull. ex St. Amans) Quél.;

Familie Gomphidiaceae

Chroogomphus rutilus (Schff. ex Fr.) O. K. Miller; *Gomphidius maculatus* (Scop.) Fr.;

Familie Paxillaceae

Hygrophorus aurantiaca (Wulf. ex Fr.) R. Mre.; *Paxillus atrotomentosus* (Batsch) Fr.; *P. involutus* (Batsch) Fr.;

Ordnung Agaricales

Familie Hygrophoraceae

Hygrocybe acutoconica (Clements) Singer; *H. agathosmus* Fr.; *H. cossus* (Sow. ex Bk.) Fr.; *H. leucophaeus* (Scop. ex Fr.) Fr.; *H. pudorinus* (Fr.) Fr.;

Familie Tricholomataceae

Clitocybe clavipes (Pers. ex Fr.) Kummer; *C. gibba* (Pers. ex Fr.) Kummer; *C. odora* (Bull. ex Fr.) Kummer; *C. phyllophila* (Fr.) Quél.; *Collybia butyracea* (Bull. ex Fr.) Quél.; *C. butyracea* (Bull. ex Fr.) Quél. var. *asemā* Fr.; *C. confluens* (Pers. ex Fr.) Kummer; *C. maculata* (A. & S. ex Fr.) Quél.; *C. peronata* (Bolt. ex Fr.) Sing.;

Laccaria amethystina (Bolt. ex Hooker) Murr.; *L. laccata* (Scop. ex Fr.) Bk. & Br.; *L. proxima* (Boud.) Pat.; *Marasmius alliaceus* (Jacq. ex Fr.) Fr.; *M. wynnei* Bk. & Br.; *Melanoleuca subpulverulenta* (Pers.) Metr.; *Mycena crocata* (Schrad. ex Fr.) Kummer; *M. galericulata* (Scop. ex Fr.) S. F. Gray; *M. oregonensis* A. H. Smith.; *M. pura* (Pers. ex Fr.) Kummer; *Oudemansiella platyphylla* (Pers. ex Fr.) Mos.; *O. radicata* (Rehlhan ex Fr.) Sing.; *Rhodocybe truncata* (Schff. ex Fr.) Sing.; *Tricholoma aurantium* (Schff. ex Fr.) Ricken; *T. orirubens* Quél.; *T. psammopus* (Kalchbr.) Quél.; *T. saponaceum* (Fr.) Kummer; *T. sculpturatum* (Fr.) Quél.; *T. sciodes* (Secr.) Mart.; *T. sulphureum* (Bull. ex Fr.) Kummer; *T. terreum* (Schff. ex Fr.) Quél.; *T. vaccinum* (Pers. ex Fr.) Kummer; *Tricholomopsis rutilans* (Schff. ex Fr.) Sing.;

Familie Rhodophyllaceae

Clitopilus prunulus (Scop. ex Fr.) Kummer; *Rhodophyllus sericellus* (Bull. ex Fr.) Quél.;

Familie Cortinariaceae

Cortinarius fulmineus Fr.; *C. infractus* Fr. ex Fr.; *C. varius* Fr.; *Hebeloma radicosum* (Bull. ex Fr.) Ricken; *Inocybe asterospora* Quél.; *I. bongardii* (Weinm.) Quél.; *I. brunnea* Quél.; *I. corydalina* Quél.; *I. descissa* (Fr.) Quél.; *I. dulcamara* (Alb. et Schw. ex Pers.) Kummer; *I. fastigiata* (Schff. ex Fr.) Quél.; *I. friesii* Heim; *I. pyriodora* (Pers. ex Fr.) Quél.; *Leucocortinarius bulbiger* (Alb. & Schw. ex Fr.) Sing.;

Familie Amanitaceae

Amanita inaurata Secr.; *A. phalloides* (Vaill. ex Fr.) Secr.; *A. rubescens* (Pers. ex Fr.) S. F. Gray; *A. vaginata* (Bull. ex Fr.) Quél.; *Pluteus atricapillus* (Secr.) Sing.; *P. luteomarginatus* Roll.; *P. nanus* (Pers. ex Fr.) Kummer; *P. salicinus* (Pers. ex Fr.) Kummer;

Familie Agaricaceae

Agaricus abruptibulbus Peck; *A. arvensis* Schff. ex Fr.; *A. dulcidulus* Schulz ?; *A. langei* (Moell.) Moell.; *A. perrarus* Schulz sensu Ricken (1915); *A. semotus* Fr. ?; *A. silvaticus* Schff. ex Secr.; *A. silvicola* (Vitt.) Sacc.; *Chamaemyces fracidus* (Fr.) Donk; *Lepiota aspera* (Fr.) Quél.; *L. castanea* Quél.; *L. clypeolaria* (Bull. ex Fr.) Kummer; *L. cristata* (A. & S. ex Fr.) Kummer; *L. oreadiformis* Vel.; *L. seminuda* (Lasch) Kummer; *Macrolepiota gracilentia* (Fr.); *M. procera* (Scop. ex Fr.) Sing.;

Familie Strophariaceae

Hypholoma capnoides (Fr. ex Fr.) Kummer; *H. fasciculare* (Huds. ex Fr.) Kummer; *H. sublateritium* (Fr.); *Kuehneromyces mutabilis* (Schff. ex Fr.) Sing. & Smith; *Pholiota astragalina* (Fr.) Sing.; *Stropharia aeruginosa* (Curt. ex Fr.) Quél. sensu lato;

Familie Coprinaceae

Coprinus comatus (Müll. ex Fr.) S. F. Gray; *C. micaceus* (Bull. ex Fr.) Fr.; *C. picaceus* (Bull.) Fr.; *C. radians* Desm.; *Psathyrella pyrotricha* (Holmsk.) Mos. ?;

Ordnung Polyporales

Panus conchatus (Bull. ex Fr.) Fr.; *Piptoporus betulinus* (Bull. ex Fr.) P. Karst.; *Polyporus ciliatus* Fr.; *P. melanopus* (Swartz ex Fr.) Fr.; *P. varius* Fr.; *Schizophyllum commune* Fr.;

Ordnung Cantharellales

Cantharellus cibarius L. ex Fr.; *C. cinereus* Pers. ex Fr.; *Clavaria vermicularis* Sow. ex Fr.; *Clavariadelphus pistillaris* (L. ex Fr.) Donk; *Clavulina cinerea* Bull. ex Schroet.; *Craterellus cornucopioides* (Fr.) Pers.; *Hydnum repandum* L. ex Fr.; *Lentinellus cochleatus* (Pers. ex

Fr.) P. Karst.; *Ramaria flaccida* (Fr.) Ricken; *R. ochraceo-virens* (Jungh.) Donk; *Sarcodon imbricatum* (L. ex Fr.) P. Karst.;

Ordnung Poriales (= Aphyllophorales)

Bjerkandera adusta (Willd. ex Fr.) P. Karst.; *Fomitopsis annosa* (Fr.) P. Karst.; *Ganoderma applanatum* (Pers. ex Wallr.) Pat.; *Laetiporus sulphureus* (Bull. ex Fr.) Bond. et Singer; *Osmoporus odoratus* (Wulfen ex Fr.) Singer; *Poria versipora* (Pers.) Baxter; *Stereum hirsutum* (Willd. ex Fr.) S. F. Gray; *Trametes betulina* (L. ex Fr.) Pilát; *T. confragosa* (Bolt. ex Fr.) Joerst.; *Tr. gibbosa* (Pers. ex Fr.) Fr.; *Tr. hirsuta* (Wulfen ex Fr.) Pilát; *Tr. versicolor* (L. ex Fr.) Pilát; *Tr. zonata* (Nes. ex Fr.) Pilát; *Tyromyces caesius* (Schr. ex Fr.) Murr.; *T. stipticus* (Pers. ex Fr.) Kotl. & Pouz.;

Ordnung Dacrymycetales

Calocera viscosa (Pers. ex Fr.) Fr.

II. Liste: Exkursion vom 12. 9. im Pferdebachthal bei Flinsberg

Klasse Myxomycetes

Lycogala epidendrum (Micheli) Fr.;

Klasse Ascomycetes

Ordnung Pezizales

Humaria hemisphaerica (Wiggers ex Fr.) Fuckel; *Peziza succosa* Berk.;

Ordnung Helotiales

Leotia lubrica Pers.; *Neobulgaria pura* (Fr.) Petrak.;

Ordnung Xylariales

Hypoxyton fragiforme (Pers. ex Fr.) Kickx.; *H. fuscum* (Pers. ex Fr.) Fr.; *Ustulina deusta* (Hoffm. ex Fr.) Petrak; *Xylaria hypoxyton* L. ex Fr.; *Xylaria polymorpha* (Fr.) Grev.;

Ordnung Hypocreales

Cordyceps militaris (L. ex St. Amans) Link; *Hypomyces odoratus* Arnold st. conid.; *Nectria galligena* Bres.; *N. modesta* v. Höhnelt; *Neuronectria peziza* (Tode ex Fr.) Munk;

Ordnung Sphaeriales

Diatrype disciformis (Hoffm. ex Fr.) Fr.; *D. stigma* (Hoffm. ex Fr.) Fr.; *Diatrypella circum-vallata* (Nees) Fuckel; *Melogramma spiniferum* (Wallr.) de Not.;

Ordnung Nidulariales

Cyathus striatus (Huds.) Willd. ex Pers.;

Klasse *Basidiomycetes*

Ordnung *Lycoperdales*

Lycoperdon echinatum Pers.; *L. perlatum* Pers.;

Ordnung *Geastrales*

Geastrum fimbriatum Fr.;

Ordnung *Phallales*

Phallus impudicus L. ex Pers.;

Ordnung *Russulales*

Lactarius acris Bolt. ex Fr.; *L. blennius* Fr.; *L. deterrimus* Gröger;
L. mitissimus Fr.; *L. pallidus* Pers. ex Fr.; *L. scrobiculatus* (Scop. ex
Fr.) Fr.; *L. vellereus* (Fr.) Fr.; *Russula delica* Fr.; *R. foetens* Fr.; *R.*
mairei Sing.; *R. mustelina* Sing.; *R. nauseosa* (Pers.) Fr.; *R. puellaris*
Fr.; *R. queletii* Fr.; *R. torulosa* Bres.; *R. xerampelina* (Schff. ex Secr.)
Fr.;

Ordnung *Boletales*

Boletus lupinus Krbh. ?; *B. edulis* Bull. ex Fr.; *Chroogomphus rutilus*
(Schff. ex Fr.) O. K. Miller; *S. aeruginascens* (Secr.) Snell; *S. grevillei*
(Klotzsch) Sing.; *S. tridentinus* (Bres.) Sing.; *Xerocomus badius* (Fr.)
Kühn. ex Gilb.;

Ordnung *Agaricales*

Familie *Hygrophoraceae*

Hygrophorus cossus (Sow. ex Bk.) Fr.; *H. eburneus* (Bull. ex Fr.) Fr.;

Familie *Tricholomataceae*

Clitocybe costata Kühn. & Romagn.; *C. ditopa* (Fr. ex Fr.) Gill.; *C.*
gibba (Pers. ex Fr.) Kummer; *C. gilva* (Pers. ex Fr.) Gill.; *C. odora*
(Bull. ex Fr.) Kummer; *Collybia hariolorum* (DC. ex Fr.) Quél.; *C.*
maculata (A. & S. ex Fr.) Quél.; *Laccaria amethystina* (Bolt. ex Hook.)
Murr.; *Marasmius androsaceus* (L. ex Fr.) Fr.; *M. cohaerens* (Pers. ex
Fr.) Fr.; *M. lupuletorum* (Weinm.) Fr.; *M. rotula* (Scop. ex Fr.) Fr.;
M. wynnei Bk.; & Bk.; *Micromphale foetidum* (Sow. ex Fr.) Sing.; *My-*
cena galopoda (Pers. ex Fr.) Kummer; *M. pelianthina* (Fr.) Quél.; *M.*
polygramma Bull. ex Fr.; *M. pura* (Pers. ex Fr.) Kummer; *Oudemans-*
siella mucida (Schrad. ex Fr.) v. Hoehn.; *O. radicata* (Relh. ex Fr.)
Sing.; *Tricholoma orirubens* Quél.; *T. terreum* (Schff. ex Fr.) Quél.;

Familie *Rhodophyllaceae*

Clitopilus prunulus (Scop. ex Fr.) Kummer;

Familie Crepidotaceae

Cortinarius collinitus Fr.; *C. varius* Fr.; *Hebeloma crustuliniforme* (Bull. ex Fr.) Quél.; *H. radicosum* (Bull. ex Fr.) Ricken; *H. sinapizans* (Paulet ex Fr.) Gill.; *Inocybe asterospora* Quél.; *I. corydalina* Quél.; *I. fibrosa* (Sow.) Gill.; *I. geophylla* (Sow. ex Fr.) Kummer var. *violacea* Pat.; *I. godeyi* Gill.;

Familie Crepitodaceae

Tubaria autochthona (Bk. & Br.) Boud.;

Familie Amanitaceae

Amanita inaurata Secr.; *A. pantherina* (DC. ex Fr.) Secr.; *Pluteus luctuosus* Boud.;

Familie Agaricaceae

Agaricus arvensis Schff. ex Fr.; *A. campester* (L.) Fr.; *A. stramineus* (Schff. & Moell.) Sing. ?; *Cystoderma amiantinum* (Scop. ex Fr.) Fay; *C. carcharias* (Pers. ex Secr.) Fay.; *Lepiota bucknallii* (3k. & Br.) Sacc.; *Macrolepiota procera* (Scop. ex Fr.) Sing.; *M. rhacodes* (Vitt.) Sing.;

Familie Strophariaceae

Hypholoma capnoides (Fr. ex Fr.) Kummer; *H. fasciculare* (Huds. ex Fr.) Kummer; *H. radicosum* Lge.; *Kuehneromyces mutabilis* (Schff. ex Fr.) Sing. & Smith; *Pholiota aurivella* (Batsch ex Fr.) Kummer; *Stropharia aeruginosa* (Curt. ex Fr.) Quél. sensu lato;

Familie Coprinaceae

Coprinus alopecia Lasch ex Fr.; *C. comatus* (Müll. ex Fr.) S. F. Gray; *C. micaceus* (Bull. ex Fr.) Fr.;

Ordnung Polyporales

Polyporus forquignoni Quél. ?; *P. melanopus* (Swartz ex Fr.) Fr.; *P. varius* Fr.;

Ordnung Cantharellales

Cantharellus cibarius L. ex Fr.; *C. tubaeformis* Bull. ex Fr.; *Clavariadelphus pistillaris* (L. ex Fr.) Donk; *Clavulina cinerea* Bull. ex Schroet.; *Craterellus cornucopioides* (Fr.) Pers.; *C. sinuosus* Fr.; *Gomphus clavatus* (Pers. ex Fr.) S. F. Gray; *Hydnum repandum* L. ex Fr.; *Lentinellus cochleatus* (Pers. ex Fr.) P. Karst.; *Ramaria aurea* (Schff. ex Fr.) Quél.; *Sarcodon imbricatum* (L. ex Fr.) P. Karst.;

Ordnung Poriales

Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx.; *Fomitopsis annosa* (Fr.) P. Karst.; *Stereum hirsutum* (Willd. ex Fr.) S. F. Gray; *Trametes gibbosa* (Pers. ex Fr.) Fr.; *Tr. versicolor* (L. ex Fr.) Pilát;

Ordnung *Dacrymycetales*

Calocera viscosa (Pers. ex Fr.) Fr.;

Ordnung *Tremellales*

Pseudohydnum gelatinosum (Scop. ex Fr.) P. Karst.; *Tremella lutescens* Pers.

Literatur:

Kreisel, H. (1969): Grundzüge eines natürlichen Systems der Pilze. Jena

Moser, M. (1967): Die Röhrlinge und Blätterpilze. Bd. II b/2 der Kleinen Kryptogamenflora. Heraus. H. Gams. Stuttgart

Ricken, A. (1915): Die Blätterpilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. 2 Bde. Leipzig

Schlüter, O. und E. Blume (1929): Beiträge zur Landeskunde Mitteldeutschlands. Festschrift zu dem 23. Deutschen Geographentage in Magdeburg. dargeb. v. Ortsausschuß Braunschweig

H. Dörfelt, 4101 Bennstedt, Hallesche Str. 8

Bericht über den V. Europäischen Mykologenkongreß in Dänemark vom 18.—25. September 1970

Reinhard Bickerich

Der V. Europäische Mykologenkongreß fand im vergangenen Jahre in Dänemark statt und war vom Institut for Sporeplanter (Institut für Sporenpflanzen) der Universität in Kopenhagen organisiert worden. Wegen der verhältnismäßig sehr hohen Kosten, vor allem für die Hotelunterbringung, waren nicht einmal 100 Personen zu diesem Kongreß erschienen. Auf der Teilnehmerliste waren nur 87 Personen aufgeführt (davon 30 allein aus Dänemark und 9 aus den anderen Skandinavischen Ländern). Polen war durch 5, die ČSSR durch 2 Teilnehmer vertreten. Die DDR war als solche nicht vertreten. Dr. Kreisel, vordem in Greifswald, jetzt in Kuba wirkend, hatte sich wohl zu dem Kongreß angemeldet und einen interessanten Vortrag mit dem Titel „Ektotropher und anektotropher Wald in Kuba“ eingesandt, der wie die anderen Kongreßvorträge in einer Zusammenfassung vervielfältigt ausgegeben wurde, war aber nicht erschienen.

Am 1. Tag des Kongresses fand am Nachmittag eine sehr lehrreiche Exkursion in den Wald Dyrehaven am nördlichen Stadtrand von Ko-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mykologisches Mitteilungsblatt](#)

Jahr/Year: 1972

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Dörfelt Heinrich

Artikel/Article: [Exkursionstagung vom 9.-13. September 1970 in Martinfeld \(Eichsfeld\) 10-19](#)