

Cerný, A.: Bionomie, Verbreitung und wirtschaftliche Bedeutung der Porlinge *Inonotus nidus-pici* Pilát und *Inonotus obliquus* (Pers. ex Fr.) Pilát in der ČSSR. Acta Mus. Nat. Pragae, 21 B, 157–244, 1965.

Dr. G. Ritter,

Institut für Forstwissenschaften Eberswalde, 13 Eberswalde-Finow
Friedrich-Engels-Straße 3

Verzeichnis der während der Exkursionstagung im Gebiet der Mittelelbe registrierten Pilze

Hanns Kreisel

Vom 18. bis 22. Mai 1977 führte die Arbeitsgruppe Mykologie der Sektion Mikrobiologie der Biologischen Gesellschaft der DDR eine Exkursionstagung im Gebiet der Mittelelbe durch. Standquartier war ein Ferienhaus am Spitzberg, nordwestlich von Roßlau. Unter den 28 Teilnehmern waren auch zwei Gäste aus der VR Polen.

Das für diese Frühjahrstagung ausgewählte Exkursionsgebiet — Alluvionen der Elbe sowie Grundmoränen- und Sandergebiet des Altpleistocäns — bildet ein Gegenstück zu dem anderthalb Jahre zuvor vom gleichen Arbeitskreis besuchten Endmoränen- und Sandergebiet des Jungpleistocäns im Kreis Neustrelitz (vgl. Mykol. Mitt. 21: 12–21, 1977). Die bei den zwei Veranstaltungen vorgefundenen Pilzfloren unterscheiden sich wesentlich: im Gebiet Neustrelitz wurden 277 Arten, im Gebiet Mittelelbe 177 Arten registriert, doch nur 36 Arten sind beiden Listen gemeinsam! Dies liegt erstens an der unterschiedlichen Jahreszeit, worauf z. B. das Fehlen der Familien *Amanitaceae*, *Lepiotaceae*, *Russulaceae* sowie der Gattung *Cortinarius* und der meisten anderen Mykorrhizapilze in der Mittelelbe-Ausbeute zurückzuführen ist, zweitens an Unterschieden im Klima (Gebiet Neustrelitz mehr subozeanisch, Gebiet Mittelelbe mehr subkontinental beeinflusst) und der Vegetation, drittens an der stärkeren Beachtung der Asko- und Deuteromyzeten während der Roßlauer Tagung.

Der pilzfloristische Reichtum des Mittelelbe-Gebietes hat schon zu Beginn des Jahrhunderts die Aufmerksamkeit von Mykologen erregt. Staritz (1903, 1913, 1917) hat umfangreiche Fundlisten publiziert. In jüngster Zeit haben u. a. Herrmann & Martinkowitz (1975), Herschel, Müller & Bergstädt (1975), Jahn & Müller (1976), Müller (1970, 1973) und Pieper (1962) eine Anzahl bemerkenswerter Einzelfunde, namentlich Porlinge, mitgeteilt. Unveröffentlichte Funde von W. Becker, K. Kersten, G. Martin-

köwitz und anderen sind für die europäische Pilzkartierung verwertet worden.

Das Ergebnis der bei vorwiegend naßkalter Witterung durchgeführten Exkursionen war gut. Neben den für den Frühjahrsaspekt charakteristischen, allgemeiner verbreiteten Arten der Gattungen *Calocybe*, *Desmazierella*, *Gyromitra*, *Helvella*, *Morchella*, *Rhodophyllus*, *Strobilurus* u. a. konnten typische Auenwaldpilze demonstriert werden, namentlich *Auricularia mesenterica*, *Ganoderma resinaceum*, *Lentinus tigrinus*, *Pleurotus cornucopiae* und *Trametes (Funalia) extenuatus*. Hinzu kommen einige floristische Besonderheiten: *Agrocybe firma* (Abb. 5)

(Erstnachweis für die DDR; bisher bekannt aus dem Alpen- und Vor-alpengebiet, Karpaten, aber auch bei Paris und bei Białowieża in Ostpolen), *Agaricus aestivalis* var. *veneris*, *Rhodophyllus sepium*, *Pluteus* cf. *griseopus* (Erstnachweis in der DDR; aus Großbritannien beschrieben), *Polyporus arcularius*, *Auriculariopsis ampla* und *Sarcodontia setosa*. (Abb.)

An der Bestimmung beteiligten sich Dr. G. Arnold (Weimar), Dr. D. Benkert (Potsdam), Dr. A. Bujakiewicz (Poznań), R. Conrad (Gera), Dr. H. Dörfelt (Halle), BPS F. Gröger (Warza), BPS M. Herrmann (Halle), M. Huth (Freyburg/U.), Dr. habil. H. Kreisel (Greifswald), Doz. Dr. habil. M. Lisiewska (Poznań), K.-H. Müller (Vockerode), Dr. R. Rauschert (Halle) und G. Zscheschang (Herrnhut).

Die Fundorte (Lokalitäten) sind in der Liste mit folgenden Abkürzungen angeführt:

a) Fundorte im Grundmoränen- und Sandergebiet nördlich der Elbe

JB = NSG Jütrichauer Busch bei Zerbst, 70–75 m ü. M. Traubekirschen-Erlen-Eschenwald (*Pado-Fraxinetum*) und Stieleichen-Hainbuchenwald (*Lathraeo-Carpinetum*) im Bereich der Grundmoräne. 21. V.

SP = Waldgebiet am Spitzberg nw. Roßlau, 80–100 m ü. M. Kiefernforsten mit Birke, Eiche, Robinie auf Sandboden; Brandstellen; 20.–22. V.

b) Fundorte im Elbtal

LB = Leiner Berg bei Dessau-Waldersee, 60–70 m ü. M. Auenwald (*Fraxino-Ulmetum*) und angrenzende Wiese; einige sehr alte, gepflanzte, eigentlich standortfremde Rotbuchen. 19. V.

LÖ = am Löbben bei Dessau, 65 m ü. M. Waldrand, Pappelpflanzung in der Nähe einer Biberburg. 19. V.

DM = Binnendüne „Kannabude“ bei Dabrun-Melzweg, östlich Wittenberg, 70–75 m ü. M. Kiefernforst, mesophile Sand-Trockenrasen, Koppeln und Reste von Obstgärten. 19. V.

In die Liste wurden auch einige Funde während der am 26. 3. 1977 von Prof. Dr. H. H. Handke, Dr. P. Hübsch, Dr. H. Kreisel und K.-H. Müller durchgeführten Vorexkursion einbezogen. Die Aufzählung folgt der im Handbuch für Pilzfreunde, Bd. VI, S. 188–191 (1975) dargestellten systematischen Gliederung.

Ascomycetes

Pezizales

Anthracobia macrocystis (Cke.) Boud. (det. Benkert), DM auf Brandstelle.
Cheilymenia stercorea (Pers. ex Fr.) Boud. (det. Kreisel), DM auf Kuhmist am 26. III.

Desmazierella acicola Lib. (det. Arnold), SP auf vorjährigen *Pinus*-Nadeln am Boden.

Discina perlata (Fr.) Fr. (det. Arnold), SP.

Gyromitra esculenta (Pers. ex Fr.) Fr., SP.

Helvella acetabulum (L. ex St.-Am.) Qué. (det. Benkert), SP westlich Meinsdorf, Wegrand im Laubwald.

Helvella lacunosa Afz. ex Fr. (det. Arnold), SP am Rande eines Waldweges, Sandboden.

Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf. (det. Benkert), SP, Wegrand im Kiefernforst.

Iodophanus carneus (Pers.) Korf (det. Benkert), DM auf Aschehaufen.

Lamprospora dictydiola Boud. (det. Benkert), SP nach Meinsdorf zu auf Feuerstelle bei *Funaria hygrometrica*.

Morchella conica Pers. ex Fr. (det. Gröger), SP.

Peziza echinospora Karst. (det. Benkert), SP nach Meinsdorf zu, auf Brandstelle.

Peziza praetervisa Bres. (det. Benkert), SP, nach Meinsdorf zu, auf Brandstelle.

Peziza varia (Hedw.) Fr. s. str. (det. Benkert), JB, SP westlich Meinsdorf, Wegrand im Laubwald. — *P. varia* s. lato, LB an totem Holz von *Fagus sylvatica*.

Peziza vesiculosa Bull. ex St.-Am., JB.

Trichophaea abundans (Boud.) Boud. (det. Benkert), SP, nach Meinsdorf zu, auf Brandstelle bei *Funaria hygrometrica*.

Helotiales

✕ *Calloria fusarioides* (Berk.) Fr. (det. Arnold), LÖ an dünnen Stengeln von *Urtica dioica*.

✕ *Cenangium ferruginosum* Fr. ex Fr. (det. Benkert), SP an *Pinus*-Stämmchen.

✕ *Dasyscyphus brevipilus* Le Gal (det. Benkert), SP auf Laubholz in Eschenwäldchen.

✕ *Lachnellula calyciformis* (Fr.) Dharne (det. Benkert), SP an *Pinus sylvestris*.



Abb. 1

Mutinus elegans. Standortaufnahme.

Am Rezeptakulum klebt ein Stück Primordialgewebe. Die beiden Löcher im Rezeptakulum sind Kunstprodukte.

Foto: K. Herschel





Abb. 2

Mutinus elegans.

Der Pilz nach Streckung in der Formalinlösung.

Zeichnung: K. Herschel



Inonotus nidus-pici an Rotbuche. Links und rechts junge, hellbraune Fruchtkörper (6. 8. 1977)

Abb. 3




Abb. 4

Inonotus nidus-pici
an Spitzahorn.
Fruchtkörper
verschiedenen
Alters sowie
Spechtloch (unten)
(6. 8. 1977)



Abb. 5

Agrocybe firma (Peck) Kühner, NSG Jütrichauer Busch bei Zerst, leg.
G. Arnold. Foto: P. H ü b s c h



Abb. 6

Bergbau- und Greifenstein-Museum



Abb. 7

Pilzmodellschau — Glasvitriten

Foto: Franz



Abb. 8

Pilzmodellschau — Detail

✕ *Lachnellula occidentalis* (Hahn & Ayers) Dharne (det. Benkert), SP an *Larix*.

✕ *Mollisia* spec., JB an Ästen.

✕ *Pezizula frangulae* (Fr.) Fuck. (det. Benkert), SP an *Frangula* in Eschenwäldchen.

✕ *Pezizella chionea* (Fr.) Dennis (det. Benkert), SP an *Pinus*-Nadeln.

Xylariales

Hypoxylon deustum (Hoffm. ex Fr.) Grev. = *Ustulina deusta* (Hoffm. ex Fr.) Petrak, LB an Stammfuß von *Fagus sylvatica*.

Hypoxylon fragiforme (Pers. ex Fr.) Kickx, LB.

Hypoxylon multifforme (Fr.) Fr. (det. Benkert), JB.

✕ *Xylaria carpophila* Pers., JB und LB an Fruchthüllen von *Fagus sylvatica*.

✕ *Xylaria hypoxylon* (L. ex Fr.) Grev., LB an *Fagus sylvatica*.

✕ *Xylaria longipes* Nitschke, LB an Holz von *Fagus sylvatica*.

Sphaeriales

Diatrype disciformis (Hoffm. ex Fr.) Fr., JB.

Diatrype stigma (Hoffm. ex Fr.) Fr. (det. Arnold), SP an toten, am Boden liegenden *Quercus*-Zweigen.

Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nitschke (det. Arnold), JB an toten, am Boden liegenden *Betula*-Zweigen.

✕ *Melogramma spiniferum* (Wallr.) de Not. (det. Benkert), LB an *Fagus sylvatica*.

Hypocreales (Nectriales)

✕ *Hypocrea fungicola* (Karst.) Sacc. = *H. pulvinata* Fuck. (det. Arnold), JB an Fruchtkörper von *Piptoporus betulinus*.

✕ *Nectria episphaeria* (Tode ex Fr.) Fr. (det. Arnold), SP auf alten Stromata von *Diatrype stigma* auf toten *Quercus*-Zweigen.

Phacidiales

✕ *Colpoma quercinum* (Pers. ex St.-Am.) Wallr. (det. Arnold), SP an toten *Quercus*-Zweigen.

Dothideales

✕ *Hysterium alneum* (Ach.) Schroet. (det. Arnold), SP an am Boden liegendem *Quercus*-Holz.

✕ *Massaria anomia* (Fr.) Petrak (det. Arnold), SP an trockenen Ästen von *Robinia pseudacacia*.

Basidiomycetes

Uredinales

Ochropsora sorbi (Oud.) Dietel (I), JB an *Anemone nemorosa*.

Puccinia aegopodii (Schum.) Mart. (III), JB an *Aegopodium podagraria*.

Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr. (O), LB an *Cirsium arvense*.

Auriculariales

✕ *Auricularia mesenterica* (Dicks. ex S. F. Gray) Pers., DM.

Tremellales

Exidia truncata Fr., JB.

Tremella foliacea (Pers. ex S. F. Gray) Pers., JB, SP.

Tulasnellales

Cristella nivea (Fr.) Lundell (det. Benkert), SP Eschenwäldchen an morschem Ast.

Poriales

Auriculariopsis ampla (Lév.) Mre. (det. Gröger), JB, DM.

Bjerkandera adusta (Willd. ex Fr.) Karst., JB an *Carpinus betulus*, LB.

Chondrostereum purpureum (Pers. ex Fr.) Pouz., JB, SP.

Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Fr., JB eine hellhütige Form an Stämmen von *Betula pubescens*.

Fomitopsis pinicola (Sw. ex Fr.) Karst., SP.

Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk = *G. europaeum* Steyaert, LB an Stumpf von *Fagus sylvatica*; im Dorf Riesigk an lebendem *Tilia*-Stamm, von Herrn Müller demonstriert.

Ganoderma applanatum (Pers. ex S. F. Gray) Pat., JB, LB.

Ganoderma pfeifferi Bres., LB an liegendem Stamm von *Fagus sylvatica*.

Ganoderma resinaceum Boud. (det. Müller), am 26. III. in Dessau-Walderssee, vorjährige Exemplare am Fuße eines lebenden *Quercus*-Stammes.

Hapalopilus nidulans (Fr.) Karst., JB an *Betula*-Ast.

Hymenochaete rubiginosa (Dicks. ex Fr.) Lév., JB.

Incrustoporia semipileata (Peck) Donk, SP.

Inonotus obliquus (Pers. ex Fr.) Pil., imperfekte Fruchtkörper (Chlamydo-sporenstadium), JB an *Betula pubescens*.

Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Murr., JB; LB an Stumpf und altem Stamm von *Quercus robur*.

Leptoporus lacteus (Fr.) Quél., LB.

Leptoporus stypticus (Pers. ex Fr.) Quél., SP.

Mycoacia uda (Fr.) Donk (det. Benkert), LB an liegendem Stamm von *Fagus sylvatica*.

Oxyporus late-marginatus (Dur. & Mont. ex Mont.) Donk (det. Müller), LB an liegendem Stamm von *Fagus sylvatica*.

Phaeocoriolellus trabeus (Pers. ex Fr.) Kotl. & Pouz. = *Gloeophyllum trabeum* (Pers. ex Fr.) Murr. (det. Huth), DM.

Phellinus contiguus (Pers. ex Fr.) Pat. (det. Kreisel), JB an am Boden liegenden Ästen von *Quercus robur*.

Phellinus igniarius (L. ex Fr.) Quél. var. *igniarius* (det. Kreisel), LB und LÖ an *Salix*-Stämmen.

Phellinus robustus (Karst.) Bourd. & Ga., JB und LB an lebenden Stämmen von *Quercus robur*.

Ptychogaster albus Cda., SP.

Sarcodontia setosa (Pers.) Donk (det. Kreisel), Landstraße zwischen Wörlitz und Riesigk, Myzel an absterbendem Stamm von *Malus domestica*.

Serpula himantioides (Fr.) Bond., SP.

Stereum hirsutum (Willd. ex Fr.) S. F. Gray, JB, LB.

Stereum rugosum (Pers. ex Fr.) Fr., JB am 26. III.; LB.

Stereum sanguinolentum (Alb. & Schw. ex Fr.) Fr. (det. Arnold), SP an *Pinus sylvestris*.

Thelephora terrestris Fr., DM.

Trametes extenuatus Dur. & Mont. = *Funalia extenuata* (Dur. & Mont.) Dom., LB an *Fraxinus excelsior*.

Trametes gibbosus (Pers. ex Fr.) Fr., LB.

Trametes hirsutus (Wulf. ex Fr.) C. G. Lloyd, JB; LB an *Fagus sylvatica*.
Trametes versicolor (L. ex Fr.) C. G. Lloyd, LB.
Trichaptum abietinum (Dicks. ex Fr.) Ryv. = *Trametes abietinus* (Dicks. ex Fr.) Pil., DM an *Pinus sylvestris*.

Cantharellales

Auriscalpium vulgare S. F. Gray, SP an Zapfen von *Pinus sylvestris*; DM an 26. III. ebenso.

Dacrymycetales

Calocera cornea (Batsch ex Fr.) Fr., SP.
Dacrymyces ellisii Coker (det. Benkert), JB, SP.
Dacrymyces stillatus Nees ex Fr. (det. Benkert), JB.

Polyporales

Lentinus tigrinus (Bull. ex Fr.) Fr., LB, DM.
Piptoporus betulinus (Bull. ex Fr.) Karst., JB an Stämmen von *Betula pubescens*.
Pleurotus cornucopiae Paulet ex Fr., LB an *Ulmus minor* (= *U. campestris*); DM.
Polyporus arcularius (Batsch) ex Fr. (det. Kreisel), LB an abgefallenem Ast von *Aesculus hippocastanum*; DM.
Polyporus brumalis (Pers.) ex Fr., SP.
Polyporus ciliatus Fr. ex Fr. f. *lepidus* (Fr. ex Steud.) Kreisel (det. Kreisel), JB, LB häufig, SP.
Polyporus lentus Berk. = *P. forquignonii* Qué., LB an abgefallenen Ästen von *Fagus sylvatica*.
Polyporus squamosus (Huds.) ex Fr., JB, LB.
Schizophyllum commune Fr., JB, LB, DM.

Agaricales

Agaricus aestivalis (Moell.) Moell. var. *veneris* Heim & Becker (det. Gröger), JB, DM.
Agaricus campestris L. ex Fr., LB auf Waldwiese.
Agrocybe dura (Bolt. ex Fr.) Sing., SP.
Agrocybe firma (Peck) Kühner (det. Kreisel), JB an modrigem Holz.
Agrocybe praecox (Pers. ex Fr.) Fayod, JB, LB, LÖ.
Agrocybe semiorbicularis (Bull. ex Fr.) Fayod, JB, SP.
Calocybe gambosa (Fr.) Donk, JB, SP, LB u. a. 2 Hexenringe bildend.
Clitocybe sinopica (Fr. ex Fr.) Kumm., SP.
Collybia dryophila (Bull. ex Fr.) Kumm., JB.
Collybia prolixa (Hornem. ex Fr.) Gill. (det. Kreisel), LB auf Auenwaldboden.
Conocybe lactea (Lge.) Métrod, LB an Wegrand.
Coprinus angulatus Peck = *C. boudieri* Qué., SP auf Brandstelle.
Coprinus cinereus (Schff. ex Fr.) S. F. Gray (det. Gröger), JB.
Coprinus domesticus (Bolt. ex Fr.) S. F. Gray (det. Gröger), DM.
Coprinus patouillardii Qué. (det. Zschieschang), DM.
Coprinus radians Desm. (det. Kreisel), LB, hier auch schon am 26. III. an totem Ast mit Ozonium-Bildung.
Coprinus saccharinus Romagn. (det. Gröger), LB.
Coprinus cf. *xanthothrix* Romagn., JB häufig.

- Dermocybe cinnamomeolutea* (Orton) Mos., DM.
Gerronema fibula (Bull. ex Fr.) Sing., JB.
Hebeloma cf. *dunenes* Corb. & Heim (det. Gröger), DM.
Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr. ex Fr.) Sing., JB.
Hypholoma capnoides (Fr. ex Fr.) Kumm., DM.
Hypholoma fasciculare (Huds. ex Fr.) Kumm., LB an *Fraxinus*; DM.
Inocybe lacera (Fr.) Kumm., SP.
Kuehneromyces mutabilis (Schff. ex Fr.) Sing. & Smith, JB, LB.
Lepista flaccida (Sow. ex Fr.) Pat., DM.
Marasmius androsaceus (L. ex Fr.) Fr., SP.
Marasmius oreades (Bolt. ex Fr.) Fr., SP.
Mycena acicula (Schff. ex Fr.) Kumm. = *Trogia acicula* (Schff. ex Fr.) Corner (det. Gröger), LB.
Mycena galericulata (Scop. ex Fr.) S. F. Gray, JB, SP, LB.
Mycena maculata Karst. (det. Lisiewska), JB.
Mycena niveipes Murr. (det. Lisiewska), JB, LB.
Mycena praecox Vel. (det. Huth), JB zahlreich an morschen Ästchen.
Mycena vitilis (Fr.) Qué! (det. Gröger), JB.
Panaeolus fimicola (Fr.) Gill. (det. Huth), JB.
Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Qué! , JB in Kohldistelwiese; LB in Waldwiese.
Pholiota carbonaria (Fr.) Sing., SP auf Brandstelle.
Pholiota lubrica (Pers. ex Fr.) Sing. (det. Kreisel), DM auf Streu von *Pinus sylvestris*, ebenso schon am 26. III.
Pluteus atricapillus (Secr.) Sing. = *P. cervinus* auct., LB; DM an Stumpf von *Populus*.
Pluteus cf. *griseopus* Orton (det. Kreisel), LB an morschem Holz im Auenwald.
Pluteus patricius (Schulzer) Boud., SP.
Psathyrella cf. *atomata* (Fr.) Qué! (det. Gröger), JB.
Psathyrella candolleana (Fr.) Mre. (det. Zscheschang), LB.
Psathyrella marcescibilis (Britz.) Sing. (det. Gröger), LB.
Psathyrella spadiceo-grisea (Fr.) Mre. (det. Zscheschang), JB; LB, hier auch schon am 26. III.
Psilocybe muscorum (Orton) Mos. (det. Zscheschang), DM.
Rhodophyllus clypeatus (L. ex Fr.) Qué! , LB.
Rhodophyllus sepium (Noullet & Dassier) Romagn., LB unter *Prunus domestica*.
Rhodophyllus staurosporus (Bres.) Lge., JB.
Strobilurus stephanocystis (Hora) Sing. (det. Kreisel), JB; DM massenhaft an Zapfen von *Pinus sylvestris*, ebenso schon am 26. III.
Strobilurus tenacellus (Pers. ex Fr.) Sing. (det. Kreisel), JB häufig.
Tephroclype atrata (Fr. ex Fr.) Donk, SP auf Brandstelle.
Tricholoma terreum (Schff. ex Fr.) Kumm., DM unter *Pinus sylvestris*.
Tubaria furfuracea (Pers. ex Fr.) Gill., LB am 26. III.
Tubaria pallidisporea Lge., LB.

Boletales

- Leccinum scabrum* (Bull. ex Fr.) S. F. Gray, SP.
Leccinum versipelle (Fr.) Snell = *L. testaceo-scabrum* (Secr.) ex Sing., SP.
Paxillus involutus (Batsch ex Fr.) Fr., SP.
Suillus granulatus (L. ex Fr.) O. K., DM unter *Pinus sylvestris*.

Tapinella panuoides (Fr.) Gilb. f. *panuoides* = *Paxillus panuoides* (Fr.) Fr. f. *panuoides*, SP, DM.

Nidulariales

Crucibulum laeve (Huds. ex Relhan) Kambly, DM.

Sphaerobolus stellatus Tode ex Pers. (det. Bujakiewicz), LB an toten Ästen am Boden.

Lycoperdales (vorjährige Fruchtkörper, det. Kreisel)

Bovista plumbea Pers. ex Pers., JB, SP, DM.

Calvatia utriformis (Bull. ex Pers.) Jaap, JB.

Langermannia gigantea (Batsch ex Pers.) Rostk., LB, DM.

Lycoperdon lividum Pers. = *L. spadiceum* Pers., DM.

Lycoperdon perlatum Pers., SP.

Lycoperdon pyriforme Schff. ex Pers., JB am 26. III.

Gaeastrales

Gaeastrum pectinatum Pers., SP.

Deuteromycetes (det. Arnold)

Moniliales

Chloridium spec., LB an am Boden liegendem Holz von *Carpinus betulus*.

Dictyosporium elegans Cda., SP an am Boden liegendem Holz von *Quercus*.

Doratomyces spec., SP, Unterseite der Rinde eines am Boden liegenden Astes von *Robinia pseudacacia*.

Eurasina bondarzewiae G. Arnold, SP auf Fruchtkörper von *Stereum sanguinolentum* an Pinus.

Fusarium spec., JB auf Stroma von *Diatrypella verruciformis* an *Betula*.

Helicomyces aureus Cda., SP an am Boden liegendem Holz von *Quercus*.

Menispora ciliata Cda., SP an am Boden liegendem Holz von *Quercus*.

Oedemium didymum (Schm.) Hughes, LB an einem liegenden *Ulmus*-Stamm.

Paecilomyces elegans (Cda.) Mason & Hughes, JB an am Boden liegendem Holz.

Polyscytalum griseum Sacc., SP an am Boden liegendem Ast von *Quercus*.

Rhinocladiella spec., SP an am Boden liegendem Holz von *Quercus*.

Sporotrichum spec., JB an am Boden liegendem Holz.

Verticillium cyclosporum (Grove) Mason & Hughes, LB an am Boden liegender Rinde von *Quercus*.

Melanconiales

Melanconium betulinum Schm. & Kunze, JB an am Boden liegenden Zweigen von *Betula*.

Literatur:

Herrmann, M. & Martinköwicz, A.: Der Falsche Schwefelröhrling — *Boletus junquilleus* Quéf. — in den Kreisen Roßlau und Querfurt gefunden. — Mykol. Mitt. 19: 22–25, 1975.

Herschel, K., Müller, K.-H. & Bergstädt, V.: Bemerkenswerte holzbewohnende Pilze bei Vockerode. — Mykol. Mitt. 19: 8–19, 1975.

- Jahn, H. & Müller, K.-H.: *Podoscypha multizonata* (Berk. & Br.) Pat. bei Dessau (Bezirk Halle, DDR) gefunden. — Westfäl. Pilzbriefe 11: 22–26, 1976.
- Müller, K.-H.: *Fomitopsis cytisina* (Berk.) Bond. et Sing. — Eschenbaumschwamm. — Mykol. Mitt. 14: 93–94, 1970.
- Müller, K.-H.: *Phellinus hartigii* (Allescher & Schnabl) Bond. bei Dessau. — Mykol. Mitt. 17: 54–55, 1973.
- Pieper, H.: Der Frühlingstrichterling — ein seltener Winterpilz. — Mykol. Mitt. 6: 75–76, 1962.
- Staritz, R.: Beitrag zur Pilzkunde des Herzogtums Anhalt. — Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 45: 59–96, 1903.
- Staritz, R.: Zweiter Beitrag zur Pilzkunde des Herzogtums Anhalt. — Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 55: 55–86, 1913.
- Staritz, R.: Dritter Beitrag zur Pilzkunde des Herzogtums Anhalt. — Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 59: 62–111, 1917.

Prof. Dr. habil. H. Kreisel,
Wissenschaftsbereich Allgemeine Mikrobiologie,
Sektion Biologie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität,
22 Greifswald, Ludwig-Jahn-Straße 15

Pilzmodellschau im Bergbau- und Greifenstein-Museum bei Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge

Bruno Decker

Um dem Verlangen vieler Menschen nach Erholung und sinnvoller Freizeitgestaltung gerecht zu werden, wurde ein kreisgeleiteter volkseigener Betrieb mit der Bezeichnung „VEB (K) Naherholung Ehrenfriedersdorf“ gebildet, der wegen seines überregionalen Charakters ab 1. 7. 1977 in „VEB Erholungsgebiet Greifensteine/Greifenbachstauweiher“ umbenannt wurde.

Das Objekt umfaßt ein großes Familien-Camping-Gelände mit Bade- und Wassersportmöglichkeiten am „Geyerschen Teich“, ein Naturtheater, herrliche Aussichts- (und Kletter-) felsen, eine gute gastronomische Betreuung und schließlich das seit langer Zeit dort bestehende **Bergbau- und Greifensteinmuseum** (Abb. 6).

Im ersten Stock dieses Museums wurde am 24. 4. 1977 eine Dauerpilzausstellung eröffnet, deren Hauptinitiator Kurt Oestreich, der derzeitige Kreisbeauftragte für Pilzaufklärung von Flöha, ist. Ausgestellt sind nur Pilzmodelle und -aquarelle, die ausschließlich der Pilzaufklärung dienen. Die Modelle hat Oestreich größtenteils aus Gips, aber auch aus anderen Materialien hergestellt, koloriert, z. T. lackiert oder dauerhaft präpariert. Insgesamt sind 44 Pilzarten ausgestellt; jede Art in mehreren Exemplaren in verschiedenen Ent-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mykologisches Mitteilungsblatt](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [21](#)

Autor(en)/Author(s): Kreisel Hanns

Artikel/Article: [Verzeichnis der während der Exkursionstagung im Gebiet der Mittelalpe registrierten Pilze 102-110](#)