

FINE SOMMERAUSBEUTE AUS WINDISCHGARSTEN . (LEPIDOPT.)

Zum Vortrag von Hans Reisser, Wien.

Liste der erbeuteten Lepidopteren.

Während des Sommeraufenthaltes von Mitte Juli bis Mitte August 1949 in Windischgarsten wurde, soweit dies das Wetter erlaubte, Falterfang betrieben, zumeist Lichtfang

Die besuchten Lokalitäten waren das Hochmoor in Fiedlbach (beim Tunnel) (E), Dümmlerhütte am Warscheneck, ca. 1600 m (D), am Warscheneck selber das Plateau am Toten Mann und die südwestseitig gelegenen Hänge (W), die Gowlialm am Kleinen Pyrhgas (G) mit gutem Leuchterfolg bei Vollmond im Bergeschatten, am Kleinen Pyrhgas ca. 1900 m (P), Waldhang Sprengaus bei Windischgarsten (S), auf der Muttlung, ca. 1000 m (M), beim Ort Windischgarsten (WG), und im Sengsengebirge: Rettenbachtal (R), Anstieg zum Hohen Nock und dessen Gipfel (N). Der Anflug war meist gut.

Erwähnenswert sind folgende Falter :

- Pieris napi* L. (E)
Brenthis pales Schiff. (G)
Erebia medusa hippomedusa O. (G)
Erebia manto Esp. (D)(G), darunter ein ♂ mit strahlig ausgeflossenen Randflecken.
 -"- *gorge* Esp. (W)
 -"- *aethiops* L. (M)
 -"- *pronoe* Esp. (G)(P)
 -"- *ligea* L. (G)
Roeselia strigula Schiff. (M)
Cybosia mesomella L. (F)
Endrosa irrorella Cl. (G)
Oeonistis quadra L. (S)(M)
Ilema deplana Esp. (S)(M)
 -"- *lurideola* Zck. (G)
 -"- *lutarella* L. (S)
 -"- *cereola* Hb. (G) ein ♂ 6.8.49
Diacrisia sannio L. (G)
Trichiura crataegi ariae Hb. (G) ein ♂ 5.8.49
Selenephora lunigera lobulina Esp. (S)(M)
Pterostoma palpina L. und f. *grisea* Kitt (F)(S)
Lophopteryx camelina L. (D)
Epichnopteryx ardua Mn. (W)
Hepialus carna Esp. Die ♂♂ zahlreich gegen Morgen am Licht, (D,G,P)
Euxoa recussa Hb. (M)
Agrotis simplonia HG (D)(W)
 -"- *corticea* Hb. (G)
Ochropleura flammata F. (D)
 -"- *musica* Hb. (D)
Epipsilia latens Hb. (D)(W)
 -"- *grisea* Tr. (D)(W)(G)
Rhyacia helvetina B. (G)
 -"- *simulans* Hfn. (D)
Chersotis ocellina Hb. (W)(G)
 -"- *cuprea* F. (M)(G)
Lampra pronuba L. mit diversen Formen (D)
Opigena polygona F. (D)
Lycophotia porphyrea Schiff. (F)(D)(W)(G)
Diarsia brunnea F. (M)
Anomogyna rhaetica Stgr. (D) ein ♂ in der Morgendämmerung.
 -"- *speciosa* Hb. (D) nicht selten, bis zu den ganz verdunkelten Formen.
Amathes ashworthi candelarum Stgr. (D)
 -"- *baja* F. (S)(M)(D)
 -"- *hyperborea carnica* Her. (D)
Eurois occulta L. (D)(G)
Aplecta tinctoria Brhm. (D) ein defektes ♂.
 -"- *advena* Schiff. (G)
Polia nana Hfn. (*Mamestra dentina* Schiff.) (D)(W)
Hadena reticulata Vill. (D) ein defektes ♂.
Scotogramma marmorosa microdon Gn. (D)(W)
Polia proxima Hb. (D)
Harmodia caesia Schiff. (D)

- Harmodia bicruris* Hfn. (WG)(M)
Bombycia viminalis F. mit f. *obscura* Stgr. (D)(S)
Parastichtis monoglypha Hfn. und f. *infusata* B.-Wh. (D)(W)
Crino adusta F. (D)(S)
Crymodes platinea Tr. (D)
 -"- *rubrirena* Tr. (D)
 -"- *zeta pernix* HG. (D)(G)
 -"- *maillardi* HG. (D)
Parastichtis rurea alopecurus Esp. (D)
Auchmis colma L. (S)
Lithomoia rectilinea Esp. (D) ein defektes ♂.
Hyphilare albipuncta F. (S)
Sideridis andereggi B. (D)(W) u. f. *engadinensis* Mill. (W)
Athetis alsines F. (S)(M)
Athetis blanda Schiff. (*taraxaci*) (S)
Stygiostola umbratica Gze. (E)
Cucullia lucifuga L. (WG)(M)
Prothymnia viridaria Cl. (M)
Phytometra variabilis Pill. (G)
 -"- *chryson* Esp. (S) beobachtet.
 -"- *pulchrina* Hw. (D)
 -"- *jota* L. (WG) beobachtet.
 -"- *chrysis* L. (WG) beobachtet.
 -"- *bractea* F. (D)(G)
Syngrapha interrogationis L. und f. *simplex* Strd. (D)(G)
 -"- *ain* Hchw. (W)(M)
Parascotia fuliginaris L. (S)
Hypena proboscidalis (S)

Hemistola chrysoprasaria Esp. (*vernaria*) (M)
Scopula nigropunctata Hfn. (*strigilaria* Hbn.) (S)(M)
 -"- *ornata* L. (M)
 -"- *ternata* Schrk. (*fumata*) (G)
 -"- *incanata adjunctaria* B. (G)
Sterrha serpentata Hfn. (*similata* Thbg.) (E)(M)
 -"- *sylvestraria* Hbn. (*straminata* Tr.) (E)
 -"- *dilutaria* Hbn. (S)
 -"- *biselata* Hfn. (S)(M)
 -"- *aversata remutata* L. (*spoliata* Stgr.) und *aurata* Fchs. (M)
Ortholitha bipunctaria und verdunkelte Formen (M) f. *gach-*
taria Frr. und f. *maritima* Seeb.
-
- Ortholitha bipunctaria* Schiff. etc. (M)(D)
 -"- *chenopodiata* L. (G)(M)
Anaitis praeformata Hbn. (D)(G)
Triphosa dubitata L. und f. *cinerea* Stphs. (D)(W)(G)
Lygris populata L. (E)(G)
 -"- *pyraliata* Schiff. (M)
Cidaria fulvata Forst. (G)
 -"- *variata* Sch. (S) defekt.
 -"- *cognara geneata* Feisth. (D)(G)
 -"- *truncata* Hfn. (D)(G)
 -"- *citrata* L., häufiger (E)(D)(G)(W), Nock (Feuchtau)
 -"- *fluctuata* L. (S)
 -"- *montanata* Schiff. (D)(W)
 -"- *spadicearia* Schiff. (S)
 -"- *ferrugata* Cl. und f. *unidentaria* Hw. (WG)(M)(S)
 -"- *aptata* Hbn. und f. *suplata* Frr. (G)(M)(N)
 -"- *olivata* Schiff. (M)(G)
 -"- *turbata* Hbn. (W)
 -"- *aqueata* Hbn. (D)(G)
 -"- *salicata* Hbn. und f. *podevinata* H.S. (D)(W)(G)(S)
 hierzu ein leider etwas gefl. ♂ mit fast weißer
 Grundfarbe u. geschlossen verdunkeltem Mittelfeld
 der Vorderflügel u. verdunkeltem Basalteil der Hinterflügel, letztere auch mit dunkler Subterminale.
 -"- *nobiliaria* H.S. und f. *flavata* Osth. (W) (W)
 -"- *verberata* Sc. (G)(D)(N)(R)
 -"- *tophaceata* Schiff. (D)(G)
 -"- *nebulata* Tr. (W)(G)
 -"- *achromaria* Lah. (D)(W)
 -"- *obsoletaria* H.S. (*alpicolaria* H.S.) (D)
 -"- *berberata* Schiff. (S)(M)
 -"- *ocellata* L. (S)(M)(G)

- Cidaria scripturata* Hbn. (R)(N)
 -"- *bilineata* L. f. *infusata* Gmppbg. (S)
 -"- *galiata* Schiff. (D)(G)
 -"- *alternata* Müll. (*sociata* Bkh.) (F)(S)(M)
 -"- *alchemillata* L. (WG)(M)
 -"- *minorata* Tr. (D)(W)
 -"- *blandiata* Schiff. (*adaequata* Bkh.) (R)(M)(S)
 -"- *albulata* Schiff. (M) und Aberr.
 -"- *furcata* Thbg. (G)
Pelurga comitata L. (S)
Phibalapteryx vitalbata Schiff. (S)
Eupithecia plumbeolata Hw. (M)
 -"- *linariata* F. (G)
 -"- *tresignaria* H.S. (S)
 -"- *tripunctaria* H.S. (*albipunctata* Hw.)(S)
 -"- *callunae* Spr. (E)
 -"- *icterata* Vill. und f. *oxydata* Tr. (M)(G)
 -"- *semigraphata* Brd. (M)
 -"- *pimpinellata* Hbn. (M)
Ellopia prasinaria Schiff. (G) (N-Feuchtau)
Campaea margaritata L. (M)
Selenia tetralunaria aestiva Stgr. (S)(M)
Crocallis elinguaris L. (G)(M)
Ourapteryx sambucaria L. (M)
Epione repandaria Hfn. (*apiciaria* Schiff.)(S)
Boarmia repandata L. (S)(G)
 -"- *maculata bastelbergeri* Hschke. (S)
Gnophos glaucinarius Hbn. und f. *falconarius* Frr. (G)
 -"- *dilucidaria* Schiff. mit vielen Formen (G)(M)
 -"- *myrtillatus obfuscarius* Bhn. " " " (D)(W)(G)
 -"- *operarius* Hbn. (W). Die ♂♂ kommen gegen 3 Uhr zum Licht, sie flogen aber auch seitwärts statt zur Lampe, zu einem im Gras sitzenden ♀♀, das sofort kopuliert wurde.
Psodos alpinata Sc. (W)
 -"- *coracina* Esp. (W)
 -"- *quadrifaria* Sulz. (G)(W)
Ematurga atomaria f. *trans. astartia* Fchs. (E)
Chiasma clathrata L. Radinger Moor-WG., (R)(M), z.T. stärker verdunkelt, ein fast schwarzes Weibchen verfehlte ich nächst dem Bahnhof WG.

Zum Abschluß eine Serie *Cidaria caesiata* mit verschiedenen, verdunkelten Formen (D)(W)(G)(N).

=====

Eigentümer, Verleger und verantwortlich für den Inhalt: Helmut Hamann, Linz/Donau, Baumbachstrasse 15. Osterr.-Herausgegeben im Verein mit den Naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaften am Oberösterreichischen Landesmuseum in Linz.- (Vervielfält. im Hausdruck) Zuschriften sind zu richten an das O.Ö. Landesmuseum, Linz, Museumstr., oder an die Adresse des Schriftleiters. Erscheinen der Nachrichten fallweise. / Preis des Einzelheftes je nach Umfang u. Selbstkosten S2.- bis S4.-, zahlbar grundsätzlich nach Übernahme des Heftes. / Preis dieses Heftes S 4.- / Postscheckkonto Nr. 37.621 Helmut Hamann, Linz. / Die Autoren erhalten nach Vorausbestellung Sonderabzüge, gegen Ersatz der geringen Selbstkosten. Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Mitteilungen aus Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 1949

Band/Volume: [SH01](#)

Autor(en)/Author(s): Reisser Hans

Artikel/Article: [Eine Sommerausbeute aus Windischgarsten. \(Lepidoptera\) Liste der aufgefundenen Arten 38-40](#)