©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

Zur Verbreitung und Systematik der Erebien

Werner Vogler

Unter den dunklen Erebien der Paläarktis sind nicht nur die asiatischen Arten begehrt, sondern auch aus dem europäischen Raum kennen wir eine ganze Reihe von Tieren, die sich jeder gern seiner Sammlung einverleiben möchte, weil sie außerordentlich selten sind.
Noch nicht alle Erebien sind voll erforscht, es gibt in dieser ungemein schwierigen Gruppe viele ungelöste Probleme, beispielsweise in der Biologie und in der Unterteilung der Subspezies.
Allein in den vergangenen fünfzehn Jahren erfolgte die Veröffentlichung von zahlreichen neuen Subspezies. Hier einige Beispiele:

1. Erebia ligea ssp. suederlandica Arnscheid und Roos (Dortmunder Beitr. zur Landeskunde, 1976, 10:23-26, Abb. 1)
Typenfundort: Westfalen, Rothaargebirge, Röspetal (Holotypus und Allotypus). - Paratypen: Laasphe/Sauerland, Arnsberger Wald, Sassmannshausen, Dornbruch und Lützeln bei Olpe, Wiebelhäuser Tal bei Siegen, Röspetal.

2. Erebia niphonica ssp. nyukasana Murayama (Z. Wiener E. Ges., 1963, 5:102-105, Abb. 5,6,11,12)
Typenfundort: Mitteljapan, Berg Nyukasayama.

3. Erebia neoridas ssp. ina Arnscheid und Roos (Nachri.blatt Bayer. Ent., 1977, 6:110-119, Abb. 6)
Typenfundort: Südfrankreich, Montagne de Lure /Basses Alpes, St. Etienne.

Glücklicherweise können wir anhand des Tagfalterbandes von Higgins die Spezies von Europa mühelos aneinanderreihen. Da die Reihenfolge im Seitz-Werk überholt ist und nicht mehr dem neusten Stand entpricht, ist bei den Erebien eine kleine Lücke zu schließen.
Es fehlt ein System, nachdem man auch die asiatischen Arten der Paläarktis der Sammlung einfügen kann.
Dieses System haben die Erebien - Spezialisten Herr Arnscheid und Herr Roos, beide aus Bochum, entworfen,

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

das auf der natürlichen Verwandtschaft der Arten aufbaut. Sie sind damit einverstanden, es an dieser Stelle zu veröffentlichen. Ich selbst habe die Verbreitung ein wenig ergänzt.
Die Zahl der berücksichtigten Spezies beläuft sich auf 80.

Die hübsche "Erebia phegea Bkh.", die nur unzureichend systematisiert war, wird von Herrn Arnscheid und Roos im Gegensatz zu früher, wo das Tier am Ende der Gattung E r e b i a zu finden war, davor gestellt und erhält den Gattungsnamen Proterebia Roos und Arnscheid in litt.
Dieser Name wird noch veröffentlicht, er ist hinter Callerebia und vor Erebia einzuordnen.

Proterebia Roos und Arnscheid in litt.

1. P. phegea Bkh. (Genotypus = Typus der Gattung)
2. P. dalmata God. Vielleicht eigene Art (afer ssp. dalmata God.)

E r e b i a D a l m a n

1. E. ligea L. (Genotypus) Europa, Asien bis Kamtschatka, Japan
2. E. euryale Esp. Spanien, Frankreich, Deutschland , Balkan bis Ural, Altai.
3. E. jenisseiensis Trybom. Zentral - und NO - Sibirien,Altai, Sajan, Mongolei
4. E. aethiops Esp. Westeuropa durch Asien bis Sajan
5. E. niphonica Jans. Japan, Kurilen, Sachalin
6. E. melusina H.S. (aethiops ssp. melusina H.S.) Türkei, Armenien, Kurdistan
7. E. melancholica H.S. Kaukasus, Armenien, Altai
8. E. neoridas Bsd. Frankreich, Italien, Spanien
9. E. neriene Boeber (sedakovii Ev.) Sibirien, Sajan, Kentei, Altai, Kuntun, Sachalin, Mongolei, Kamtschatka
10. E. alcmena Gr.-Gr. Westchina, Minschan, Kansu, Kuku-Nor, Richthofengebirge
11. E. zapateri Ob. Spanien
12. E. manto Schiff. Alpen, Vogesen, Frankreich, Karpaten, Tatra
13. E. pharte Hb. Alpen, Vogesen, Tatra
14. E. eriphyle Frr. Alpen
15. E. melampus Füssl. Alpen
16. E. kefersteini Ev. Sibirien, Sajan, Altai, Khamardaban
17. E. kindermanni Stgr. Altai

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

18. E. claudina Bkh. (arete F.) Österreich
19. E. sudetica Stgr. Schweiz, Sudeten, Tatra, Rumänien
20. E. epiphron Knoch.Gebirge Europas ohne Skandinavien und Finnland
21. E. flavafasciata Heyne. Schweiz
22. E. christi Rätz. Schweiz
23. E. serotina Desc. und De Lesse. Pyrenäen
24. E. orientalis Elwes (epiphron ssp. orientalis Elwes). Bulgarien, eigene Art

E. gorge - Gruppe

25. E. gorge Hb. Alpen, Spanien, Tatra, Albanien, Bulgarien, Italien
26. E. aethiopella Hffmgg. (gorgophone Bellier). Alpen, Mazedonien, Bulgarien
27. E. gorgone Bsd. Pyrenäen
28. E. mnestra Hb. Alpen, Tatra

E. styx - Gruppe

29. E. styx Frr. (reichlini H.S.). Alpen
30. E. stirius God. (nerine Frr.). Alpen
31. E. montanus Prun. (goante Esp.). Alpen, Italien, Tatra
32. E. pronoe Esp. Pyrenäen, Alpen, Tatra, Mazedonien, Karpaten, Bulgarien
33. E. scipio Bsd. Alpen

E. meolans - Gruppe

34. E. meolans Prun. (stygne O.). Thüringer Wald, Alpen, Italien, Spanien, Sudeten, Karpaten, Frankreich
35. E. triaria Prun. (evias God.). Italien, Portugal, Spanien, Frankreich, Alpen, Jugoslawien, Albanien
36. E. palarica Chapm. Spanien
37. E. rossi Curtis. Ural, Sibirien bis Altai, Sajan
38. E. fletcheri Elwes (dabanensis ssp. fletcheri Elwes). Sajan, Altai, Irkutsk

E. tyndarus - Gruppe

39. E. cassioides R. und Hohenw. (neleus Frr.). Spanien bis Balkan
40. E. tyndarus Esp. Alpen
41. E. nivalis Lork. und De Lesse. Alpen
42. E. calcaria Lork. Alpen
43. E. hispania Btlr. Spanien
44. E. ottomana H.S. West-und Südeuropa, Türkei

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

45. E. graucasica Jach. (tyndarus ssp. graucasica Jach.). Gute Art, Kaukasus
46. E. dromulus Stgr. (tyndarus ssp. dromulus Stgr.). Gute Art, Ostküste des Schwarzen Meeres, Türkei, Iran, Armenien, Kaukasus
47. E. callias Edw. Kaukasus, Iran, Altai, Sajan
48. E. iranica Gr.-Gr. Iran

E. medusa - Gruppe

49. E. medusa Schiff. Europa, Türkei, Asien bis Amur
50. E. polaris Stgr. Lappland, Nordasien bis zur Lena
51. E. uralensis Stgr. (medusa ssp. uralensis Stgr.). Ural, Kirgisensteppe, Sibirien
52. E. epipsodea Btlr. (medusa ssp.epipsodea Btlr.). Eigene Art, Sibirien
53. E. oeme Hb. Europa
54. E. alberganus Prun. (ceto Hb.). Alpen, Italien, Bulgarien
55. E. maurisius Esp, (sajana Goltz, hilaris Goltz). Altai, Sajan, Tarbagatai
56. E. theano Tausch (maurisius ssp. theano Tausch). Altai, Tannuolagebirge
57. E. kozhantshikovi Shelj. Sibirien, polares Uralgebiet
58. E. dabanensis Ersch. Ostsibirien, Sajan, Tunkun, polares Uralgebiet
59. E. hewitsonii Led. Kaukasus, Armenien, Iran

E. pluto - Gruppe

60. E. pluto Prun. Alpen, Abruzzen
61. E. lefebvrei Bsd. Spanien
62. E. melas Herbst. SO-Europa

E. embla - Gruppe

63. E. embla Thnbg. Skandinavien, Finnland, Sowjetunion, Sibirien bis Altai, Sajan, Kamtschatka
64. E. disa Thnbg. Arktisches Nordeuropa, Sibirien, Sajan, Mongolei
65. E. cyclopius Ev. Ural, Altai, Sajan, Kentèi, Amur, Askold

E. wanga - Gruppe

66. E. wanga Brem. (tristis Brem.). Amur

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

E. magdalena - Gruppe

(E. magdalena Strecker, Nordamerika)

67. E. errinnyn Warren (erinna Stgr.). Ost - Sajan

68. E. fasciata Btlr. Polares Uralgebiet, nörd. Sibirien, Ostsibirien

E. edda - Gruppe

69. E. edda Men. (intermedia Trybom). Ural, Altai, Jenissei, Amur

70. E. turanica Ersch. Pamir, Tadschikistan, Tian-Shan

71. E. meta Stgr. Turkestan, Pamir, Tian-Shan, Aksu

72. E. ocnus Ev. Alatau, Tian-Shan

73. E. sibo Alph. Tian-Shan, Pamir

74. E. radians Stgr. (progne G.). Turkestan, Transalai, Juldus

75. E. discoidalis Kirby (lena Christ.). Polares Uralgebiet, Jenissei, Sajan, Mittelsibirien bis Amur

76. E. kalmuka Alph. Tian-Shan, Kuldscha

E. atramentaria - Gruppe

77. E. atramentaria B.-H. China

E. pandrose - Gruppe

78. E. pandrose Bkh. (lappona Thnbg.). Skandinavien, Finnland, von den Pyrenäen bis Mittelasien

79. E. sthennyo Graslin . Pyrenäen

E. epistygne - Gruppe

80. E. epistygne Bkh. SW - Europa

Werner Vogler, Eichendorffstr. 15, 6367 Karben - Petterweil

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo

Jahr/Year: 1979

Band/Volume: AF_4

Autor(en)/Author(s): Vogler Werner

Artikel/Article: Zur Verbreitung und Systematik der Erebien 1-5