

# NACHRICHTENBLATT

der Bayerischen Entomologen

Herausgegeben von der Münchner Entomologischen Gesellschaft

Schriftleitung: Dr. Walter Forster, München 38, Menzinger Straße 67

Postscheckkonto der Münchner Entomolog. Gesellschaft: München Nr. 31 569

Verlag: J. Pfeiffer, München

3. Jahrgang

15. August 1954

Nr. 8

## Neue und interessante Koleopterenfunde aus Südbayern

Von Konrad Witzgall

Fortsetzung von Heft 7, 1954 und Schluß.

**Myrmetes piceus** Payk. Aus einem mit *Formica rufa* bewohnten Ameisenhaufen im März 1951 bei Dachau in Anzahl gesiebt.

**Aphodius corvinus** Er. 1 Stück dieser bei uns sehr seltenen Art in einem Walde bei Dachau am 1. 5. 1951.

**Nemosoma elongatum** L. An dem Fenster einer alten Holzhütte in Dachau 1 Ex. im Juni 1950.

**Combocerus glaber** Schall. 1 Stück im Schleißheimer Birket an einem Waldweg im Mai 1949 und 1 Stück im Forstenrieder Park am Eichenplatz vom Grase gestreift Ende Mai 1952.

**Mycethophagus populi** Fabr. Mehrere Stücke dieses seltenen Tieres aus einem anbrüchigen Ahornbaum bei Dachau Ende Mai 1950.

**Selatosomus cruciatus** L. Dieses Tier wurde meines Wissens erst wenige Male bei uns gefunden. Im Mai 1953 einige Ex. bei Dachau aus Eichenlaub gesiebt.

**Sericus subaeneus** Redtenb. Am rechten Isarufer bei Grünwald 1 Ex. am 1. 5. 1950 unter Flußgenist.

**Athous mutilatus** Rosenh. Im Korbiniani-Holz bei Schleißheim am 17. 6. 1951 und im Forstenrieder Park am 3. 7. 1951 je 1 Ex. geklopft.

**Elatер elongatulus** Fbr. 1 Ex. vom Forstenrieder Park am 26. 5. 1953 von Eichen geklopft.

**Elatер elegantulus** Schönh. 1 Stück aus Eichenmulm im Haimhauser Schloßpark am 2. 6. 1953 gesiebt.

**Orthopleura sanguinicollis** Fabr. 1 Stück an einer anbrüchigen Eiche im Forstenrieder Park am 7. 6. 1953.

**Hedobia imperialis** L. 3 Stück von einer alten Hainbuche in der Echingen-Lohe geklopft am 5. 6. 1951.

**Serropalpus barbatus** Schall. 1 Stück an einer alten Holzhütte in Dachau im Juli 1950.

**Metococcus paradoxus** L. Im Juli 1950 1 Stück in einem Wasserbassin in einem Garten bei Dachau fast leblos.

**Meloe variegatus** Donov. In Lauterbach bei Dachau im Jahre 1937 auf einem Feldweg laufend. (Genaueres Funddatum kann nicht angegeben werden, da das Tier aus meiner Jugendsammlung ist; Fundort stimmt!)

DIV. INS.  
U. S. NATL. MUS.



**Harpium sycophanta** ab. **latefasciatum** E. Müll. Diese sehr seltene Aberration wurde in der Umgebung Münchens meines Wissens noch nie gefangen. 1 Stück am 15. 6. 1952 in der Echinger Lohe an einer Eiche laufend.

**Evodinus interrogationis** L. 3 Stück am Funtensee bei Berchtesgaden Ende Juli 1952.

**Cortodera femorata** F. 1 Stück dieser bei uns seltenen Art bei Dachau von Eichen geklopft am 20. 6. 1953.

**Strangalia aethiops** ab. **Beckeri** Gerh. 1 Ex. dieser sehr seltenen Aberration in der Echinger Lohe am 1. 6. 1952 von Eichen geklopft.

**Necydalis major** L. Nachdem die alten Fundplätze in der Umgebung Münchens vernichtet wurden, ist dieses Tier bei uns recht selten geworden. 2 Ex. in der Echinger Lohe an anbrüchigen Hainbuchen erbeutet im Juli 1952 und 1953.

**Molorchus umbellatarum** Schreiber. Mehrere Stücke in einem Garten in Dachau auf *Aruncus silvester* Kost sitzend gefangen im Juni 1950 und 1951. Seitdem nie wieder ein Stück!

**Clorophorus Herbsti** Brahm. Seit vielen Jahren nicht mehr gefangen! 1 Stück an einer anbrüchigen Hainbuche (!) am 4. 6. 1953 in der Echinger Lohe. Weit und breit befand sich keine Linde.

**Pligionotus detritus** L. 8 Stück im Korbiniani-Holz in Schleißheim anfangs Juni 1953 an geschlagenen Eichen. Seit vielen Jahren bei uns recht selten.

**Chrysochloa melanocephala** Duft. Am Funtensee bei Berchtesgaden 2 Stück unter Steinen gefunden Ende Juli 1952. Die Herren Wichmann und Freude fingen im gleichen Gebiet im August 1952 ebenfalls je 2 Exemplare.

**Entomoseelis adonidis** Pall. In der Umgebung Münchens äußerst selten. 1 Stück bei Dachau am Rande eines Rapsfeldes auf einer Rapsblüte sitzend anfangs September 1950. Seitdem nie wieder ein Tier!

**Phytodecta Kaufmanni** Mill. In der Benediktenwand Anfang Juni 1951 1 Stück auf einer Weide.

**Otiorrhynchus foraminosus** Boh. und **costipennis** Rosenh. 3 Ex. am Funtensee bei Berchtesgaden Ende 1952 unter Steinen.

**Phythonomus contaminatus** Hrbst. 1 Ex. am 3. 10. 1952 unter Moos bei Dachau.

**Lytodaetilus velatus** Beek. In sehr großer Anzahl im Herbst 1949 und Frühjahr 1950 an der Amper bei Dachau. Seit der Erbauung des Dachauer Amperflußkraftwerkes kein Stück wieder.

Anschrift des Verfassers: Dachau, Moorbadstraße.

---

## Larentia clavaria Haw. (*Ortholitha cervinata* Schiff.) in Nordbayern (Lep. Geom.)

Von Heinrich Bauer

*Larentia clavaria* Haw. ist eine faunistisch und ökologisch bemerkenswerte Geometridenart Europas. Ihr Verbreitungszentrum haben wir in Vorderasien und dem Mediterrangebiet zu suchen. Von hier aus hat sie sich, großräumig gesehen, weit über Mitteleuropa verbreitet.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1954

Band/Volume: [003](#)

Autor(en)/Author(s): Witzgall Konrad

Artikel/Article: [Neue und interessante Koleopterenfunde aus Südbayern - Fortsetzung 73-74](#)