Genitalsegment des ♂ (Fig. 28) kurz und sehr stark nach links gerichtet. Linker Paramer (Fig. 29—32) kürzer und kleiner als bei der Nominatrasse, dicht mit feinen, kurzen Härchen bedeckt, an der Innenseite ohne Falten.

Länge: ♂ = 3,1—3,15 mm, ♀ = 2,7—3,1 mm. Länge der Fühlerglieder: 1 = 0,15, 2 = 0,37—0,39, 3 = 0,23—0,24, 4 = 0,28—0,30 mm.

Bei *A. minki minki* Dhren. ist die Gestalt breiter, die Färbung in der Regel dunkler, die helle Behaarung der Oberseite kürzer und mehr anliegend, das 4. Fühlerglied nur 1,1 bis 1,2× so lang wie das 3., die Fühler kräftiger (Fig. 26 u. 27), das Pronotum nach hinten stärker verbreitert und verhältnismäßig kürzer. Das Genitalsegment des ♂ (Fig. 28) ist größer, ebenfalls der linke Paramer (Fig. 29—32), der überdies höchstens 2 bis 3 Haare trägt und dessen Innenseite stets eine Anzahl deutlicher Falten aufweist. Es ist nicht ausgeschlossen, daß *A. minki pistaciae* nov. subsp. eine selbständige Art darstellt.

Ich untersuchte 3 ♂♂ und 6 ♀♀ aus Iran: Teheran: Shah Rai 10. 5. 55 an *Hordeum sativum* 1 ♂, 1 ♀, 3 juv.; Karadj 18. 10. 55 aus Gallen von *Forda hirsuta* an *Pistacia vera* 1 ♂, 3 ♀♀; Kerman: Kuh-e-Sor 9. 55 an *Pistacia khinjukh* aus Hahnenkammgalle 2 ♀♀; Taftan 2700 m 4. 6. 55 1 ♂, sämtlich G. Remaudière leg.

Holotypus (Taftan) und Allotypoid (Karadj) in meiner Sammlung. Paratypoid ebenda und in der Sammlung des Museum National d'Histoire Naturelle in Paris.

Für die liebenswürdige Unterstützung bei dieser Arbeit bin ich den Herren Prof. H. Lindberg, Helsingfors, Prof. A. Kästner, München, Dr. W. J. Le Quesne, Millbury, Dr. V. Zebe, Seibersbach, H. Wiechmann, München und H. Weber, Nörtorf, zu großem Dank verpflichtet.

Das Material zu den beiden letzten Arten verdanke ich Herrn Dr. J. Carayon vom Museum National d'Histoire Naturelle in Paris. Ihm sei auch an dieser Stelle noch einmal bestens gedankt.

Schriften-Nachweis

- Dohrn, A. 1860 — Hemipterologische Miscellaneen — Stett. Ent. Zeit. XXI: 162
Le Quesne, W. J. 1954 — Studies in the British species of *Anthocoris* Fallén —
The Ent. M. Mag. XC: 36—40
Reuter, O. M. 1885 — Monographia Anthocoridarum orbis terrestris — Act.
Soc. Sci. Fenn. XIV: 555—758

Anschrift des Verfassers:

Eduard Wagner, Hamburg-Lgh. 1. Moorreye 103.

Aus der Münchner Entomologischen Gesellschaft

Sitzung am 28. Oktober 1957, Vorsitz: Prof. Dr. h. c. Fritz Skell.

Anwesend: 34 Mitglieder, 3 Gäste

Die Sitzung diente dem zwanglosen Gedankenaustausch unter den Mitgliedern. ferner wurde das Programm für die nächsten Monate besprochen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1957

Band/Volume: [006](#)

Autor(en)/Author(s): Anonym

Artikel/Article: [Aus der Münchner Entomologischen Gesellschaft 112](#)