

Der letzte bemerkenswerte Fang gelang am 6. 9. 58 am Köder: es ist ein frisches ♀ von *Dianth. (Polia) proxima* Hbn. Nach Osthelder ist der Falter in den bayerischen Alpen noch nicht festgestellt worden: ich habe bereits am 25. 8. 28 ein ♀ und am 1. 9. 54 wieder ein ♀ am Licht am Haus gefangen. was ich wohl damals Herrn Osthelder, der meine Fänge in seinem Werk vermerkt hat, vergessen habe zu berichten.

Nach dem 2. Beitrag zur Fauna Südbayerns von J. Wolfsberger wurde der Falter später vom Jahre 1949 ab bisher nur im östlichen Teil der bayer. Alpen sowie im Salzburger Gebiet und hauptsächlich in Höhen von 1200 — 1600 m nachgewiesen. während mein Fundort in einer Höhe von nur 600 m liegt! Das stimmt mit meinen früheren Beobachtungen überein, daß im Kochelseegebiet manche Falter, die ihren Standort normal in Höhen über 1000 — 1200 m haben. auch bei günstigen Wetter- und Windverhältnissen bis zur Talsohle kommen.

Endlich möchte ich den für den Herbst hier nicht ganz ungewöhnlichen Anflug am Köder von 2 ♂♂ und 1 ♀ von *Leuc. vitellina* Hbn. am 20. 9. 58 und von 1 ♂ am 26. 9. 58 erwähnen: die ersten 3 Falter sind so frisch, daß ich zu der Ansicht neige, daß sie von im Frühjahr hier zugeflogenen ♀♀ stammen und die ersten Stände sich bei uns entwickelt haben!

Das Gleiche nehme ich bei einem frischen ♀ von *Col. croceus f. helice* Hbn. an, das ich am 24. 10. 58 auf einer Waldblöße nahe dem Haus fing.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Ing. Hans Wagner, Kochel, Mittenwalder Straße 75

## Die Käfer des Risserkogelgebietes

Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns

Von Gerhard Scherer

(Fortsetzung)

*Haptoderus unctulatus* Dft.: 30. 7. 1954, 18. 8. 1954, 24. 8. 1954, 23. 10. 1954, 13. 10. 1955, 15. 10. 1955 in der Streu- und Bodenschicht des Erlengehölzes am Ableitenschneidnordhang ca. 1550 m, 3. 8. 1954 ebenda geködert; 25. 6. 1954 Plankensteinsee ca. 1500 m unter Steinen; 1. 7. 1954 nördlich des Rößensteinersees ca. 1480 m aus einer faulen Fichte gesiebt. Im Erlengehölz sehr häufig.

*Abax ater* Villa: 6. 6. 1954 Uferwiese Rößensteinersee ca. 1460 m unter Steinen. 9. 6. 1954 ebenda geködert; 4. 6. 1954, 6. 6. 1954, 10. 6. 1954, 1. 7. 1954 Ableitenalm ca. 1650 m unter Steinen. 28. 7. 1954 ebenda geködert; 1. 7. 1954 Rößenstein ca. 1650 m unter Steinen, 12. 5. 1954 ebenda geködert; 25. 6. 1954, 26. 6. 1954 Plankensteinsee ca. 1500 m unter Steinen; 23. 6. 1954, 28. 7. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1650 m geködert. 14. 10. 1955 ebenda in der Streu- und Bodenschicht; 24. 6. 1954 Grubereck ca. 1600 m; 2. 8. 1954, 12. 9. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert; 5. 6. 1955, 10. 7. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1550 m unter Steinen. Sehr häufig.

*Abax parallelus* Dft.: 18. 9. 1953 Uferwiese Rößensteinersee ca. 1460 m unter einem Stein. Selten.

*Abax ovalis* Dft.: 10. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1650 m unter Steinen; 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1700 m unter Steinen. Nicht selten.

*Calathus micropterus* Dft.: 30. 7. 1954, 22. 10. 1954, 21. 9. 1955, 17. 10. 1955 in der Streu- und Bodenschicht des Ableitenschneidnordhanges ca. 1550 m; 26. 6. 1954 Plankensteineseer ca. 1500 m unter Steinen; 23. 6. 1954, 28. 7. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert, 8. 6. 1954 ebenda unter Steinen; 2. 8. 1954 in der Streu- und Bodenschicht des Plankensteinsüdosthanges ca. 1650 m; 16. 9. 1953 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m geködert. Häufig.

*Agonum Mülleri* Hbst.: 9. 5. 1955 Freisinger Hütte ca. 1520 m unter Steinen; 5. 6. 1955 Uferwiese Plankensteineseer unter Steinen ca. 1470 m; 12. 7. 1955 Röthensteinersee im Gemülle nach Hochwasser ca. 1460 m. Nicht selten.

#### Fam. **Dytiscidae**

*Bidessus geminus* F.: 10. 6. 1954 aus dem Plankensteineseer ca. 1464 m zwischen Eisschollen. Selten.

*Hydroporus palustris* L.: August 1953, 4. 9. 1953, 4. 6. 1954, 9. 6. 1954, 4. 6. 1955, 25. 7. 1955 Röthensteinersee ca. 1459 m; 10. 6. 1954, 5. 6. 1955, 24. 8. 1955 Plankensteineseer ca. 1464 m. Sehr häufig.

*Hydroporus foveolatus* Schaum: August 1953, 4. 9. 1953, 4. 6. 1955, 25. 7. 1955 Röthensteinersee ca. 1459 m; 10. 6. 1954, 5. 6. 1955 Plankensteineseer ca. 1464 m. Sehr häufig.

#### Fam. **Catopidae**<sup>1)</sup>

*Ptomaphagus variicornis* Rosh. (*ruthenus* Rtt.): 20. 9. und 22. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert.

*Choleva nivalis* Kr. (*Breiti* Jeann.): 12. 6. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m aus der Streu- und Bodenschicht, 12. 10. 1955 ebenda geködert. Neu für Bayern!

*Sciodrepoides Watsoni* Spence: 11. 7. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m geködert; 12. 7. 1955, 13. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m an Aas; 26. 8. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m an Aas.

*Catops subfuscus* Kelln. (*alpinus* auct., *sinuatipes* Krog.): 16. 9. 1953, 6. 10. 1953, 25. 6. 1954, 22. 9. 1955, 12. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m an Aas; 13. 5. 1954 Röthenstein ca. 1600 m geködert; 1. 7. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m an Aas; 4. 7. 1955, 12. 7. 1955, 13. 7. 1955, 19. 8. 1955, 26. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert; 21. 8. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m geködert. Häufig.

*Agabus guttatus* Payk.: 4. 6. 1954 Röthensteinersee ca. 1459 m. Selten.

*Agabus Solieri* Aubé: August 1953, 4. 9. 1953, 4. 6. 1955 Röthensteinersee ca. 1459 m. Häufig.

*Agabus congener* Thunb.: 24. 8. 1955 Plankensteineseer ca. 1464 m überaus zahlreich.

#### Fam. **Hydrophilidae**

*Hydraena gracilis* Germ.: 4. 9. 1953 Röthensteinersee ca. 1459 m sehr selten.

*Helophorus nivalis* Gir.: 10. 6. 1954 und 5. 6. 1955 Plankensteineseer ca. 1464 m; 4. 6. 1955 und 12. 7. 1955 Röthensteinersee ca. 1459 m. Nicht selten.

*Sphaeridium bipustulatum* F.: 30. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m in Rinderkot.

<sup>1)</sup> det. K. Sokolowski.

*Sphaeridium scarabacoides* L.: 25. 6. 1954, 30. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m in Rinderkot; 27. 7. 1954 Röthenstein ca. 1580 m in Rinderkot.

*Cereyon impressus* Strm.: 8. 6. 1954 und 30. 6. 1954 Ableitenalm Grasschicht ca. 1660 m, 30. 6. 1954 ebenda in Rinderkot; 11. 6. 1954, 23. 6. 1954, 25. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert, 4. 8. 1954 ebenda in der Streu- und Bodenschicht; 1. 7. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m in Gamslosung; 27. 7. 1954 und 28. 7. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in Rinderkot; 11. 9. 1954 in der Streu- und Bodenschicht des Erlengehölzes am Ableitenschneidnordhang ca. 1580 m; 22. 9. 1955 in der Streu- und Bodenschicht des Bergwaldes am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m; 30. 6. 1954 Setzbergsüdseite in Hirschlosung, ca. 1570 m. Im Gebiete die häufigste Art der Gattung.

*Cereyon melanocephalus* L.: 12. 5. 1954 Röthensteinersee auf Schnee ca. 1460 m; 30. 6. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1570 m in Hirschlosung; 21. 8. 1955 Ableitenalm ca. 1680 m von der Wiese gekätschert.

*Cereyon lateralis* Marsh.: 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift. Selten.

*Cereyon pygmaeus* Ill.: 21. 8. 1955 Ableitenalm ca. 1680 m von der Wiese gekätschert.

*Cereyon unipunctatus* L.: 6. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m.

*Cereyon analis* Payk. (*flavipes* Thunb.): 30. 6. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1570 m in Hirschlosung; 28. 7. 1954 im Erlengehölz des Ableitenschneidnordhanges in der Streu- und Bodenschicht ca. 1500 m.

*Megasternum boletophagum* Marsh.: 9. 5. 1955 Plankensteinsüdosthang in der Streu- und Bodenschicht ca. 1680 m; 9. 5. 1955 Freisinger-Hütte ca. 1520 m unter einem Stein; 12. 7. 1955 im Angeschwemmten des Röthensteinersees ca. 1460 m; 26. 8. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzbergs ca. 1400 m; 20. 9. 1955 Ableitenalm ca. 1680 m.

### Fam. Silphidae

*Necrophorus vespilloides* Hbst.: 9. 6. 1954, 11. 6. 1954, 23. 6. 1954, 24. 6. 1954, 26. 6. 1954, 28. 7. 1954, 12. 7. 1955, 26. 8. 1955, 20. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1670 m an Aas; 10. 6. 1954, 23. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m an Aas; 1. 8. 1954 Röthensteinalm ca. 1400 m an Aas; 22. 8. 1955, 26. 8. 1955, 22. 9. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m an Aas; Sept. 1955 Setzbergsüdseite ca. 1600 m an Aas. Sehr häufig.

*Thanatophilus rugosus* L.: 12. 5. 1954, 13. 5. 1954, 4. 6. 1954, 9. 6. 1954, 11. 6. 1954, 26. 6. 1954, 28. 7. 1954, 23. 6. 1955, 26. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1670 m an Aas; 4. 6. 1954, 10. 6. 1954, 23. 6. 1954, 26. 8. 1955, 22. 8. 1955, 22. 9. 1955, 12. 10. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m an Aas; 12. 5. 1954, 13. 5. 1954 Röthenstein ca. 1580 m. Überaus häufig.

*Oecoptoma thoracicum* L.: 4. 6. 1954, 9. 6. 1954, 11. 6. 1954, 23. 6. 1954, 26. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1670 m an Aas; 10. 6. 1954, 23. 6. 1954, 26. 8. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m an Aas; 23. 6. 1954 Röthenstein ca. 1580 m an Aas; 16. 6. 1955, 5. 7. 1955 im Erlengehölz des Ableitenschneidnordhanges ca. 1550 m mit Aas geködert.

*Silpha tyrolensis* Laich.: 8. 6. 1954, 6. 6. 1954, 10. 6. 1954, 30. 7. 1954 Ableitenalm ca. 1670 m von der Wiese gekätschert, geködert oder unter Steinen; 3. 6. 1954, 9. 6. 1954, 10. 6. 1954, 28. 6. 1954, 3. 9. 1954 Uferwiese Röthensteinersee von der Wiese gefangen oder unter Steinen; 8. 6. 1954 Erlengehölz des Ableitenschneidnordhanges ca. 1650 m unter Steinen; 9. 6. 1954, 12. 7. 1955 Röthensteinalm ca. 1400 m; 3. 6. 1954 Röthenstein ca. 1600 m; 2. 8. 1954, 4. 8. 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 m. Überaus häufig.



*Phosphuga atrata* L.: 26. 6. 1954 oberhalb des Plankensteinsee ca. 1650 m unter Steinen; 23. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert; 5. 6. 1955 Nordhang der Ableitenschneid ca. 1570 m unter Steinen.

Röthensteinersee ca. 1460 m geködert; 13. 5. 1954, 14. 5. 1954 Röthenstein ca. 1600 m geködert; 11. 6. 1954, 23. 6. 1954, 24. 6. 1954, 28. 7. 1954, 5. 7. 1955, 12. 7. 1955, 13. 7. 1955, 26. 8. 1955, 19. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert; 24. 6. 1954, 15. 6. 1955, 19. 8. 1955, 26. 8. 1955, 22. 9. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert; 21. 8. 1955, 22. 8. 1955, 26. 8. 1955, 16. 9. 1955, 19. 9. 1955, 14. 10. 1955 im Bergwald am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m geködert. Überaus häufig.

*Catops nigrita* Er.: 10. 6. 1954, 25. 6. 1954, 17. 9. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m geködert; 1. 7. 1954, 15. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert.

*Catops fuliginosus* Er.: 16. 9. 1953 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m geködert; 22. 9. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m geködert. Selten.

*Catops nigricans* Spence: 21. 8. 1955, 26. 8. 1955 im Bergwald am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m geködert.

#### Fam. **Colonidae**

*Colon brunneum* Latr.: 20. 8. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu- und Bodenschicht; 12. 7. 1955 in der Streu- und Bodenschicht des Bergwaldes am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m.

Fortsetzung folgt

#### Kleine Mitteilung

80. *Cabera leptographa* Wehrli wurde nicht in der Pfalz gefunden!

Im Juni 1955 fing ich im Hochstadter Wald zwischen Landau und Germersheim eine *Deilinia*-Art, die ich als *leptographa* Wehrli ansprach. Ich gab in den „Mitteilungen der Pollichia“ III. Reihe, 5. Band, p. 85, Nr. 5, den Fund als *Deilinia leptographa* Wehrli bekannt.

Der Entdecker dieser früher nur aus Asien bekannten Falterart in Deutschland, in den Havelwiesen bei Zehdenick (Mark), Herr Dr. Ernst Urbahn, Zehdenick, Poststr. 15, nahm nun freundlicher Weise eine Überprüfung meiner Bestimmung vor und untersuchte meinen Falter genitaliter. Dr. Urbahn stellte fest, daß es sich bei dem Tier nicht um einen Mann von *Cabera Treitschke* = *Deilinia Hampson leptographa* Wehrli, sondern um *Cab. pusaria* L. in der Form *irrorata* Lempke handelt.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Dr. E. Urbahn auch an dieser Stelle für seine freundliche Hilfe und die aufgewendete Mühe bestens zu danken.

Rudolf Heuser, Kaiserslautern, Mannheimer Straße 162

#### Aus der Münchner Entomologischen Gesellschaft:

Sitzung am 8. Dezember 1958. Vorsitz: Prof. Dr. h. c. F. Skell.

Anwesend: 39 Mitglieder, 9 Gäste.

Bei reger Beteiligung wurde in der seit vielen Jahren üblichen Weise die Weihnachtsverlosung von Insekten durchgeführt, zu der reiche Materialspenden eingegangen waren. Der Abend war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg.

Am 22. Dezember wurde keine offizielle Sitzung mehr abgehalten. 10 Mitglieder trafen sich zwanglos am Stammtisch.

Am 26. Januar 1959, 20 Uhr findet im „Hotel Wolff“ München, Arnulfstr. die Mitgliederversammlung statt, zu der hiemit Einladung ergeht.

Tagesordnung: 1. Jahresbericht. 2. Kassenbericht. 3. Haushalt 1959. 4. Wahl der Vorstandschaft. 5. Anträge der Mitglieder.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1959

Band/Volume: [008](#)

Autor(en)/Author(s): Scherer Gerhard

Artikel/Article: [Die Käfer des Risserkogelgebietes - Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns - Fortsetzung 5-8](#)