

Die Käfer des Risserkogelgebietes

Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns

Von Gerhard Scherer

(Fortsetzung.)

Atheta longiusecula Grav.: 3. 6. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m in der Streu- und Bodenschicht; 10. 5. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m in der Streu- und Bodenschicht.

Atheta Hansseni A. Strand: 5. 9. 1953 Röthenstein ca. 1550 m in Pilzen; 12. 6. 1955, 5. 5. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1570 m geködert; 15. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert.

Atheta atramentaria Gyll.: 3. 6. 1954, 10. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m geködert, 12. 7. 1955 ebenda in Angeschwemmen; 4. 6. 1954, 8. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1650 m geködert, 30. 6. 1954 ebenda von der Wiese gestreift; 11. 6. 1954, 23. 6. 1954, 4. 7. 1955, 12. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert, 4. 8. 1954 ebenda in der Streu- und Bodenschicht und 11. 7. 1955 ebenda von der Wiese gestreift; 16. 6. 1955, 5. 7. 1955, 11. 7. 1955 östlicher Teil des Ableitenschneidnordhanges ca. 1570 m geködert. Sehr häufig.

Atheta Reissi G. Ben.: 30. 6. 1954 ca. 1570 m und 20. 10. 1954 ca. 1660 m Setzbergsüdseite an Hirschlosung.

Atheta allocera Epp.: 5. 9. 1953 Röthenstein ca. 1550 m in Pilzen.

Atheta cinnamoptera Thoms.: 5. 7. 1955, 11. 7. 1955, 12. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1600 m geködert.

Atheta Leonhardi Bernh.: 6. 9. 1953, 7. 9. 1953, 8. 9. 1953, 20. 8. 1954, 8. 9. 1954, 21. 10. 1954, 22. 10. 1954, 12. 10. 1955, 13. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1600 m in der Streu- und Bodenschicht, 6. 10. 1953 ebenda geködert; 4. 9. 1953 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen; 19. 8. 1954, 19. 10. 1954, 21. 10. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1600—1700 m in der Streu- und Bodenschicht, 19. 9. 1955 ebenda geködert; 20. 10. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1660 m an Hirschlosung.

Atheta laevana Muls. Rey: 20. 10. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1660 m an Hirschlosung.

Atheta setigera Shp.: 22. 10. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1540 m in der Streu- und Bodenschicht.

Atheta macrocera Thoms.: 4. 8. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m in der Streu- und Bodenschicht, 18. 8. 1955 ebenda von der Wiese gestreift.

Atheta nigra Kr.: 11. 7. 1955 östlicher Teil des Ableitenschneidnordhanges ca. 1570 m geködert.

Atheta longicornis Grav.: 10. 5. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m in der Streu- und Bodenschicht.

Atheta parvula Mannh.: 11. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert, 4. 8. 1954 ebenda in der Streu- und Bodenschicht; 22. 10. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1540 m in der Streu- und Bodenschicht, 5. 7. 1955 ebenda am östlichen Teil des Hanges ca. 1570 m geködert.

Atheta lateralis Mannh.: 12. 6. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu- und Bodenschicht.

Atheta fungi Grav.: 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

Tinotus morion Grav.: 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

Oxyptoda spectabilis Märk.: 20. 9. 1955, 22. 9. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu- und Bodenschicht.

Oxypoda umbrata Cyl.: 5. 8. 1954, 19. 8. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1660 m in der Streu- und Bodenschicht, 5. 8. 1954 ebenda von der Wiese gestreift und 20. 9. 1954 hier geködert; 9. 5. 1955 Freisinger-Hütte ca. 1520 m unter Steinen; 12. 7. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht. Häufig.

Oxypoda sericea Heer: 5. 7. 1955 östlicher Teil des Ableitenschneidnordhanges ca. 1560 m geködert; 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

Oxypoda rufa Kr.: 3. 8. 1954, 20. 8. 1954, 12. 6. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu- und Bodenschicht.

Oxypoda haemorrhoea Mannh.: 4. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1690 m in einem Nest von *Formica rufa*.

Aleochara rufitarsis Heer: 30. 3. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1700 m in der Streu- und Bodenschicht.

Aleochara hipustulata L. 10. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m geködert; 10. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1680 m geködert; 26. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift, 12. 7. 1955 ebenda geködert. Häufig.

Fam. **Psellaphidae**

Plectophloeus Fischeri Aubé: 5. 9. 1953 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen.

Fam. **Cantharidae**

Cantharis tristis F.: 25. 6. 1954, 11. 7. 1955, 12. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

Rhagonycha translucida Kryn.: 3. 8. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1540 m in der Streu- und Bodenschicht. Selten.

Rhagonycha testacea L.: 25. 6. 1954 am Fuße der Plankensteinnordwand ca. 1500 m von der Wiese gestreift; 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gekätschert; 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift; 11. 7. 1955 am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m von der Wiese gestreift.

Rhagonycha femoralis Br.: 2. 8. 1954, 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1670 m von der Wiese gestreift; 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift; 24. 7. 1955 Grubereck ca. 1600 m.

Rhagonycha lignosa Müll.: 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift. Selten.

Pygidia denticollis Schumm.: 24. 7. 1955 Risserkogelgipfel 1826 m; 21. 8. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m von der Wiese gestreift; 26. 8. 1955 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m.

Malthodes hexacanthus Kiesw.¹⁾: 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1690 m von der Wiese gekätschert; 11. 7. 1955 am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m von der Wiese gestreift.

Fam. **Malachiidae**

Charopus flavipes Payk.: 3. 8. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift; 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gekätschert.

Malachius marginellus Oliv.: 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

Anthocomus bipunctatus Harr.: 2. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1700 m in der Streu- und Bodenschicht.

¹⁾ det. W. Wittmer

Fam. **Dasytidae**

Dasytes alpi gradus Kiesw. a. *montanus* Gdlr.: 2. 8. 1954, 5. 8. 1954, 25. 8. 1954, 7. 9. 1954, 11. 7. 1955, 12. 7. 1955, 18. 8. 1955, 19. 8. 1955, 23. 8. 1955, 19. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600—1700 m von der Wiese gestreift; 19. 9. 1955 Risserkogelgipfel ca. 1820 m.

Fam. **Elateridae**

Adelocera fasciata L.: 7. 6. 1955 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

Elater aethiops Lac.: August 1953 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

Idolus picipennis Bach: 25. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1600 m von der Wiese gestreift.

Athous vittatus F.: 2. 4. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht, 23. 6. 1954, 10. 7. 1955, 17. 8. 1955 ebenda von der Wiese gestreift; 25. 6. 1954, 26. 6. 1954, 2. 8. 1954, 6. 6. 1955, 11. 7. 1955, 12. 7. 1955, 17. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600—1700 m von der Wiese gestreift, 10. 5. 1955 ebenda aus der Streu- und Bodenschicht.

Athous haemorrhoidalis F.: 2. 4. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht; 25. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

Athous subfuscus Müll.: 25. 7. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m.

Athous Zebei Bach: 24. 6. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1550 m von Erlen geklopft, 8. 6. 1955 ebenda von Legföhren; 25. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1600 m von der Wiese gekätschert; 30. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m von der Wiese gestreift.

Corymbites pectinicornis L.: 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

Corymbites cupreus F.: 25. 6. 1954 Uferwiese Plankensteinsee ca. 1470 m; 30. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m von der Wiese gestreift; 27. 7. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m gekätschert.

Corymbites cupreus F. v. *aeruginosus* F.: 2. 4. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht, 23. 6. 1954 ebenda von der Wiese gestreift; 25. 6. 1954, 30. 6. 1954, 3. 8. 1954 Ableitenalm ca. 1670 m (sehr zahlreich) von der Wiese gekätschert; 9. 6. 1954 am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m; 24. 6. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1600 m; 24. 6. 1954 vom Grubereck zum Röthensteinersee herab ca. 1580 m; 25. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1600 m. Im Untersuchungsgebiet sehr häufig, weitaus am zahlreichsten ist die v. *aeruginosus* F.

Corymbites aeneus L.: 4. 6. 1954, 6. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1670 m unter Steinen, 8. 6. 1954 ebenda von der Wiese gestreift; 4. 6. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m unter Steinen; 26. 6. 1954 am Fuße der Plankensteinnordwand ca. 1400 m; 2. 8. 1954, 4. 8. 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 m; 6. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen; 11. 7. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m von Erlen geklopft.

Corymbites incanus Gyll.: 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift; 11. 7. 1955 auf einer *Crepis-Leontodon*-Weide am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m.

Agriotes obscurus L.: 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m; 11. 7. 55 am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m.

Dolopius marginatus L.: 27. 7. 1954 Risserkogelgipfel 1826 m; 17. 8. 55 Röthenstein ca. 1630 m von der Wiese gestreift.

Sericus brunneus L.: 26. 6. 1954 Uferwiese Plankenstein ca. 1480 m unter Steinen.

Denticollis linearis L.: 18. 8. 1955 Röthenstein ca. 1550 m.

Fam. **Buprestidae**

Buprestis rustica L.: August 1953 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

Fam. **Dascillidae**

Dascillus cervinus L.: 11. 7. 1955 auf einer *Crepis-Leontodon*-Weide am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m.

Fam. **Helodidae**

Cyphon Paykulli Guer.: 27. 7. 1954 Risserkogelgipfel 1826 m.

Fam. **Dryopidae**

Dryops Ernesti Goz.: 12. 7. 1955 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m nach Hochwasser im Angeschwemmen.

Fam. **Dermestidae**

Anthrenus museorum L.: 4. 8. 1954 neben der Freisinger-Hütte circa 1520 m.

Fam. **Byrrhidae**

Cytilus sericeus Forst.: 9. 6. 54 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m; 3. 7. 1955 Hang zum Wallberghaus hinauf ca. 1500 m.

Byrrhus arietinus Stoff.: 25. 6. 54 Plankensteinsüdosthang ca. 1600 m; 3. 8. 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

Byrrhus pustulatus Forst.: 24. 7. 1955 Röthensteinalm ca. 1400 m.

Byrrhus luniger Germ.: 24. 7. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m.

Fam. **Nitidulidae**

Cateretes pedicularius L.: 7. 6. 1955, 17. 8. 1955, 18. 8. 1955, 19. 8. 1955, 22. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift; 2. 4. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht.

Meligethes solidus Kug.:¹⁾ 6. 6. 1955, 7. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

Meligethes aeneus F.:¹⁾ 22. 10. 1954 Ableitenschneidordhang unter Erlen ca. 1540 m in der Streu- und Bodenschicht; 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1690 m von der Wiese gestreift; 12. 7. 1955 von einer *Crepis-Leontodon*-Weide am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m gekätschert.

Meligethes difficilis Heer:¹⁾ 7. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang circa 1680 m von der Wiese gestreift.

Fam. **Cryptophagidae**

Ootypus globosus Waltl: 12. 7. 1955 nach Hochwasser im Angeschwemmen des Röthensteinersees ca. 1460 m.

Fam. **Phalacridae**

Phalacrus substriatus Gyll.: 5. 8. 1954, 17. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gekätschert.

¹⁾ det. Dr. Alen M. Easton

Fam. **Lathridiidae**

Corticaria abietum Motsch.: 12. 5. 1954 Plankensteinsattel ca. 1680 m auf Schnee.

Corticarina similata Gyll.: 6. 6. 55 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

Fam. **Mycetophagidae**

Typhaea stercorea L.: 19. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert.

Fam. **Coccinellidae**

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L.: 9. 9. 1953, 17. 9. 53, 7. 9. 54 Plankensteinsüdosthang ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

Semiadalia notata Laich.: August 1953 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

Aphidecta oblitterata L.: 8. 6. 1955, 15. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von Legföhren geklopft.

Adalia (Adaliopsis) Capra alpina Villa: 6. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gekätschert.

Anatis ocellata L.: 12. 5. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1690 m; 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von den dort vereinzelt stehenden Fichten geklopft.

Chilocorus renipustulatus Scriba: 25. 7. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m.

Fam. **Anobiidae**

Ernobius abietis F.: 12. 5. 1954 Plankensteinsattel ca. 1680 m auf Schnee; 12. 5. 1954, 13. 5. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m auf Schnee. War zu diesem Zeitpunkt sehr zahlreich.

Ernobius mollis L.: 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

Fam. **Ptinidae**

Tipnus unicolor Pill.: 2. 6. 1954, 25. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1680 m in der Streu- und Bodenschicht.

Ptinus fur L.: 3. 7. 1955 in der Freisinger-Hütte ca. 1520 m; 21. 9. 55 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu- und Bodenschicht.

Ptinus tectus Boield.: 2. 4. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht.

Fam. **Oedemeridae**

Chrysanthia viridissima L.: 3. 8. 1954 neben der Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

Fam. **Tenebrionidae**

Hypophloeus linearis F.: 30. 7. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1700 m unter der Rinde von Legföhren in den Gängen von *Pityogenes conjunctus* Rtt.

Cylindronotus convexus Küst.: 27. 7. 54 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m.

Fam. **Scarabaeidae**

Onthophagus fracticornis Preysl.: 10. 6. 54 Ableitenalm ca. 1680 m geködert; 11. 6. 1954, 23. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert; 4. 8. 1954 ebenda in der Streu- und Bodenschicht; 23. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m geködert.

Geotrupes stercorosus Scriba: 15. 9. 1953 Daffnerstein ca. 1500 Meter; 23. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee geködert; 30. 6. 1954 Setzberg-

südseite ca. 1570 m an Hirschlosung; 6. 8. 1954 unterhalb des Wallberghauses ca. 1450 m; 10. 5. 1955 Freisinger-Hütte ca. 1520 m; 19. 9. 1955 Röthenstein ca. 1650 m.

Geotrupes alpinus Hag.: 5. 6. 54 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m; 10. 6. 54, 25. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1650 m von der Wiese gefangen, geködert und auch unter Steinen; 23. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert; 26. 6. 1954 Ableitenschneidordhang ca. 1600 m; 5. 8. 1954 und 6. 6. 55 Grubereck ca. 1600 m; 12. 9. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert. Häufig.

Aphodius depressus Kug. a. *atramentarius* Er.:¹⁾ 24. 6. 1954 Ableitenschneidordhang ca. 1500 m von der Wiese gestreift; 25. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1670 m von der Wiese gekätschert; 25. 6. 1954, 30. 6. 1954 ebenda an Rinderkot; 30. 6. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1570 m an Hirschlosung; 27. 7. 1954 Röthenstein ca. 1600 m an Rinderkot, 28. 7. 1954 ebenda geködert, 10. 7. 1955 hier von der Wiese gestreift.

Aphodius rufipes L.: 2. 8. 1954, 5. 8. 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

Aphodius mixtus Villa: 12. 5. 1954 Röthensteinalm ca. 1400 m auf dem Schnee; 5. 6. 1955, 8. 9. 1954, 22. 10. 1954, 23. 8. 1955, 21. 9. 1955 Ableitenschneidordhang ca. 1500—1600 m in der Streu- und Bodenschicht; 7. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1670 m in der Streu- und Bodenschicht.

Aphodius obscurus F.: 11. 6. 1954, 23. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert; 24. 6. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert, 1. 7. 1954 ebenda an Gamslosung; 21. 8. 1955 Ableitenalm ca. 1670 m von der Wiese gestreift.

Aphodius ater Deg.: 28. 7. 1954 Röthenstein ca. 1600 m an Rinderkot.

Aphodius alpinus Scop.: 2. 4. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht; 30. 6. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1570 m an Hirschlosung; 4. 8. 1954, 11. 7. 1955, 18. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang circa 1680 m von der Wiese gestreift; 24. 7. 1955 Risserkogelgipfel 1826 m.

Aphodius alpinus Scop. a. *mulsanti* Dt.: 19. 10. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1700 m in der Streu- und Bodenschicht; 23. 10. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m in der Streu- und Bodenschicht.

Hoplia farinosa L. (*argentea* Poda): 27. 7. 1954, 24. 7. 1955 Risserkogelgipfel 1826 m; 27. 7. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m; 3. 8. 1954 Röthenstein ca. 1550 m; 22. 8. 1955 auf dem Steig vom Plankensteinsattel zum Risserkogelgipfel ca. 1730 m; 25. 7. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m.

Potosia cuprea F.: Juli 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

Fam. **Lucanidae**

Systemocerus caraboides L.: 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m auf der Rinde von Bergahorn und Buchen.

Fam. **Cerambycidae**

Rhagium bifasciatum F.: 6. 8. 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 Meter; 12. 6. 1955 „Wallbergkircherlhang“ ca. 1550 m.

Rhagium mordax Deg.: 25. 6. 1954 etwas oberhalb des Plankensteinses ca. 1500 m auf der Rinde einer alten Fichte.

Rhagium inquisitor L.: 6. 8. 1954 Risserkogelgipfel 1826 m.

Toxotus cursor L.: August 1953 Freisinger-Hütte ca. 1500 m.

Evodinus clathratus F.: 24. 7. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m.

¹⁾ Gattung *Aphodius* det. Dr. I. Grebensčikov

- Gaurotes virginea* L.: 24. 7. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m.
Leptura rubra L.: August 1953 Freisinger-Hütte ca. 1500 m.
Leptura sanguinolenta L.: August 1953 Freisinger-Hütte 1 ♀ ca. 1520 m.
Strangalia melanura L.: 10. 9. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1600 m auf
 Blüten; 18. 8. 1955 unterhalb des Wallberghauses ca. 1450 m.
Callidium violaceum L.: 20. 8. 1954 Ableitenschneid ca. 1650 m.
Saperda scalaris L.: 11. 7. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m
 von Erlen geklopft.

Fam. **Chrysomelidae**

- Lema Erichsoni* Suffr.: 18. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m
 von der Wiese gekätschert.
Lema liehenis Voet (*cyarella* auct.): 6. 6. 1955, 7. 6. 1955 Planken-
 steinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.
Cryptocephalus sericeus L.: 1. 8. 1954 Steig am Ostfuße des Setzberges
 ca. 1400 m.
Cryptocephalus flavipes F.: 17. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang circa
 1680 m von der Wiese gestreift.
Leptinotarsa decemlineata Say.: 4. 8. 1954 Setzberg ca. 1700 m, wahr-
 scheinlich vom Wind hierhergetragen.
Chrysomela rufa Dft. ssp. *Frieseri* Bech.:¹⁾ 3. 6. 1954 Setzbergwest-
 seite ca. 1550 m; 25. 6. 1954 Röthenstein ca. 1570 m.
Chrysomela crassimargo Germ. ssp. *bavarica* Bech.:¹⁾ 9. 6. 1954 auf
 dem Steig am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m.
Chrysomela purpurascens Germ. ssp. *Stöckleini* Bech.:¹⁾ 2. 6. 1954
 Westseite des Setzberges ca. 1550 m.
Chrysomela varians Schall. f. typ.: 26. 6. 1954 Plankensteinalm circa
 1400 m; 21. 10. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1700 m in der Streu-
 und Bodenschicht; 4. 6. 1955 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 Meter
 unter Steinen; 21. 8. 1955 Bergwald am Nordostfuße des Setzberges ca.
 1400 m auf *Senecio Fuchsii*.
Chrysomela varians Schall. a. *pratensis* Wsc.: 12. 5. 1954 Röthenstein
 ca. 1580 m, 1. 7. 1954 ebenda unter Steinen; 24. 6. 1954 auf dem Steig
 vom Plankensteinsattel zum Risserkogelgipfel ca. 1760 m; 11. 6. 1954,
 20. 9. 1955, 22. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m.
Chrysomela varians Schall. a. *centaura* Hrbst.: 15. 10. 1955 Bergwald
 am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Boden-
 schicht.
Chrysochloa intricata Germ. v. *Anderschi* Duft.: 1. 6. 1954, 24. 6. 1954,
 9. 5. 1955, 7. 6. 1955 Setzbergsüdseite ca. 1550 m auf *Rumex*-Blättern;
 2. 6. 1954 Röthenstein ca. 1600 m; 8. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1670 m un-
 ter Steinen; 9. 6. 1954, 25. 7. 1955, 18. 8. 1955, 21. 8. 1955, 26. 8. 1955,
 Bergwald am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m auf Hochstauden;
 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m; 9. 5. 1955 Freisinger-Hütte ca.
 1520 m; 6. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese
 gefangen; 12. 6. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu-
 und Bodenschicht; 30. 7. 1954, 7. 6. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 Meter.
 Überaus häufig.
Chrysochloa gloriosa F.: 18. 8. 1954, 8. 9. 1954, 21. 8. 1954 Ableiten-
 schneidnordhang ca. 1500 m von Weiden geklopft, 10. 7. 1955 ebenda
 unter Steinen, 23. 8. 1955 hier in der Streu- und Bodenschicht; 20. 8. 54
 Ableitenschneid ca. 1680 m; 25. 7. 1955 Westseite des Setzberges circa
 1550 m; 25. 8. 1954 Plankensteinsattel ca. 1680 m; 25. 7. 1955, 18. 8. 55,
 21. 8. 1955, 24. 8. 1955, 26. 8. 1955, 14. 9. 1955, 21. 9. 1955 Bergwald am
 Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m auf Hochstauden. Sehr häufig.

¹⁾ det. Dr. J. Bechyne

Chrysochloa viridis Duft. f. typ.: 21. 8. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m von *Rhododendron hirsutum* gekätschert.

Chrysochloa viridis Duft. a. *ignita* Com.: 6. 8. 1954 Plankensteingipfel 1763 m.

Chrysochloa virgulata Germ.: 9. 6. 1954 auf dem Steig am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m. Selten.

Chrysochloa cacaliae Schrk.: 9. 6. 1954 auf dem Steig am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m; 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m; 2. 8. 54, 5. 6. 1955, 7. 6. 1955, 8. 6. 1955 Setzbergsüdseite ca. 1560 m auf *Rumex*-Blättern; 8. 9. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1520 m von Weiden geklopft; 9. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m; 25. 7. 1955, 18. 8. 1955, 21. 8. 1955, 24. 8. 1955, 26. 8. 1955, 14. 9. 1955 Bergwald am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m auf *Senecio Fuchsii*, *Adenostyles* und anderen Hochstauden.

Chrysochloa speciosissima Scop.: 25. 6. 1954 Uferwiese Plankensteinee ca. 1470 m; 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m; 26. 6. 1954 auf dem Steig am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m; 25. 7. 1955 Setzbergwestseite ca. 1550 m; 25. 7. 1955, 18. 8. 1955, 21. 8. 1955, 24. 8. 55, 26. 8. 1955, 14. 9. 1955 Bergwald am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 Meter auf Hochstauden. Sehr häufig.

Gastroidea polygoni L.: 4. 8. 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

Gastroidea viridula Deg.: 5. 6. 1955 Röthensteinalm ca. 1400 m auf *Rumex alpinus* sehr zahlreich.

Phaedon armoraciae L.: 9. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee circa 1460 m.

Hydrothassa glabra Hbst. a. *aucta* F.: 12. 7. 1955 nach Hochwasser im Angeschwemmten des Röthensteinersees ca. 1460 m.

Hydrothassa marginella L.: 8. 9. 1953, 9. 6. 1954, 23. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen, 12. 7. 1955 ebenda im Angeschwemmten; 9. 5. 1955 Freisinger-Hütte ca. 1520 m unter Steinen.

Phytodecta Holdhausi Leeder f. typ.:¹⁾ 24. 6. 1954, 25. 6. 54, 30. 6. 54, 5. 7. 1955, 11. 7. 1955, 12. 7. 1955, 21. 9. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1600 m von Weiden, Erlen, *Rhododendron hirsutum* und der Wiese gekätschert. Neu für Deutschland.

Phytodecta Holdhausi Leeder a. *nigrobrunnea* Leeder: 24. 6. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1580 m von Weiden geklopft.

Phytodecta Holdhausi Leeder a. *obscuricollis* Leeder: 24. 6. 1954 und 11. 7. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m von der Wiese gestreift.

Phytodecta pallidus L.: 3. 9. 1953, 6. 9. 1953, 8. 9. 1953, 9. 9. 1953, 16. 9. 1953, 18. 9. 1953, 24. 6. 1954, 30. 6. 1954, 30. 7. 1954, 18. 8. 1954, 20. 8. 1954, 8. 9. 1954, 20. 10. 1954, 22. 10. 1954, 12. 6. 1955, 5. 7. 1955, 11. 7. 1955, 21. 9. 1955, 12. 10. 1955, 13. 10. 1955, 17. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1600 m an Erlen, Weiden, auf der Wiese wie auch in der Streu- und Bodenschicht. Sehr häufig.

Phytodecta interpositus Franz et Palmén: 8. 9. 1953, 16. 9. 1953, 18. 9. 53, 24. 6. 1954, 30. 6. 1954, 20. 10. 1954, 11. 7. 1955, 13. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1600 m wie *Ph. pallidus*. Neu für Deutschland.

Phyllodecta polaris Schneid.: 8. 9. 1953, 9. 9. 1953, 16. 9. 1953, 13. 5. 54, 9. 6. 1954, 24. 6. 1954, 30. 6. 1954, 5. 7. 1955, 11. 7. 1955, 12. 7. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1600 m wie die drei vorhergehenden Arten hauptsächlich an Weiden, aber auch von Legföhren geklopft und von der Wiese gestreift.

Phyllodecta vitellinae L.: 24. 6. 1954, 5. 6. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1550 m von Weiden geklopft.

¹⁾Gattung *Phytodecta* und *Phyllodecta* det. F. Leeder

Luperus viridipennis Germ.: 24. 6. 1954, 30. 6. 1954, 18. 8. 1954 auf Erlen, 8. 9. 54 auf Weiden, Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1550 m.

Phyllotreta nemorum L.: 2. 6. 1954, 25. 6. 1954, 26. 6. 1954, 3. 8. 1954, 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift; 24. 6. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1550 m von der Wiese gestreift, wie auch von *Rhododendron hirsutum* geklopft, 25. 6. 1954, 30. 6. 1954, 3. 8. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m von der Wiese gekätschert; 9. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m, 12. 7. 1955 ebenda im Angeschwemmten nach Hochwasser.

Phyllotreta undulata Kutsch.: 8. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1670 m von der Wiese gekätschert; 26. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

Longitarsus succineus Foudr.: 7. 9. 1954 Plankensteinsüdosthang circa 1620 m in der Streu- und Bodenschicht.

Longitarsus lycopi Foudr.: 3. 6. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m in der Streu- und Bodenschicht.

Longitarsus melanocephalus Deg.: 30. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m von der Wiese gestreift.

Longitarsus atricillus L.: 17. 9. 1953 Plankensteinsüdosthang ca. 1600 m in Anzahl von der Wiese gekätschert.

Longitarsus apicalis Beck.: 9. 9. 1953, 17. 9. 1953, 14. 10. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600—1700 m von der Wiese gekätschert.

Haltica oleracea L.: 8. 6. 1954, 3. 8. 1954, 22. 8. 1955 Ableitenalm ca. 1670 m von der Wiese gefangen; 17. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gekätschert.

Crepidodera Peirolerii Kutsch.: 8. 9. 1953, 6. 6. 1955, 7. 6. 1955, 17. 8. 1955, 23. 8. 1955, 19. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600 bis 1700 m von der Wiese gekätschert.

Crepidodera melanostoma Redtb.: 3. 9. 1953, 8. 9. 1953, 9. 9. 1953, 17. 9. 1953, 25. 6. 1954, 26. 6. 1954, 5. 8. 1954, 7. 9. 1954, 10. 5. 1955, 10. 6. 1955, 11. 7. 1955, 18. 8. 1955, 23. 8. 1955, 19. 9. 1955, 20. 9. 1955, 14. 10. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600—1700 m von der Wiese gekätschert; 30. 6. 1954, 21. 8. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1600 m von der Wiese gestreift, 24. 8. 1954, 11. 9. 1954 ebenda in der Streu- und Bodenschicht, 17. 8. 1955, 21. 8. 1955 hier von Weiden geklopft; 10. 7. 1955, 17. 8. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gekätschert; 11. 7. 1955 auf einer *Crepis-Leontodon*-Weide am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m gekätschert; 26. 8. 1955 von *Senecio Fuchsii* am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m geklopft. Sehr häufig.

Chalcoides fulvicornis F.: 7. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

Minota obesa Waltl.: 30. 3. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1700 m in der Streu- und Bodenschicht, 6. 6. 1955 ebenda von der Wiese gestreift; 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gekätschert; 21. 8. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m von der Wiese gestreift.

Mantura Matthewsii Curt.: 6. 6. 1955, 11. 7. 1955, 14. 10. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gekätschert; 22. 8. 1955 Ableitenalm ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

Chaetocnema hortensis Geoffr. (*aridella* Payk.): 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gekätschert.

Psylliodes glabra Dft.: 5. 8. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1660 m in der Streu- und Bodenschicht.

Cassida vibex L.: 6. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gekätschert.

Cassida denticollis Suffr.: 11. 7. 1955 von einer *Crepis-Leontodon*-Weide am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m gestreift.

Fam. **Curculionidae**

Apion pallipes Kirby: 17. 9. 1953, 7. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1650 m von der Wiese gekätschert; 20. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m von der Wiese gestreift.

Apion loti Kirby: 25. 6. 1954, 30. 6. 1954 Ableitenalm von der Wiese gestreift; 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift; 11. 7. 1955, 17. 8. 1955, 22. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gekätschert; 11. 7. 1955, 12. 7. 1955 von einer *Crepis-Leontodon*-Weide am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m.

Apion Curtisi Steph.: 5. 8. 1954, 7. 9. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

Apion ervi Kirby: 9. 9. 1953 Plankensteinsüdosthang ca. 1690 m und 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

Otiorrhynchus geniculatus Germ.: 9. 9. 1953, 24. 6. 1954, 5. 7. 1955, 17. 8. 1955, 21. 9. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1550 m von Weiden geklopft; 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von Legföhren geklopft; 20. 9. 1955 Plankensteinsattel ca. 1680 m.

Otiorrhynchus sensitivus Scop.: 25. 6. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1650 m; 8. 6. 1955, 15. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m sehr zahlreich von Legföhren geklopft.

Otiorrhynchus armadillo Rossi: 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von Legföhren geklopft.

Otiorrhynchus niger F.: 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von Fichten, 8. 6. 1955, 15. 6. 1955 von Legföhren geklopft.

Otiorrhynchus fuscipes Ol.: 7. 10. 1953, 6. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen; 23. 6. 1954 Röthenstein ca. 1600 m; 26. 6. 1954 Uferwiese Plankensteinsee ca. 1500 m unter Steinen; 5. 6. 1955 Setzbergsüdseite ca. 1550 m; 8. 6. 1955 Grubereck ca. 1600 m; 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von Fichten, 8. 6. 1955, 15. 6. 1955 von Legföhren geklopft. Häufig im ganzen Gebiet.

Otiorrhynchus morio F.: 11. 5. 1954 unterhalb dem Wallberghaus ca. 1450 m; 3. 6. 1954, 6. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m unter Steinen; 4. 6. 1954, 24. 6. 1954, 7. 6. 1955 Setzbergsüdseite ca. 1600 m auf *Rumer alpinus*: 5. 6. 1954, 23. 6. 1954 Röthenstein ca. 1600 m; 6. 6. 1954, 29. 7. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen; 6. 6. 1954 vom Grubereck zum Röthensteinersee herab ca. 1550 m unter Steinen; 9. 6. 1954 am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m; 24. 6. 1954, 25. 6. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1600 m von Weiden geklopft; 24. 6. 1954 ebenda von der Wiese gestreift und 28. 7. 1954, 3. 8. 1954, 20. 8. 1954 hier aus der Streu- und Bodenschicht gesiebt; 25. 6. 1954 Uferwiese Plankensteinsee ca. 1480 m; 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m; 25. 7. 1955, 18. 8. 1955, 21. 8. 1955, 24. 8. 1955, 26. 8. 1955, 14. 9. 1955 Adenostyletum am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m, hauptsächlich von *Senecio Fuchsii*.

Otiorrhynchus scaber L.: 21. 8. 1955 im Adenostyletum am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m von *Senecio Fuchsii* geklopft.

Otiorrhynchus subcostatus Stierl.: 30. 7. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1530 m in der Streu- und Bodenschicht; 23. 10. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m in der Streu- und Bodenschicht.

Otiorrhynchus uncinatus Germ.: 8. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m in der Streu- und Bodenschicht; 19. 8. 1954, 10. 9. 1954, 9. 5. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1670 m in der Streu- und Bodenschicht.

Fortsetzung folgt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1959

Band/Volume: [008](#)

Autor(en)/Author(s): Scherer Gerhard

Artikel/Article: [Die Käfer des Risserkogelgebietes - Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns - Fortsetzung 55-64](#)