

Beitrag zur Acalles-Fauna Südbayerns

Von R. Frieser

Es ist noch nicht mit Sicherheit bekannt, ob alle in den Katalogen für Deutschland angeführten Arten auch tatsächlich vorkommen. So habe ich für *A. denticollis* Germ., *turbatus* Boh. und *echinatus* Germ. noch keine sicheren Belege erhalten. Die in der Fauna Germanica noch genannten *rolleti* Germ., *dromedarius* Boh. und *diocletianus* Germ. sind ausgesprochen mediterrane Arten und kommen bei uns nicht vor. Für Südbayern habe ich die Arten *camelus* F., *lemur* Germ., *hypocrita* Boh. und *croaticus* Bris., letzterer neu für Bayern, feststellen können.

A. croaticus bildet bei uns eine eigene Rasse, die ich nach meinem verstorbenen Freund F. Stöcklein, mit dem ich sie erstmals sammelte, benenne.

Beschreibung des *A. croaticus* subsp. **stöckleini** nov.:

Durchwegs kürzer gebaut, der ganze Käfer wirkt plumper als die Stammform. Die Beschuppung der Flügeldecken ist gleichmäßig dunkelbraun bis schwärzlich. Zwischen den beiden Höckern am Absturz der Flügeldecken liegt ein auffallend heller Nahtfleck. Die Stammform ist hellbraun gescheckt, bei ihr ist der helle Schuppenfleck nur undeutlich oder nicht erkennbar.

Eine Serie ♂♂ und ♀♀ habe ich in den Sommermonaten der letzten Jahre am Fuße der Benediktenwand in ca. 1500 m Höhe aus Latschen und Erlenlaub gesiebt.

Der Holo- und Allotypus, sowie die Paratypen befinden sich in meiner Sammlung. Ein Paratypus wurde der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates überlassen.

Anschrift des Verfassers:

Robert Frieser, Starnberg, Maximilianstr. 7

Die Käfer des Risserkogelgebietes

Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns

Von Gerhard Scherer

(Schluß)

Otiorrhynchus salicis Ström. (*squamosus* Mill.): 23. 6. 1954 Röthenstein ca. 1620 m; 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m; 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von den dort vereinzelt stehenden Fichten geklopft; 12. 6. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu- und Bodenschicht, 11. 7. 1955 ebenda von Weiden geklopft; 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

Otiorrhynchus auricomus Germ.: 24. 6. 1954, 30. 6. 1954, 11. 7. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m von Weiden und Erlen geklopft, 18. 8. 1954 ebenda in der Streu- und Bodenschicht.

Otiorrhynchus gemmatus Scop.: 3. 6. 1954, 5. 6. 1954, 23. 6. 1954, 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1600 m; 4. 6. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1600 m; 4. 6. 1954, 6. 6. 1954, 9. 6. 1954, 1. 7. 1954, 29. 7. 1954, 8. 9. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen; 25. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee in Mengen auf den Blüten der Sumpfdotterblume; 9. 6. 1954 auf dem Steig am Ostfuße des Setzberges

ca. 1400 m; 8. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1670 m unter Steinen; 25. 6. 1954, 6. 8. 1954 Uferwiese Plankensteintsee ca. 1470 m; 24. 6. 1954, 25. 6. 1954, 22. 10. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1650 m; 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m; 2. 8. 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 m; 6. 6. 1954 vom Grubereck zum Röthensteinersee herab ca. 1550 m unter Steinen; 18. 8. 1955, 15. 10. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m auf Hochstauden. Überaus häufig.

Phyllobius arborator Hbst.: 2. 8. 1954, 4. 8. 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 m; 25. 7. 1955 auf dem Steig am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m; 25. 7. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m.

Phyllobius calcaratus F.: 4. 8. 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 m; 24. 7. 1955 auf dem Steig von der Röthensteinalm zur Plankensteinalm ca. 1400 m; 25. 7. 1955, 18. 8. 1955 in der Hochstaudenflur des Bergwaldes am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m.

Polydrosus pilosus Gredl.: 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von Legföhren geklopft.

Sciaphilus asperatus Bonsd.: 11. 7. 1955 von einer *Crepis-Leontodon*-Weide am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m gekätschert.

Strophosomus melanogrammus Först.: 8. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m in der Streu- und Bodenschicht, 17. 8. 1955 ebenda von der Wiese gekätschert.

Barynotus moerens F. (*elevatus* Marsh.): 9. 6. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht; 10. 9. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1640 m in der Streu- und Bodenschicht.

Tropiphorus carinatus Müll.: 30. 7. 1954, 1. 8. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1530 m in der Streu- und Bodenschicht; 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m; 12. 7. 1955 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m im Angeschwemmten nach Hochwasser.

Tropiphorus cuculatus Fauv.: 9. 5. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m in der Streu- und Bodenschicht. Neu für Deutschland.

Cossonus linearis F.: 2. 4. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht.

Dorytomus taeniatus F.: 30. 6. 1954, 8. 9. 1954, 5. 7. 1955, 11. 7. 1955, 21. 9. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m von Weiden geklopft.

Micotrogus picirostris F.: 26. 6. 1954, 2. 8. 1954, 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

Anthonomus varians Payk.: 25. 6. 1954, 8. 6. 1955, 15. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m sehr zahlreich von Legföhren geklopft.

Anthonomus rubi Hbst.: 17. 9. 1953, 2. 8. 1954, 7. 6. 1955, 11. 7. 1955, 19. 8. 1955, 22. 8. 1955, 14. 10. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600 bis 1700 m von der Wiese gestreift; 3. 8. 1954, 17. 8. 1955 Ableitenalm ca. 1680 m von der Wiese gekätschert; 21. 8. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m von Weiden geklopft.

Anthonomus pedicularis L.: 25. 7. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m.

Pissodes pini L.: 15. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von Legföhren geklopft.

Pissodes validirostris Gyll.: 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von Legföhren geklopft.

Magdalis phlegmatica Hbst.: 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von Legföhren geklopft.

Hylobius piceus Deg.: 1. 7. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m aus einer faulen Fichte gesiebt.

Liparus glabriorstris Küst.: 18. 8. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m von *Adenostyles*.

Liparus germanus L.: 12. 5. 1954, 18. 8. 1955 Röthenstein ca. 1580 m; 24. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m; 25. 6. 1954 oberhalb

dem Plankensteinsee ca. 1500 m unter Steinen; 9. 6. 1954, 1. 8. 1954 auf dem Steig am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m; 14. 6. 1955 vom Grubereck zum Röthensteinersee herab ca. 1550 m unter Steinen; 18. 8. 1955, 22. 8. 1955 Bergwald am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht.

Liosoma cribrum Gyll.: 6. 9. 1953, 20. 8. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1520 m in der Streu- und Bodenschicht, 30. 6. 1954 ebenda von der Wiese gestreift 31. 7. 1954 oberhalb des Röthensteinersees ca. 1500 m aus Moos gesiebt.

Hypera oxalidis Hbst.: 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

Hypera comata Boh.: 18. 8. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1530 m in der Streu- und Bodenschicht, 20. 8. 1954 ebenda von Weiden und Erlen geklopft; 28. 8. 1955 Bergwald am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m auf Hochstauden.

Phytonomus plantaginis Deg.: 17. 8. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1670 m in der Streu- und Bodenschicht.

Heterophytobius quadrimodorus Gyll.: 3. 8. 1954 Ableitenalm circa 1680 m von der Wiese gekätschert.

Zacladus affinis Payk.: 20. 8. 54 Ableitenschneidnordhang ca. 1530 m in der Streu- und Bodenschicht; 25. 6. 1954, 26. 6. 1954, 2. 8. 1954, 11. 7. 1955, 18. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600—1700 m von der Wiese gefangen.

Ceuthorrhynchus pallidicornis Bris.: 6. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gekätschert.

Miarus graminis Gyll.: 25. 6. 1954, 26. 6. 1954, 2. 8. 1954, 4. 8. 1954, 11. 7. 1955, 17. 8. 1955, 18. 8. 1955, 19. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600—1700 m sehr zahlreich von der Wiese gestreift.

Rhynchaenus fagi L.: 3. 8. 1954, 6. 6. 1955, 7. 6. 1955, 17. 8. 1955, 18. 8. 1955, 19. 8. 1955, 22. 8. 1955, 23. 8. 1955, 19. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600—1700 m von der Wiese gefangen; 8. 6. 55, 15. 6. 55 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von Fichten und Legföhren geklopft; 17. 8. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift; 21. 8. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m von Weiden geklopft, 13. 10. 1955 ebenda aus der Streu- und Bodenschicht; 22. 8. 1955 Ableitenalm circa 1680 m von der Wiese gefangen; 15. 10. 1955 Bergwald am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht.

Fam. **Scolytidae** (Ipidae)

Hylastes cunicularius Er.: 2. 6. 1954, 23. 6. 1954, 25. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m.

Phthorophloeus spinolosus Rey: 11. 7. 1955 auf einer Weide am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m vom Gras gestreift.

Pityophthorus Henscheli Seitn.: 28. 7. 1954 Risserkogelsüdhang circa 1700 m unter der Rinde abgestorbener Legföhren.

Pityophthorus pityographus Ratz.: 28. 7. 1954, 18. 8. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1700 m unter der Rinde abgestorbener Legföhren.

Pityogenes conjunctus Rtt. (*bistridentatus* Rtt.; *alpinus* Egg.): 28. 7. 1954, 30. 7. 1954, Juni 1955, 26. 8. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1700 m unter der Rinde abgestorbener Legföhren.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Gerhard Scherer, Museum Georg Frey, Tutzing/Obb.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1959

Band/Volume: [008](#)

Autor(en)/Author(s): Scherer Gerhard

Artikel/Article: [Die Käfer des Risserkogelgebietes - Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns - Fortsetzung 67-69](#)