

Beitrag zur Acalles-Fauna Südbayerns

Von R. Frieser

Es ist noch nicht mit Sicherheit bekannt, ob alle in den Katalogen für Deutschland angeführten Arten auch tatsächlich vorkommen. So habe ich für *A. denticollis* Germ., *turbatus* Boh. und *echinatus* Germ. noch keine sicheren Belege erhalten. Die in der Fauna Germanica noch genannten *rolleti* Germ., *dromedarius* Boh. und *diocletianus* Germ. sind ausgesprochen mediterrane Arten und kommen bei uns nicht vor. Für Südbayern habe ich die Arten *camelus* F., *lemur* Germ., *hypocrita* Boh. und *croaticus* Bris., letzterer neu für Bayern, feststellen können.

A. croaticus bildet bei uns eine eigene Rasse, die ich nach meinem verstorbenen Freund F. Stöcklein, mit dem ich sie erstmals sammelte, benenne.

Beschreibung des *A. croaticus* subsp. **stöckleini** nov.:

Durchwegs kürzer gebaut, der ganze Käfer wirkt plumper als die Stammform. Die Beschuppung der Flügeldecken ist gleichmäßig dunkelbraun bis schwärzlich. Zwischen den beiden Höckern am Absturz der Flügeldecken liegt ein auffallend heller Nahtfleck. Die Stammform ist hellbraun gescheckt, bei ihr ist der helle Schuppenfleck nur undeutlich oder nicht erkennbar.

Eine Serie ♂♂ und ♀♀ habe ich in den Sommermonaten der letzten Jahre am Fuße der Benediktenwand in ca. 1500 m Höhe aus Latschen und Erlenlaub gesiebt.

Der Holo- und Allotypus, sowie die Paratypen befinden sich in meiner Sammlung. Ein Paratypus wurde der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates überlassen.

Anschrift des Verfassers:

Robert Frieser, Starnberg, Maximilianstr. 7

Die Käfer des Risserkogelgebietes

Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns

Von Gerhard Scherer

(Schluß)

Otiorrhynchus salicis Ström. (*squamosus* Mill.): 23. 6. 1954 Röthenstein ca. 1620 m; 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m; 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von den dort vereinzelt stehenden Fichten geklopft; 12. 6. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu- und Bodenschicht, 11. 7. 1955 ebenda von Weiden geklopft; 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

Otiorrhynchus auricomus Germ.: 24. 6. 1954, 30. 6. 1954, 11. 7. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m von Weiden und Erlen geklopft, 18. 8. 1954 ebenda in der Streu- und Bodenschicht.

Otiorrhynchus gemmatus Scop.: 3. 6. 1954, 5. 6. 1954, 23. 6. 1954, 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1600 m; 4. 6. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1600 m; 4. 6. 1954, 6. 6. 1954, 9. 6. 1954, 1. 7. 1954, 29. 7. 1954, 8. 9. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen; 25. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee in Mengen auf den Blüten der Sumpfdotterblume; 9. 6. 1954 auf dem Steig am Ostfuße des Setzberges

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1959

Band/Volume: [008](#)

Autor(en)/Author(s): Frieser Robert

Artikel/Article: [Beitrag zur Acalles-Fauna Südbayerns 67](#)