© Münchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Quedius joyi Fagel kommt im nordbayerischen Raum vor. Im Fichtelgebirge erbeutete ich am 1. 9. 62 aus ziemlich trockenem Sphagnum durch Ausklopfen ein Stück dieser Art im Fichtelsee-Moor (det. K o r g e). Dabei wurden gemeinsam mit Freund S. V i e r l i n g, Stammbach, auch einige Vertreter von *Helophorus tuberculatus* Gyll. erbeutet.

Richard P a p p e r i t z, 8592 Wunsiedel, Bezirksamtsstraße 4.

106. Interessante Heteropterenfunde aus Südbayern

1. **Omphalonotus quadriguttatus** (Kbm.) *(Miridae)*. Am 30. Juli 1958 konnte ich auf der Garchinger Heide 7 ♂♂ dieser Art von Gräsern streifen.

2. **Euryopicoris nitidus** (M.-D.) *(Miridae)*. In den Jahren 1958 und 1959 war diese Wanze an der Isar bei Ismaning und Plattling in den Monaten Mai und Juni häufig anzufinden. 1960 suchte ich die Art bei Ismaning vergeblich.

3. **Pachyterna fieberi** Fb. *(Miridae)*. Am 14. Juni 1958 und am 19. Mai 1959 wurde von mir 1 ♀ bzw. 1 ♂ am Hintersee bei Ramsau/Berchtesgaden an einem Südhang im Tal von *Pinus montana* Mill. geklopft. Die Art ist meines Wissens aus Deutschland noch nicht gemeldet.

4. **Lygus montanus** (Schl.) *(Miridae)*. Am Aufstieg zum Braunedk (17. Juni 1957) und auf dem Hirschberg bei Tegernsee (7. Juli 1957) fand sich diese Art vereinzelt an *Salix glabra* Scop. und *Rumex* sp.

5. **Camptotelus costalis** (H. Sch.) *(Lygaeidae)*. Im Binnendünengebiet bei Siegenburg begegnete mir am 2. September 1961 unter vielen *C. lineolatus* (Schill.) auch ein ♂ dieser Art.

6. **Lamproplax picea** (Fl.) *(Lygaeidae)*. 2 ♂♂, 3 ♀♀ sammelte ich im August 1960 in einem Erlenbruch zwischen nassem Moos und *Calluna vulgaris* (L.) bei Bad Reichenhall. Die Art war in Gesellschaft von *Scolopostethus decoratus* (H.), *Stygnocoris pedestris* Fall. und *Panaorus adspersus* (Ms. und Rey).

7. **Trapezonotus desertus** Sdst. *(Lygaeidae)*. Im Binnendünengebiet bei Siegenburg erbeutete ich am 2. September 1961 2 ♂♂ mit auffallend gelbrotem Scapus.

Dr. Heinz R e m o l d, 8 München-Pasing, Mendelsohnstraße 12½.

Bayerischer Entomologentag 1964

Nach dem Erfolg des vom 5. bis 7. April 1963 abgehaltenen 1. Bayerischen Entomologentages beabsichtigt die Münchner Entomologische Gesellschaft (e. V.) und die Firma Dr. R e i t t e r GmbH. auch 1964 eine Entomologentagung in etwa gleichem Rahmen wie im Vorjahr durchzuführen.

Als endgültiger Termin wurden die Tage vom 3.—5. April 1964 festgelegt. Das genaue Programm wird Mitgliedern und Interessenten rechtzeitig zugesandt. Es enthält entomologische Vorträge, eine Insektenausstellung bekannter Fachleute und die von der Firma Dr. R e i t t e r GmbH. veranstaltete Internationale Insektenbörse. Außerdem soll wieder ausreichend Gelegenheit gegeben werden, persönliche Kontakte mit Kollegen aufzunehmen und zu pflegen. Tagungsort ist wie im vergangenen Jahr das Künstlerhaus am Lenbachplatz.

Anfragen, den „Bayerischen Entomologentag 1964" betreffend, sind zu richten an die Münchner Entomologische Gesellschaft, 8 München 19, Schloß Nymphenburg, Nordflügel, oder an die Firma Dr. R e i t t e r GmbH., 8 München 22, Kaulbachstraße 1.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen

Jahr/Year: 1964

Band/Volume: 013

Autor(en)/Author(s): Anonym

Artikel/Article: Bayerischer Entomologentag 1964 8