

- Jacob, U. (1972): Beitrag zur autochthonen Ephemeropterenfauna in der Deutschen Demokratischen Republik. — Diss. Leipzig.
- Kleiber, O. (1911): Die Tierwelt des Moorgebietes von Jungholz im südlichen Schwarzwald. — Arch. Naturgesch. 77: 1, 3. Suppl.-H., 1—115. Berlin.
- McLachlan, R. (1886): Une excursion névroptérologique dans la Forêt-Noire (Schwarzwald). — Rev. d'Entomol. 5: 126—136.
- Malzacher, P. (1973): Eintagsfliegen des Bodenseegebietes (Insecta, Ephemeroptera). — Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 32: 123—142. Karlsruhe.
- (1976): Nachtrag zur Eintagsfliegenfauna des Bodenseegebietes. — Beschreibung einer neuen Art der Gattung *Caenis* (Insecta, Ephemeroptera). — Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 35: 129—136. Karlsruhe.
- Mucke, R. (1942): Beiträge zur Kenntnis der Uferfauna des Bodensees. — Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet 7: 3—109. — Karlsruhe.
- Müller-Liebenau, I. (1969): Revision der Europäischen Arten der Gattung *Baetis* Leach, 1815 (Insecta, Ephemeroptera). — Gewässer und Abwässer H. 48—49: 1—214. Göttingen.
- Puthz, V. (1978): Ephemeroptera. — In Illies, J. (Hrsg.): Limnofauna Europaea: 256—263. Stuttgart.
- Sander, U. (1961): Zwei für den Schwarzwald neue Eintagsfliegen (Ephemeroptera) *Baetis alpinus* Pict. und *Baetis subalpinus* Bengtsson. — Mitt. Bad. Landesver. Naturk. u. Naturschutz, N.F. 8 (1): 71—73. Freiburg.
- Schoenemund, E. (1930): Eintagsfliegen oder Ephemeroptera. — In Dahl, F. (Hrsg.): Die Tierwelt Deutschlands, Teil 19. Jena.
- Steinmann, P. (1907): Die Tierwelt der Gebirgsbäche, eine faunistisch-biologische Studie. — Ann. Biol. Lacustre 2: 72—163. Brüssel.
- Weigel, E. (1977): Auswirkungen von Ausbaumaßnahmen auf die Bod fauna kleiner Fließgewässer. — Wiss. Arbeit zur Prüfung für das Lehramt an Gymnasien; unveröffentlicht. Tübingen.

Anschrift des Verfassers:

Dipl.-Biol. Roland Grimm, Inst. f. Biol. III, Lehrstuhl f. Zool.
Auf der Morgenstelle 28, D-7400 Tübingen 1.

Hinweis auf die Typusart des Genus *Wittia* de Freina, 1980 (Lepidoptera, Arctiidae)

Bei der Einführung des Gattungsnamens *Wittia* nom. nov. pro *Systrophia* Hübner, 1819 wurde von mir nicht darauf hingewiesen, daß *Bombyx aureola* Hübner, 1803 (*aureola* Hbn. ist Synonym zu *sororcula* Hfn.) Typusart für das Genus *Systrophia* Hübner ist, so daß *aureola* Hübner automatisch als Typusart für das Genus *Wittia* de Freina übernommen wird.

Literatur

- Freina, J. de, 1980: *Wittia* nom. nov. (Lepidoptera, Arctiidae). — Nachr.-Bl. Bayer. Ent. 29: 80.

Anschrift des Verfassers:

Josef J. de Freina, Eduard-Schmid-Str. 10,
8000 München 90

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: [029](#)

Autor(en)/Author(s): Freina Josef J. de

Artikel/Article: [Hinweis auf die Typusarten des Genus Wittia de Freina 1980. \(Lep. Arctiidae\). 125](#)