© Münchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



♂-Fühler von 1. *Autotropis montanus* Wolfr. — 2. *sibiricus* ssp. nov. — 3. *taiwanus* ssp. nov. Abb. 3.

3. **Caccorhinus oculatus koltzei** Reitter
(Wien. Ent. Zeit. XIV, 1896: 159) **nov. comb.**

Der Typus von *koltzei* Reitt. befindet sich im Museum Budapest und hat mir zum Vergleich vorgelegen. Er unterscheidet sich habituell ebensowenig von der Nominatsubspezies von Japan wie die Subspezies *formosanus* Jord. Wie bei letzterer besteht der Unterschied nur in der Färbung des 1. Tarsengliedes. Dieses Merkmal ist aber konstant und die drei bisher bekannten Rassen unterscheiden sich folgendermaßen:

1 (2) Alle Tarsenglieder einheitlich schwarz (Japan) *oculatus oculatus* Sharp.

2 (1) Zumindest an einem der beiden hinteren Beinpaare die Basalhälfte des 1. Tarsengliedes weiß.

3 (4) Nur am 1. Glied der Hintertarsen der Basalteil weiß (Ostsibirien: Ussuri). *oculatus koltzei* Reitt.

4 (3) Der Basalteil des 1. Tarsengliedes der Hinter- und Mittelbeine weiß (China, Taiwan). *oculatus formosanus* Jord.

Anschrift des Verfassers:
Robert Frieser, Edelweißstraße 1, D-8133 Feldafing

Berichtigung

Der Bestimmungsabend der Koleopterologischen Arbeitsgemeinschaft findet am **Montag, dem 22. Juni 1981,** nicht wie irrtümlich angegeben am 20. Juni, statt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: 030

Autor(en)/Author(s): Anonym

Artikel/Article: Berichtigung. 55