

Zur Verbreitung von *Mesapamea secalella* Remm, 1983

(Lepidoptera, Noctuidae, Amphipyrinae)

Von Gottfried Behounek

Abstract

Mesapamea secalella was described by Remm from Estland. New examinations pointed out, that this specimen is more spread in Europe and was confused with *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758). *M. secalella* is firstly recorded from several places in Europe.

Zusammenfassung

Mesapamea secalella wurde von Remm aus Estland beschrieben. Neue Untersuchungen ergaben, daß diese Art in Europa viel weiter verbreitet ist und bisher immer mit *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758) verwechselt wurde. *M. secalella* wird hier erstmals für verschiedene europäische Gebiete nachgewiesen.

Mesapamea secalella Remm, 1983 ist von *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758) habituell kaum zu unterscheiden, zumal beide Arten auch die gleiche große Variationsbreite aufweisen. Eine eindeutige Determination ist nur durch Genitaluntersuchung, wie bei den Arten der Gattung *Amphipoea* Billberg, 1820, möglich. Beide Arten fliegen nebeneinander an den gleichen Flugplätzen, die Flugzeit ist von Ende Juni bis Ende August.

An folgenden Fundorten wurde *M. secalella* neben *M. secalis* festgestellt.

Deutschland, Südbayern, Landshut, 4. 7. 1958 (leg. et coll. Schütz), (Gen. Prp. 0217). — Gleicher Fundort, 16. 7. 1961 (leg. et coll. Schütz), (Gen. Prp. 0218). — Südbayern, Grafing bei München, 24. 8. 1968 (leg. et coll. Rau) (Gen. Prp. 0199). — Südbayern, Erdinger Moor, Berglern, 29. 6. 1979 (leg. et coll. Behounek), (Gen. Prp. 0170). — Südbayern, Deininger Moor bei Wolfratshausen, 29. 6. 1979 (leg. et coll. Behounek), (Gen. Prp. 0166, 0167, 0169).

Österreich, Tirol, Ötztaler Alpen, Rettenbachtal, 2300 m, 11. 8. 1980 (leg. et coll. Behounek), (Gen. Prp. 0172). — Steiermark, Oberzeiring, 18. 7. 1953 (leg. Meier, coll. Behounek), (Gen. Prp. 0171).

Italien, Gardaseegebiet, Monte Maderno, 250 m, 18. 8. 1977 (leg. et coll. Behounek), (Gen. Prp. 0186). — Ligur. Apennin, Lago di Ortiglieto, 300 m, 9.—23. 8. 1977 (leg. et coll. Behounek), (Gen. Prp. 0185). — Ligur. Apennin, Colle Cabanna, 600m, 11.—22. 8. 1977 (leg. et coll. Behounek), (Gen. Prp. 0189).

Abschließend möchte es der Verfasser nicht versäumen, den Herren W. Pavlas, Deininger, A. E. Rau, Grafing und R. Schütz, Landshut, für die Überlassung von Untersuchungsmaterial zu danken.

Literatur

- Heinicke, W. (1959): Revision der Gattung *Apamea* Ochs. 1816 (Lep., Noctuidae) 1. Teil. — Deutsche Ent. Ztschr., N. F. 6 (1—3): 100—111, Abb. 1—11.
Remm, H. (1983): New species of Noctuidae (Lepidoptera) from the USSR. — Rev. d'ent de l'URSS, 62 (3): 596—600, Abb. 11—16.

Anschrift des Verfassers:

Gottfried Behounek, Jägerstraße 4a, D-8024 Deisenhofen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [034](#)

Autor(en)/Author(s): Behounek Gottfried

Artikel/Article: [Zur Verbreitung von *Mesapamea scalella* Remm, 1983 \(Lep. Noctuidae, Amphipyryinae\). 39](#)