

Das europäische Teilareal dieser ebenfalls eurasiatisch verbreiteten Art läßt sich durch eine Linie mit dem folgenden Verlauf umgrenzen:

Mittlerer Ural — Leningrad — Südfinnland — Südostschweden — Südnorwegen — Süd- und Mittelengland — Mittelfrankreich — Schweiz — östliches Ungarn — Bulgarien — Kleinasien. In seinem Südteil löst sich das Verbreitungsgebiet in eine Reihe von isolierten kleinen Teilarealen auf. Die Art ist dabei ausgesprochen lokal und selten.

### Literatur

F i b i g e r, M. & S v e n d s e n, P. (1981): Danske natsommerfugle — Klampenborg.  
H a c k e r, H. (im Druck): Die Noctuidae Griechenlands mit einem Überblick über die Verhältnisse im Balkanraum.

Anschrift des Verfassers:

Hermann H a c k e r, Kilianstr. 10, D-8623 Staffelstein

### Nachtrag

zur Neubeschreibung von *Scintillatrix achaica* Brandl (Coleoptera, Buprestidae)  
im Nachr. bl. Bayer. Ent. **35** (1), 1—7, 1986

Durch ein bedauerliches Versehen unterblieb die Drucklegung der Größenangaben aus dem Manuskript. Sie werden hiermit ergänzt. Auf S. 3, nach Zeile 10 ist einzufügen:

Länge: 11,0—13,9 mm; Breite: 4,2—5,8 mm.

Auch die Anmerkung zur nomenklatorischen Problematik mit den damit verbundenen Änderungen kann an dieser Stelle bereits, wie zu hoffen ist, endgültig aktualisiert werden.

Im „Catalogue Of The Higher Taxa Of The Family Buprestidae“ (S. 418—419, B e l l a m y, 1985, Navors. nas. Mus., Bloemfontain, Vol. 4, Part 15) werden jetzt den neuesten Erkenntnissen nach *Scintillatrix* Obenberger, *Palmar* Schaefer und *Ovalisia* Kerremans als drei völlig eigenständige Gattungen angesehen, entsprechend dem diesbezüglichen Hinweis aus H e l l r i g l's Arbeit (1972, S. 652).

Anschrift des Verfassers:

Peter B r a n d l, Spielhahnstr. 11, D-8208 Kolbermoor

## Aus der Münchner Entomologischen Gesellschaft

### Aufruf an die Mitglieder und Bitte um Mitarbeit

1. Das Bayerische Landesamt für Umweltschutz (**LfU**) hat in den vergangenen Jahren zahllose faunistische Daten in einer EDV-Anlage gespeichert. Diese angelaufene Aktion soll auch in Zukunft fortgesetzt werden, darum ist es auch im Sinne des Biotop- und Artenschutzes notwendig, weiterhin Fundmeldungen an diese Institution weiterzugeben. Besonders dringend ist eine Kontrolle der derzeit eingeebten Nachweise, damit Fehler beim Ausdruck und einer anzustrebenden Publikation vermieden werden. Darum sind alle Kenner bzw. Spezialisten bestimmter Tiergruppen aufgefordert, eine kritische Durchsicht der bisher eingeebten Daten (Prüfung, Verbreitung, Habitatbezogenheit, Taxonomie, Determination etc.) vorzunehmen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [035](#)

Autor(en)/Author(s): Brandl Peter

Artikel/Article: [Nachtrag zu: \*Scintillatrix achaica\* nov. sp., eine neue Art der Gattung \*Scintillatrix\* Obnb. \(= \*Lampra Lac. partim\*\) aus Griechenland \(Col. Buprestidae\). 63](#)