

Zusammenfassung

Eine neue Unterart von *Cosmosatyrus chiliensis* GUÉRIN, 1832, *wygnankii* subsp. n., aus dem nördlichen Mittelchile wird beschrieben und abgebildet.

Literatur

1. GUÉRIN-MÉNEVILLE, F. E. 1832: In Duperry, L. J.: Voyage autour du monde sur la corvette La Coquille, 1822–25 v. 3–5.; Zoologie par R. P. Lesson, Prosper Garnot und Guérin-Méneville, Paris 1826–30 S. 280–281, Atlas, Ins., Taf. 16, Fig. 4–5 (nur ♂ Ober- und Unterseite).
2. BUTLER, A. G. 1881: List of Butterflies collected in Chili by Thomas Edmonds. In: Transactions of the Entomological Society of London. S. 460 Nr. 21.
3. ELWES, H. J. 1902/3: The Butterflies of Chile in: Transactions of the Entomological Society of London. S. 280 Nr. 19, Taf. XV, Fig. 9 ♂, 10 ♀ (ober- und unterseits, farbig).
4. SEITZ, A. 1906–1954: Die Gross-Schmetterlinge der Erde, A. Kernen-Verlag Stuttgart, Bd. 5. Die amerikanischen Tagfalter (1924), Text S. 233 (1911), Taf. 51 Zeile a (nur ♂ nur unterseits).
5. BRYK, F. 1945: Schmetterlingsausbeute aus Patagonien. In: Arkiv för Zoologi., Stockholm, Bd. 36 A (3): 11 Nr. 8 (ssp. *elwesi* Bryk).
6. PEÑA G., L. E. 1965–66: Revalidación de *Cosmosatyrus chiliensis elwesi* Bryk. In: Observaciones sobre mariposas de Chile (Lepidoptera) Bol. Soc. Biol., Concepción/Chile, XL: 99 Nr. 3.
7. PEÑA G., L. E. 1975: In: Guía para reconocer mariposas, Universidad de Chile, Facultad de Agronomía, Santiago/Chile, S. 86–87 (Abb. ♂ und ♀ ober- und unterseits, farbig).

Anschrift des Verfassers:

Günter JUNGE

Zehntbergstraße 15, D-6905 Schriesheim-Altenbach

Cynegetis syriaca (MADER) neu für die Türkei

(Coleoptera, Coccinellidae)

Cynegetis syriaca (MADER), new for Turkey

Von Helmut FÜRSCHE

Abstract:

The second species of gen. *Cynegetis*, so far known only from Syria (type series) and Iran is recorded from eastern Turkey.

Diese zweite *Cynegetis*-Art, die MADER als *Subcoccinella* beschrieben hat, war bis zur Meldung DUVERGERS aus der Provinz Tehran nur in der Typenserie aus Syrien (Ak-bés) bekannt. K. und S. WELLSCHMIED fanden nun 5 Exemplare in der Osttürkei bei Antakya am 17. 5. 85. Damit sind insgesamt 14 Exemplare dieser seltenen Art bekanntgeworden. Sie ist *Subcoccinella quatuordecimpunctata* in Färbung und Zeichnung sehr ähnlich, davon aber leicht durch die drei verflossenen Flecken an der Basis jedes Elytrons in der Nähe des Scutellums zu unterscheiden. Beschrieben und abgebildet in FÜRSCHE, H. 1986: Rev. Zool. Afr. 99 (4): 398. Leider hat sich dort ein Satzfehler eingeschlichen, der hier korrigiert sei: Es muß natürlich hinter *Cynegetis rapillyi* (einem Synonym von *C. syriaca*) heißen: „Stummelflügelig, in der Färbung und Zeichnung sehr ähnlich *Subcoccinella quatuordecimpunctata*.“ Punkt und Absatz nach „ähnlich“ sind falsch!

Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. Helmut FÜRSCHE

Universität Passau, Postfach 25 40, D-8390 Passau

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [036](#)

Autor(en)/Author(s): Fürsch Helmut

Artikel/Article: [Cygnegetis syriaca \(Mader\) neu für die Türkei \(Col. Coccinellidae\). 47](#)