

wieder etwa 80 Larven zusammengekommen. Vermutlich durch Frosteinwirkung wuchs die Zahl in der Folgezeit nur unwesentlich an. Ob noch weitere Aggregationen stattgefunden haben, konnte nur in einem Fall – Mulde mit etwa 50 Larven – bestätigt werden.

Im Verlauf dieser Beobachtungen konnten auch Aggregationen von Limoniidae-Larven unter flach angehäuften faulendem Grasschnitt beobachtet werden.

Dr. Ernst-Gerhard BURMEISTER
Graf Toerring Str. 8 a, 8031 Gernlinden

Tagung

Entomologen-Tagung der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie vom 30. September bis 4. Oktober 1987 in Heidelberg. Tagungsort: Universität Heidelberg, Fakultät für Biologie, Im Neuenheimer Feld 504, D-6900 Heidelberg. Auskünfte erteilt: Dr. S. HASSAN, Institut für Schädlingsbekämpfung der BBA, Heinrichstr. 243, D-6100 Darmstadt.

Aus der Münchner Entomologischen Gesellschaft

Während des Sommers finden keine Bestimmungsabende „Lepidoptera“ statt.

Der Koleopterologische Arbeitskreis trifft sich am **13. 7.**, **27. 7.**, **10. 8.** und **21. 9.** jeweils um 18 Uhr im Restaurant „Alter Peter“, Buttermelcherstraße 5. Der Termin am **7. 9.** entfällt wegen Betriebsferien.

Herausgeber:

Münchner Entomologische Gesellschaft, Münchhausenstr. 21, D-8000 München 60

Schriftleitung: W. Lorenz/Dr. R. Gerstmeier

Druck: Gebr. Geiselberger, 8262 Altötting

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [036](#)

Autor(en)/Author(s): Anonym

Artikel/Article: [Tagung. 56](#)