

## Literatur

- BILÝ, S. 1989: Krascoviti, Buprestidae, Zoologické Kliče, ACADEMIA, Prag.
- COBOS, A. 1965: Nota preliminar sobre el complejo *Anthaxia funerula* (ILLIG.), y especies afines de la fauna paleártica. – Ann. Soc. Ent. Fr. (N. S.) 1. (I), 117–123.
- — 1986: Fauna Iberica de Coleopteros Buprestidae, Madrid.
- HORION, Ad. 1955: Faunistik der mitteleurop. Käfer, IV. Band 55–56, Tutzing.
- NIEHUIS, M. 1981: *Anthaxia mendizabali* COBOS (Coleoptera, Buprestidae) – ein verkannter Prachtkäfer der mitteleuropäischen Fauna. – Ent. Bl. für Biol. u. Syst. der Käfer 76 (2–2), 163–166, Krefeld.
- — 1988: Die Prachtkäfer (Coleoptera: Buprestidae) in Rheinland-Pfalz. – Mainzer Naturw. Archiv, Beifheft 9, Mainz.
- OBENBERGER, J. 1931: Catalogue raisonné des Buprestides de Bulgarie, 107–108, Prag.
- SCHAEFER, L. 1949: Les buprestides de France, Paris.
- — 1971: Catalogue des Coleopteres Buprestides de France. – Soc. Linn. de Lyon 9, 284, Lyon.

Anschrift des Verfassers:

Peter BRANDL, Spielhahnstr. 11, D-8208 Kolbermoor

## ***Chaetocnema major* JACQ. DUV., 1852 neu für Mitteleuropa**

(Coleoptera: Chrysomelidae)

Von Manfred DÖBERL

In einer Bestimmungssendung von Herrn ROPPEL, Freising, befand sich ein Pärchen von *Chaetocnema major*; Herr ROPPEL hatte die Tiere im Mai 1989 in einem Donau-Auwald bei Wien gefangen. Die Art ist neu für Mitteleuropa. *Chaet. major* gehört zur U-Gattung *Tlanoma*, besitzt also auf dem Vorderkopf zwischen den Fühlerwurzeln einen glatten Längskiel. Sie ist dunkel erzgrün gefärbt und kann von den mitteleuropäischen Arten mit *Chaet. chlorophana* DUFTSCHM., 1825 verwechselt werden. Die folgende Gegenüberstellung soll die Trennung ermöglichen:

<i>Chaet. chlorophana</i>	<i>Chaet. major</i>
Vorderecken des Halsschildes verrundet (Abb. 1)	Vorderecken des Halsschildes scharf-zipflig seitlich vorgezogen (Abb. 2)
Zahn auf dem Rücken der Hinterschienen einfach (Abb. 3)	Zahn auf dem Rücken der Hinterschienen etwa so breit wie der Schienentrüken (Abb. 4)
Aedoeagus (Abb. 5) lang zugespitzt	Aedoeagus ziemlich parallel, an der Spitze halbkreisförmig gerundet und mit vorgezogenem Mittelspitzchen (Abb. 6)
Spermathek (Abb. 7) Kapsel nach hinten gebogen	Spermathek (Abb. 8) Kapsel nach vorne gebogen

Die Art bewohnt ein disjunktes Areal, nämlich den Westen Südfrankreichs, Spanien, Corsica und Marocco; sie fehlt in Italien und in den Adrialändern und ist im Osten von Ungarn bis zur Mandschurei verbreitet.




Abb. 1–8. *Chaetocnema chlorophana*: 1 Vorderecken des Halsschildes; 3 Zahn auf dem Rücken der Hinterschiene; 5 Aedoeagus seitlich und Unterseite; 7 Spermathek  
*Chaetocnema major*: 2 Vorderecken des Halsschildes; 4 Zahn auf dem Rücken der Hinterschiene; 6 Aedoeagus seitlich und Unterseite; 8 Spermathek

Anschrift des Verfassers:  
 Manfred DÖBERL, Seeweg 34, 8423 Abensberg

### Aufruf zur Mitarbeit

Für eine Untersuchung (Lepidoptera) werden von:

- Cosmotriche lunigera lunigera* ESP.
- Cosmotriche lunigera lunigera* ESP. f. *lubolina* ESP.
- Cosmotriche lunigera burmanni* DAN.

Funddaten aus ganz Mitteleuropa gesucht.

Noch dringender wird Zuchtmaterial (Eier o. Raupen) gebraucht.

Ziel der Untersuchung ist die Bestätigung oder Widerlegung der Zwei-Stamm-Theorie.

Ich würde mich freuen, wenn recht viele mich bei meiner Arbeit unterstützen würden.

Dietrich HEIN, Herrenbergerstraße 6, 7045 Nufringen

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [039](#)

Autor(en)/Author(s): Döberl Manfred

Artikel/Article: [Chaetocnema major Jacq. Duv., 1852 neu für Mitteleuropa \(Col. Chrysomelidae\). 94-95](#)