

Bemerkungen zur Synonymisierung von *Echinodera (Ruteria) troodosi* WOLF 2010 (Coleoptera: Curculionidae, Cryptorhynchinae)

Ingo WOLF

Abstract

STÜBEN (2010) published on his homepage „Weevil News“ *Echinodera (Ruteria) cyprica* without taking care of the rules of Art. 8, especially Art. 8.1. and 8.6. of the International Code of Zoological Nomenclature. The work does not contain a statement that copies (in the form in which it is published) have been deposited in at least 5 major publicly accessible libraries which are identified by name in the work itself. This means that the species name does not exist for the purpose of zoological nomenclature (Art. 9.8 of the Code). Independently the author (2010) published *Echinodera (Ruteria) troodosi* in „Acta Coleopterologica“, which was later synonymized by STÜBEN with his one month earlier in electronical form published species. In the present paper this act is rectified and the name *Echinodera (Ruteria) troodosi* WOLF, 2010 **stat. rest.** is given precedence over the invalid *Echinodera (Ruteria) cyprica* STÜBEN, 2010.

STÜBEN (2010) und der Autor (2010) beschrieben unabhängig voneinander dieselbe *Echinodera*-Art aus Zypern. STÜBEN publizierte seine Neubeschreibung als *Echinodera (Ruteria) cyprica* am 1. Juli 2010 als PDF auf der Internetplattform „Weevil News“. Die vom Autor gefundenen Tiere wurden am 1.8.2010 als *Echinodera (Ruteria) troodosi* in der „Acta Coleopterologica“ veröffentlicht.

Die Beschreibung STÜBENS erfüllt nicht die geforderte Form von Art. 8, insbesondere Artikel 8.1. und 8.6. der Internationalen Regeln für die Zoologische Nomenklatur, sie enthält keine Erklärung, wonach Kopien der auf elektronischem Weg verbreiteten Arbeit (in der Form, in der sie veröffentlicht ist) in mindestens 5 öffentlich zugänglichen Bibliotheken deponiert sind. Die Arbeit enthält keinen Hinweis, ob und gegebenenfalls wo Kopien hinterlegt wurden.

Die Beschreibung von *Echinodera (Ruteria) cyprica* STÜBEN ist deshalb als ungültig anzusehen (Art. 9.8 der Internationalen Regeln für die Zoologische Nomenklatur). Der Name ist nicht verfügbar, und *Echinodera (Ruteria) troodosi* WOLF, 2010, veröffentlicht in einer anerkannten wissenschaftlichen Zeitschrift, ist als gültiger Name für das Taxon zu führen.

ASTRIN und STÜBEN (2011) synonymisierten *Echinodera (Ruteria) troodosi* WOLF zu *Echinodera (Ruteria) cyprica* STÜBEN, obwohl der letztgenannte Name in ungültiger Form veröffentlicht worden war. An den Holotypus von *Echinodera (Ruteria) troodosi* WOLF, 2010 brachten ASTRIN & STÜBEN ein rosa Etikett an, das folgenden Text aufweist:

***Exchinodera (Ruteria) cyprica* Stüben 2000 = *E. troodosi* Wolf 2000 syn. nov. vid. Astrin & Stüben 2000**

Sowohl die Benennung der Gattung wie auch die Jahreszahl der Erstbeschreibung sind nicht korrekt. Es ist deshalb *Echinodera (Ruteria) troodosi* WOLF, 2010 **stat. rest.** wieder als der gültige Name zu verwenden.

Des Weiteren wurden folgende Arten lediglich in elektronischer Form veröffentlicht, ohne die nach den oben genannten Artikeln des ICZN Form einzuhalten (Fehlen des Hinweises, in welchen fünf öffentlich zugänglichen Bibliotheken Kopien hinterlegt wurden):

Kyklioacalles alcornocalensis STÜBEN, TORRES & ASTRIN 2011, veröffentlicht in Weevil-News **65**.

Aemoniacalles tabladoensis STÜBEN & ASTRIN 2011, veröffentlicht in Weevil News **68**.

Kyklioacalles igualeja STÜBEN 2012, veröffentlicht in Weevil News **81** und

Calacalles bandamaensis STÜBEN 2012, veröffentlicht in Weevil News **83**.

Diese Namen sind ebenfalls nicht verfügbar und bedürfen einer sachgemäßen Veröffentlichung.

Literatur

- ASTRIN, J. J. & P. E. STÜBEN 2011: Molecular phylogeny of *Echinodera* and *Rutera* (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae) and the parallel speciation of Canary Island weevils along replicate environmental gradients. – *Journal of Invertebrate Systematics* **24** (5) (2010), 434-455.
- ICZN 2000: Internationale Regeln für die Zoologische Nomenklatur. Vierte Auflage. Offizieller Deutscher Text. – *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg (NF)* **34**.
- STÜBEN, P. E. 2010: „Weevil News“ vom 1. Juli 2010 (<http://www.curci.de>), **52: 2** pp., Curculio-Institute: Germany / Mönchengladbach.
- WOLF, I. 2010. Eine neue *Echinodera*-Art von der Insel Zypern. – *Acta Coleopterologica* **26** (2), 15-24.

Anschrift des Verfassers:

Ingo WOLF

Hofhamerstr. 34, D – 83093 Bad Endorf

E-Mail: Mwolf394418017@aol.com, E-Mail: M-und-I.Wolf@t-online.de

Koleopterologische Ergebnisse aus dem Altmühltal (Oberbayern) (Coleoptera)

Jens ESSER & Tobias MAINDA

Während eines Exkursionswochenendes der Entomologischen Gesellschaft „Orion“ Berlin e.V. in das Altmühltal konnten 144 Käferarten nachgewiesen werden. Die Exkursionen führten in der Hauptsache auf den Solnhof Berg bei Mönsheim und das Wellheimer Trockental bei Dollnstein (Fundorte 2 und 3). Die übrigen Fundorte wurden im Nachgang des Wochenendes besucht und erbrachten vergleichsweise wenige Arten. Zwei Arten sind besonders bemerkenswert: *Polydrusus prasinus* (OLIVIER, 1790) und *Brachysomus dispar* PENECKE, 1910.

Methoden

Zum Einsatz kamen die üblichen Methoden resp. Geräte wie Streifsack, Käfersieb und Klopfschirm, daneben Handfänge und Fotobelege. Die Bestimmung erfolgte mithilfe des Standardwerkes „Die Käfer Mitteleuropas“ (DIECKMANN, L. & L. BEHNE 1994). Belege befinden sich in den Sammlungen der Autoren und der Sammlungen GOTTWALD und HEIMANN (Berlin).

Ergebnisse

Während der Exkursionen wurden folgende Gebiete aufgesucht:

- | | |
|--|--|
| 1 - Mönsheim, Haunsdorfer Straße, 01.06.12 (Tab. 2); | 5 - Röglinger Tal, 07.06.12 (Tab. 2); |
| 2 - Mönsheim, Solnhof Berg, 02.06.12 (Tab. 1); | 6 - Mönsheim, Maxberg, 11.06.12 (Tab. 2); |
| 3 - Dollnstein, Wellheimer Trockental, 03.06.12 (Tab. 1); | 7 - Hagenacker, 12.06.12 (Tab. 2); |
| 4 - Gungoldingen Wacholderheide, 06.06.12 (Tab. 2); | 8 - Eßlingen, Zwölf Apostel, 02.06.12 (Tab. 2). |

Die Namen der an den Fundorten 2 und 3 nachgewiesenen Käferarten finden sich in **Tabelle 1**. Hervorzuheben sind *Polydrusus prasinus* (OLIVIER, 1790) und *Brachysomus dispar* PENECKE, 1910 (s. u.). Beide Arten konnten erstmalig in Bayern nachgewiesen werden, *Brachysomus dispar* sogar erstmalig für Deutschland (s. u).

Bemerkenswerte Arten

Polydrusus prasinus (OLIVIER, 1790)

Der Rüsselkäfer *P. prasinus* ist aus Deutschland bislang nur aus Württemberg (coll. ESSER, coll. Museum Stuttgart), dem Rheinland und vom Nordrhein (KOCH 1993) dokumentiert. Der Fund im Altmühltal zeigt eine weiter nach Osten reichende Verbreitung auf.

Funddaten: Mönsheim, Solnhof Berg, 02.06.12, leg. ESSER (1 Ex.), gekeschert auf Trockenrasen am Waldrand.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: [062](#)

Autor(en)/Author(s): Wolf Ingo

Artikel/Article: [Bemerkungen zur Synonymisierung von Echinodera \(Rutera\) troodosi WOLF 2010 \(Coleoptera: Curculionidae, Cryptorhynchinae\) 90-91](#)