

Helleniká pantoía, 4:
Zur Verbreitung von *Pholeoteras zilchi* SUBAI 1993 (Gastropoda: Prosobranchia)
im Louros-Tal (Epirus, Griechenland).

Von ALEXANDER & PETER L. REISCHÜTZ, Horn.

Die Gattung *Pholeoteras* STURANY 1904 wird von BANK & al. 2001 in die Familie Cyclophoridae gestellt und besiedelt unterirdische Lebensräume von Süddalmatien bis in den Epirus. *Pholeoteras zilchi* SUBAI 1993 ist bisher nur vom Locus typicus - Louros-Durchbruch (= 42 km nördl. Arta) neben der Brücke über den Lourosfluß, Schlucht Nordhang, am Fuße der Kalkfelsen, in ausgespültem Höhlenlehm – bekannt. Bei der Untersuchung einer wenige Kilometer südlicher liegenden Höhle (bei Straßenkilometer 53) konnten einige Leergehäuse der Art gefunden werden. Sie lebt dort gemeinsam mit einer *Gyalina*-Art und sehr großen *Limax graecus* SIMROTH 1889.

Literatur:

- BANK R. A., P. BOUCHET, G. FALKNER, E. GITTENBERGER, B. HAUSDORF, T. VON PROSCHWITZ & T. E. J. RIPKEN (2001): Supraspecific classification of European non-marine Mollusca (CLECOM Sections I + II).- *Heldia* 4(1/2):77-128, München.
- SUBAI P. (1993): Neue Arten seltener Landschnecken aus Griechenland und aus der Türkei.- *Arch. Moll.* 122:63-69, Frankfurt/Main.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Ersten Malakologischen Gesellschaft Vorarlbergs](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Reischütz Peter L., Reischütz Alexander

Artikel/Article: [Helleniká pantoía, 4: Zur Verbreitung von Pholeoteras zilchi SUBAI 1993 \(Gastropoda: Prosobranchia\) im Louros-Tal \(Epirus, Griechenland\). 10](#)