

Helleniká pantoía, 7:
Hauffenia edlingeri nov. spec. (Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobiidae)
 aus Arkadien (Peloponnes, Griechenland).-

Von ALEXANDER & PETER L. REISCHÜTZ, Horn.

Während eines Kurzaufenthaltes auf der Peloponnes im August 2003 konnten auch einige Quellen untersucht und Quellschnecken gesammelt werden, von denen sich eine als neu erwies.

***Hauffenia edlingeri* nov. spec.**

Diagnose

Die Art unterscheidet sich von den anderen Arten Griechenlands durch das flache, planorboide Gehäuse. Die Zuweisung zur Gattung *Hauffenia* ist provisorisch, da nur Leerschalen gefunden wurden und lebende Tiere kaum zu erwarten sind.

Beschreibung

Schale planorboid, glasartig durchsichtig, dünn mit 2,5 bis 3 rasch zunehmenden Umgängen, glänzend mit sehr feinen Zuwachslinien. Der letzte Umgang mehr als doppelt so breit wie der vorletzte. D 1,8 mm, d 1,5 mm, H 0,8 mm. Mündung kreisrund, scharfrandig, 0,8 mm, häufig etwas losgelöst. Der Protokonch meist knaufartig abgesetzt.

Locus typicus

Große Quelle in Panagitsa bei Levidi, August 2003 und Juli 2004, A. & P. L. Reischütz leg., Holotypus hinterlegt im Naturhistorischen Museum in Wien, Molluskenabteilung Nr. 102.895. Paratypen in der Sammlung Reischütz.

Die Art ist dem Malakologen Dr. Karl Edlinger (Wien) gewidmet, der auch die Fotos gemacht hat.

Die Art ist bisher nur aus der zitierten Quelle bekannt. In der gleichen Quelle lebt auch noch eine zweite Art der Gattung *Hauffenia* (*H. hellenica* WESTERLUND), deren Locus typicus 15 km weiter südwestlich liegt (Vitina) und die eine weitere Verbreitung auf der Peloponnes hat. Aus Griechenland sind bisher keine Hydrobiiden mit planorboiden Gehäusen bekannt (vergl. BODON & al. 2001).

Weitere Arten, die in der Quelle gefunden wurden:

<i>Viviparus</i> sp. (fragm., juv.)
<i>Bythinia graeca</i> (WESTERLUND 1879)
<i>Hauffenia hellenica</i> (WESTERLUND 1898)
<i>Belgrandiella semimula</i> (FRAUENFELD 1863)
<i>Galba truncatula</i> (O. F. MÜLLER 1774)
<i>Radix balthica</i> (LINNE 1758)
<i>Planorbis atticus</i> (BOURGUIGNAT 1852)
<i>Ancylus fluviatilis</i> O. F. MÜLLER 1774
<i>Euglesa casertana</i> (POLI 1791)

Literatur:

BODON M., G. MANGANELLI & F. GIUSTI (2001): A survey of the European valvatiform hydrobiid genera, with special reference to *Hauffenia* POLLONERA, 1898 (Gastropoda: Hydrobiidae). - Malacologia 43(1/2):103-215.

Adresse der Autoren: Alexander und Peter L. Reischütz, Puechhaimg. 52, A-3580 Horn, Austria.




Abb. a,b,c: *Hauffenia edlingeri* nov. spec., Paratypus.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Ersten Malakologischen Gesellschaft Vorarlbergs](#)

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Reischütz Peter L., Reischütz Alexander

Artikel/Article: [Helleniká pantoía, 7: Hauffenia edlingeri nov. Sepc. \(Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobiidae\) aus Arkadien \(Peloponnes, Griechenland\). 1-2](#)