©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

Nachrichtenblatt der Ersten Vorarlberger Malakologischen Gesellschaft	15	45 - 46	Rankweil, Januar 2008

Pomatias canariensis (ORBIGNY 1840) (Gastropoda: Prosobranchia: Pomatiidae) auf der Insel Gomera (Kanarische Inseln, Spanien).

Von WOLFGANG FISCHER (Wien) & ANDRAS HUNYADI (Budapest).

Zusammenfassung
Pomatias canariensis (ORBIGNY 1840) wird erstmals von Gomera (Kanarische Inseln, Spanien) gemeldet.

Summary
Pomatias canariensis (ORBIGNY 1840) was only known from Tenerife and Gran Canaria, Canary Islands, Spain. A new location for this species from Gomera is documented.

Im März 2003 wurden von A. HUNYADI lebende *Pomatias canariensis* (ORBIGNY 1840) (Abb. 1) bei La Carbonera in einem Misch-Lorbeerwald auf der Insel Gomera entdeckt. Die Tiere fanden sich unter verotteten Blättern. Der Fundort befindet sich in der Nähe der ersten Bushaltestelle (nach dem Tunnel) an der Straße von San Sebastian nach Hermigua.

Weiters werden am selben Fundort *Napaeus* cf. *bertheloti* (L. PFEIFFER 1846), *Gibbulinella dealbata* (WEBB & BERHELOT 1833), *Retinella* (*Lyrodiscus*) cf. *rochebruni* (MABILLE 1882) und Fragmente (*Canariella* sp., *Plutonia* sp., *Hemicycla* sp.) beobachtet. Diese Schneckenfauna dürfte durch Kleinnager gefährdet sein, da die meisten Gehäuse Bissspuren aufwiesen. In näherer Umgebung wurden auch überfahrene Ratten gesehen.



Abb.: *Pomatias canariensis* (von links nach rechts, h= 16,2mm, 13,8mm, 15,1mm, 13,8mm) von der ersten Bushaltestelle (nach dem Tunnel) an der Straße von San Sebastian nach Hermigua.

Den Autoren sind keine publizierten Meldungen über ein Vorkommen der Gattung *Pomatias* auf der Insel Gomera bekannt. Nach BANK et al. 2003 kommt diese Art nur auf Teneriffa und Gran Canaria vor.

FISCHER 2003 entdeckte auf der Insel Fuerteventura erstmals *Pomatias* cf. *lanzarotensis* (WOLLASTON 1878) und publizierte vier Fundorte. Dort konnten keine lebenden Tiere

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

nachgewiesen werden. Die Gattung *Pomatias* dürfte auf den Kanarischen Inseln viel weiter verbreitet sein, als heute bekannt ist.

Literatur

FISCHER W. (2003): Über die Verbreitung von *Pomatias* cf. *lanzarotensis* (WOLLASTON 1878) auf Fuerteventura (Kanaren, Spanien).- Club Conchylia Inf. 34(5/6):45, Ludwigsburg.

BANK R. A., K. GROH & T. E. J. RIPKEN (2003): Catalogue and bibliography of the non-marine Mollusca of Macronesia. In, M. FALKNER, K. GROH & M. C. D. SPEIGHT, Collectanea Malacologica, p. 89-235, Conchbooks: Hackenheim.

Adresse der Autoren

Wolfgang Fischer, Martnigasse 26, A-1220 Wien, Österreich.
e-mail: wolfgang.fischer@boku.ac.at
Andras Hunyadi, Adria setany 10/G II/5, 1148 Budapest, Ungarn.
e-mail: hunand@freemail.hu

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichtenblatt der Ersten Malakologischen Gesellschaft Vorarlbergs

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: 15

Autor(en)/Author(s): Fischer Wolfgang, Hunyadi Andras

Artikel/Article: Pomatias canariensis (ORBIGNY 1840) (Gastropoda: Prosobranchia: Pomatiidae) auf der Insel Gomera (Kanarische Inseln, Spanien). 45-46