

NACHRICHTENBLATT

der

OBERLAUSITZER INSEKTENFREUNDE

IV. Jahrgang

Nr. 5

Mai 1960

Die Bockkäfer (Cerambycidae) der Oberlausitz

Von K.H.C. Jordan

Wie in dieser Zeitschrift erst kürzlich betont wurde (H. HÖREGOTT), fehlt ein faunistisches Verzeichnis der Oberlausitzer Käfer. Zwar sind einige Sammlungen vorhanden, so die von Herbert SCHMIDT (jetzt im Staatlichen Museum für Tierkunde in Dresden) und von Johannes LEHMANN (jetzt im Stadtmuseum Bautz.), aber beide Entomologen sind verstorben, so dass aus ihrer Feder leider keine Arbeit zu erwarten ist. Besonders zu H. SCHMIDT hatte ich enge Beziehungen. Er bekam regelmässig meine Käferausbeuten, auch führte uns manche Exkursion zusammen. Ich glaube mich daher berechtigt, über einige Käfergruppen Verzeichnisse herauszugeben, da in dem gründlichen Kataloge von SCHMIDT meine Funde namentlich aufgeführt sind. Mit diesen Listen möchte ich zugleich auch einen Dank und eine Ehrung für diesen so jung verstorbenen Koleopterologen aussprechen. Dem Staatlichen Museum für Tierkunde in Dresden (Dr. HÄRTEL) sei gedankt für das Leihen des SCHMIDTschen Kataloges, ebenso wie dem Stadtmuseum Bautzen (R. GRAUL und W. ZIMMER) für die Einsicht in die LEHMANNschen Verzeichnisse und Sammlungen.

Dass ich mit den Cerambyciden beginne, hat seinen

Grund darin, daß von den 68 Bockkäferarten der Oberlausitz 50 von mir gefunden wurden, darunter 11 Arten, die bisher kein anderer Sammler festgestellt hat.

In folgendem Verzeichnis sind für die Sammler folg. Abkürzung. gebraucht: Schm. = Herbert SCHMIDT - Gersdorf b. Kamenz; L. = Johannes LEHMANN - Guttau; F. = Gustav FEURICH - Göda; St. = Hermann STARKE - Bautzen; R. = Dr. Karl RICHTER - Bautzen; Schl. = Arthur SCHLECHTER - Kamenz. Keiner dieser Entomologen ist noch am Leben. Wo Funde keine Vermerke tragen, sind sie von mir gesammelt worden. Belegstücke sind im Zool. Institut der TH Dresden.

Tribus Prionini

1. Prionus coriarius L.

Lückendorf 4.8.11 (F.), Bubenick 30.8.32 (F.), Lömischau 8.5.51 (Höregott), Guttau Aug.38 (L.)
Im Heidegebiet eine Seltenheit.

2. Ergates faber L.

In den Wäldern um Lömischau und Halbendorf alljährlich an Kiefernstubben zu finden, einmal ein Pärchen auch an Pappel in Lömischau; ferner Cunnersdorf b. Kamenz April 34 (Sch.), Bischheim 6.8.38 (Schm.), Kamenz 28.8.42 (Schm.), Guttau 13.8.42 (L.), Kl.-Saubernitz (L.)

Tribus Lepturini

3. Harpium mordax Deg.

Löbau 20.5.09 (F.), Czorneboh 13.5.11 (F.), 23.2.43 (St.), Drohberg 1912 (F.), Bautzen 10.6.36 (St.), Kl.-Saubernitz 8.6.40, Kleinbautzen 10.5.38, Coblenz b. Göda 11.6.39, Lömischau 9.5.59 (mehrfach), Guttau 22.5.46 (L.)

4. Harpium inquisitor L.
Hochstein 12.5.09 (F.), Mehlteurer Berg 16.412, (F.), Czorneboh 1.10.06 (F.), Zittau und Lausche 1.5.13 (Riedel), Lömischau Juni 54.
5. Rhagium bifasciatum F.
Hochstein 12. 5. 07 (F.), Göda 23. 4. 93 (F.) , Wuischke 25.5.14 (F.), Gersdorf 22.4.34 (Schm.), Deutschbaselitz Juni 32 (Schl.), Neudorf/Spree 10.5.36, Neu-Schmerlitz 4.6.39, Lömischau 27. 5. 47, 19.10.54, Förstchen (L.)
6. Rhagium sycophanta Schr.
Umgebung von Löbau (Dr. NOESSKE)
7. Toxotus (Oxymirus) cursor L.
Czorneboh 12.6.09 und 25.5.15 (F.), Klosterberg 3.6.33 (GRUNERT)
8. Stenocorus meridianus L.
Gröditz im Juni (L.)
9. Gaurodes virginea L.
Bautzen 17.6.21 (St.)
10. Acmaeops marginata F.
Lömischau 5.5.48, Halbendorf/Spree 18.5.48. Dieses Tier mit ganz schwarzen Flügeldecken. Eine in Deutschland seltene Art, die auf Kiefer lebt.
11. Allosterna tabacicolor Deg.
Göda 12.6.01 (F.), Gersdorf 18.6.26, 25.6.26, 29. 5.32, 5.5.34, 9.6.39, 24.6.41 (Schm.), Ostro 4.38, Kuckau 9.6.38, Nedaschütz 12.6.38, Halbendorf/Spree 25.5.59, Guttau 19.6.42 (L.)
12. Gramoptera ruficornis F.
Möhrsdorf 4.6.44 (Schm.), Kleinsaubernitz 8.6.40, Lömischau 23.5.48, Kuckau 9.6.38, Jauer 12.6.43, Coblenz b. Göda 11.6.39, Guttau 19.6.42 (L.)
13. Leptura rufipes Schall.
Löbauer Berg 7.2.38 (Dr. NOESSKE)

Hennersdorf b. Kamenz 10.7.32, Gersdorf 8.7.32, 17.6.34, 7.7.42, Bischheim 13.7.38, 5.7.42 (an allen genannten Fundorten von Schm.), Merzdorf 10.7.43, Lömischau 7.8.45, 18.6.59, Guttau 6.6.40 (L.)

15. Leptura rubra L.

Überall häufig an Kiefernstubben. Fundorte von Lömischau, Halbendorf, Kamenz, Bischheim, Gersdorf.

a. maculipes Gabr.

Lohsa, Valtenberg, Gersdorf.
Alle Funde im Juli und August.

16. Leptura dubia Scop.

Dieses Gebirgstier ist nur von Guttau Juni 26 (L.) bekannt.

17. Judolia (Leptura) cerambyciformis Schr.

Neißeal 28.7.38 (Schl.), Kl.-Saubernitz 8.6.40, Halbendorf/Spree 13.7.46, Lömischau 11.7.49, Gröditz 22.6.35

a. decempunctata Oliv.

Coblenz b.Göda 12.6.38, Neißeal 28.7.38 (Schl.)
Kl.-Saubernitz 8.6.40, Guttau 25.6.38 und 23.6.44 (L.)

18. Leptura sanguinolenta L.

Keulenberg 28.7.16 (RIOTTE).

19. Strangalia aethiops Poda

Bautzen 21.5.26, 17.6.21 (F.), Guttau 25.5.42, 25.5.47, Lömischau 1.6.47, 5.6.49, Quoos 4.7.39

a. letzneri Gab.

Lömischau 1.6.47, 25.5.48, Nedaschütz 24.5.34, Guttau Juni 38 und 44 (L.)

20. Strangalia quadrifasciata L. unter www.biologiezentrum.at
Czorneboh 1911 (F.), Blösa 24.6.16 (F.), Muskau
28.6.34, Friedersdorf b.Lohsa 8.7.37, Guttau lo.
7.17, 21.7.40, 22.7.40 (L.)

a. interrupta Heyd.
Guttau 7.8.41 (L.)

21. Strangalia maculata Poda
Czorneboh 1912 (F.), Halbendorf/Spree 13.7.46
Lömischau 1.6.47, Neißetal Aug. 43, Guttau Juni
37 (L.)

a. sinuata F.
Guttau Juni 37 (L.)

22. Strangalia arcuata Panz.
Halbendorf/Spree 13.7.46, eine seltenere Art.

23. Strangalia revestita L.
Belgern 31.5.35 (DETZNER). Seltenheit.

24. Strangalia melanura L.
Czorneboh 22.6.12 (F.), Gersdorf 25.6.31 (Schm)
Wohla 5.7.26 (Schm.), Reichenau, Bischheim 13.
7.38 (Schm.), Gröditz 22.6.35, Neißetal Aug.43,
Valtenberg 28.7.41, Lausche 11.8.42, Guttau (L)
5 Funde.

25. Strangalia bifasciata Müll.
Baruther Berg 17.7.16 (F.), Niedergurig 31.7.38

26. Typocerus attenuata L.
Weißkolm 11.7.42, Guttau Juni 40-43 (L.)

a. lividipes Hänel
i. lit. Guttau 14.7.43 (L.)

Tribus Cerambycini

27. Molorchus (Caenoptera) minor L.
Göda 16.6.09, 27.5.19, 19.5.36 (F.) Bautzen lo.

6.38, Gersdorf Mai 31, 38, 42, 44, 46, 48 u. Juni 43, April 45 (alle von Schm. gesammelt). Guttau und Dauban 22.5.40 (L.)

28. Caenoptera umbellatorum Schreib.

Nur einmal von mir in Lömischau im Aug. 54 gefunden.

29. Obrium brunneum F.

Göda 16.6.09, Gersdorf 15.6.47, Coblenz b. Göda 12.6.38, Wiesa 2.6.36 (alle von Schm. gefunden).

30. Gracilia minuta F.

Bautzen 30.6.21 (St.), 15.6.37, Guttau 8.6.46, Schiedel b. Kamenz 21.6.31 (Schm.), Kamenz 4.9.36 (ZIMMER), Gersdorf 15.7.33, 10.7.35, 6.6.37, 10.7.42 (Schm.)

31. Aromia moschata L.

Bautzen (St.) ohne nähere Angabe. Häslich b. Kamenz 4.7.30, 6.8.30 (RICKSCHER), Gersdorf 28.7.48 (CHRISTOPH).

a. cuprata Reitt.

Häslich b. Kamenz 6. 7. 32 (RICKSCHER).

a. laevicollis Reitt.

Großpostwitz 2.7.34, Bautzen August 26 (L.)

32. Rhopalobus femoratus L.

Guttau Juni 36, 10.8.42 (L.). Eine seltene Art.

33. Callidium aeneum Deg.

Göda 10. 5. 11 (F.)

34. Callidium violaceum L.

Göda 1.6.11 (F.), Bautzen 12.5.36 (St.), 12.6.47, Quoos April 41, Guttau 8.6.44 (L.), Gersdorf 6. 6.33, 4.6.42, 5.6.42, 23.6.42, 22.7.43, 21.5.44, 5.6.44, 18.7.44, 13.6.45, 28.5.47 (alle Funde v. Schm.).

35. Phymatodes testaceus L.

Göda 12. 7. 22 und 19. 6. 36 (F.)

Göda 4.6.02 (F.), Guttau (L.)

a. praeusta F.

Guttau im Juni (L.)

36. Hylotrupes bajulus L.

Gersdorf 7 Funde von 1930-1939 durch Schm., Kamenz 12.7.32 (ZIMMER), Bischheim 12.6.36 (NEUBERT), Häslich b.Kamenz (NEUBERT), Guttau Juni 39, 10.8.44 (L), Von mir in Neu-Lömischau oft in einem alten Haus gefunden, einmal eine Imago, wie sie sich gerade aus einem Brunnenständer herausbohrte.

37. Saphanus piceus Laich.

Diese Seltenheit wurde nur einmal von Dr. RICHTER im Juli 1911 am Czorneboh gefangen.

38. Spondylis buprestoides L.

Von Juni bis September um Lömischau und Halben-
dorf sehr häufig, fliegt am Tage, vor allem aber
in der Dämmerung viel umher. Weitere Funde be-
kammt aus Gersdorf, Großröhrsdorf, Kamenz und
Häslich.

39. Tetropium castaneum L.

Göda 1.6.05, 24.5.14 (F.), Gelenau 14. 6. 30
(Schm.), Luchsenburg 14.6.36 (Schm.)

a. luridum L.

Luchsenburg 14.6.36 (Schm.)

a. fulcratum F.

Luchsenburg, Gelenau 8.6.30, Gersdorf 8.5.48,
(alle von Schm.)

a. aulicum F.

Gersdorf 21.6.42, Luchsenburg 14.6.36 (Schm.)
Guttau (L.)

40. Tetropium fuscum F.
Göda 21.6.39 (F.), Czarneboh 8.5.46 (St.). Ist überall in Deutschland seltener als vorige Art.
41. Tetropium gabrieli Weise
Neschwitz 1937 (Schm.) (s. Ent. Blätter 1938).
42. Asemum striatum L.
Czarneboh 30.5.10 (F.), Gersdorf 9.6.28 (Schm.), Lückendorf b. Kamenz 17.5.46 (WEHNER), Lömischau 18.5.47, Guttau 21.6.39, 17.5.46 (L.)
43. Criocephalus rusticus L.
Bautzen 12.7.14, 3.7.15 (F.), Lömischau 3.8. 48 und 27.7.55, Guttau im Juni (L.)
44. Criocephalus ferus Muls. (polonicus Motsch.)
Diese als selten geltende Art ist um Lömischau außerordentlich häufig und kommt abends viel ans Licht geflogen. Fund-Monate von April bis Ende August. Gefunden ferner in Gersdorf, Bernbruch, Bautzen, Lohsa, Neida.
45. Clytus lama Muls.
Rachlau 10.6.00 (SCHÜTZE), ebenda 11.7.08 (F.), Von mir am 22.6.34 in Lohsa gefangen. Diese Seltenheit gilt als Gebirgstier, deshalb ist der Lohsaer Fund bemerkenswert.
46. Plagionotus arcuatus L.
Göda 2.7.01 (F.), ebenso 19.6.36. Rachlau 9.6. 36 (St.), Gersdorf 10.6.47, 30.5.48 (Schm.) , Guttau 24.6.38 (L.)
- a. reichei Thms.
Göda 12.6.07 (f.), Coblenz b. Göda 11. 4. 39 (Schm.), Gersdorf 14.5.48 (Schm.)
47. Anaclyptus mysticus L.
Rachlau 21.5.07 (F.), Bautzen 22.5.35 (St.), Schwedenstein 7.6.42 (Schm.), Guttau 25.5.38 (L.)

Lömischau 22.5.54, Guttau 20.6.40 (L.)

Tribus Lamiini

48. Monochamus sutor L.

Bautzen 16.7.47

49. Monochamus galloprovincialis Oliv.

Diese Seltenheit wurde in einem Exemplar von mir bei Lömischau am 24.7.50 an einem Kiefernholz - stapel gefangen.

50. Acanthocinus aedilis L.

Um Halbendorf und Lömischau häufig, kommt in der Dämmerung auch ans Licht geflogen. Weitere Funde aus Gersdorf, Deutschbaselitz, Oberlichtenau, Wiesa, Kamenz, Guttau und Dauban. Fundzeiten von April bis August.

51. Leiopus nebulosus L.

Rachlau 8.7.18 (SCHÜTZE), Rothstein 27.7.30 (St), Höflein 26.6.35 (Schm.), Spreewiese 2.6.43, Halbendorf 1.8.48, Guttau 23.6.41 (L.).

52. Exocentrus lusitanus L.

Göda 5.8.04 (F.), Dreistern b.Bautzen 31. 7.35, Halbendorf 13.7.46.

53. Pogonochaerus hispidulus Piller

Lömischau 9.5.59 (Seltenheit)

54. Pogonochaerus hispidus L.

Göda 8.3.19 (F.), Bautzen 28.7.32 (St.), Bautzen 6.7.37

55. Pogonochaerus decoratus Fairm.

Baruth 20.8.34, Rachlau 28.10.42 (St.). Gilt allgemein als selten.

56. Pogonochaerus fasciculatus Deg.

Göda 12.8.10 (F.), Bautzen 8.10.20 (St.), Neida

2.10.30, 9.8.36, Lömischau 12.6.50, Brehmen 16.
10.40, Dahren 13.9.36 (KOCKSCH), Gersdorf 21.6.
33, 6.9.44 (Schm.), Bischheim 11.10.40 (Schm.)
Dieses als seltener geltende Tier ist bei uns
relativ häufig.

57. Anaesthetis testacea F.

Nur einmal von mir in Niedergurig am 23.6. 43
gefangen.

58. Saperda populnea L.

Kleinsaubernitz 8.6.40, Quoos 20.5.34, Gersdorf
2.6.32, Wohla 11.6.32, Elstra 9.5.34 (alle drei
Funde von Schm.), Guttau Juni 38, Dauban 13. 6.
44, 3.7.44 (L.)

59. Saperda carcharias L.

Löbauer Berg (ohne jede weitere Angabe), Häslich
b. Kamenz 9.9.33 (JOHNE), Deutschbaselitz 2. 7.
33 (Schl.).

60. Saperda scalaris L.

Gersdorf 26.5.37 (PRESCHER), Guttau 20. 6.40,
27.5.44 (L.), Lömischau 11.6.50

61. Menesia bipunctata Zoubk.

Kleinsaubernitz 8.6.40, Caßlau 30.6.58, Halben-
dorf/Spree 25.6.58

Tribus Agapanthiini

62. Agapanthia villosoviridescens Deg.

Czorneboh 20.6.14 (F.), Bautzen 17.6.21 (St.)
Burg Rohnau 14.7.40 (Schl.), Jauer 12. 6. 43
(Schm.), Guttau 15.8.41, 28.7.41, 23.6.44 (L.).

Tribus Phytoecini

63. Tetrops praeusta L.

Göda 20.5.08, 5.5.43 (F.), Gersdorf 13. 6. 36,
25.5.40, 6.5.46 (Schm.), Bischheim 26.5.36, 10.

6.43 (Schm.), Möhrsdorf 4.6.44 (Schm.) Von mir in Lömischau von 40 - 43 fünfmal gefangen, ferner in Mönau 14.8.33, Kreba 28.7.38, Caßlau 30.6.43

64. Stenostola ferrea Schrk.

Göda 11.5.02, 15.3.11, 29.5.38 (F.), Bautzen Mai 35 (St.), Nedaschütz 24.5.34, Guttau 9. 6. 44, 25.5.46 (L.)

65. Stenostola nigripes Gyll.

Dreistern b.Bautzen, 7.6.33, Kleinwelka 30.6.46. Gilt wie vorige Art als Seltenheit

66. Phytoecia nigricornis F.

Rachlau Juni 11 (R.)

a. solidaginis Bach.

Löbau Juni 39 (MUCHE), Niedergurig 14.7.39

67. Oberea linearis L. a. parallela Scop.

Lömischau 20.6.48, 6.7.54

68. Oberea oculata L.

Rachlau 8.5.02, 8.6.02 (F.), Mehlteuer Berg 18. 8.12 (F.), Bischheim 13.7.38 (Schm.), Guttau 9. 6.44, 25.5.46 (L.), Nedaschütz 19.7.35, Kreba 29.7.38, Guttau 14.7.54.

Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. K.H.C. JORDAN, Bautzen, Leibnizstraße 4

K ö d e r w i n k e

Von E. Urbahn

In Nr.1 (1960) des "Nachrichtenblattes der Oberlausitzer Insektenfreunde" hat Herr Max GÜNTHER, Niederoderwitz, über den Köderfang berichtet. Aus seinen Worten spricht überall der alterfahrene Praktiker, und es war mir eine Freude, wenn hier einmal wieder daran erinnert wurde, daß man neben dem heu-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde](#)

Jahr/Year: 1960

Band/Volume: [4_5](#)

Autor(en)/Author(s): Jordan Karl Hermann Christian

Artikel/Article: [Die Bockkäfer \(Cerambycidae\) der Oberlausitz 49-59](#)