

Tauschverein.

Auf mehrfaches Gesuch um Angabe des Vorraths gewisser Genera erfolgen heute 2 derselben; die mit * versehenen sind nur schwach vertreten; von diesen und allen nicht angeführten Species übernimmt der Tauschverein von 10 bis 50 Stück im Tausch oder gegen baar, und ersucht um Listen.

T a u s c h - C a t a l o g

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

NB. A. bedeutet Anglia; Ge. = Germania; Ga. = Gallia; It. = Italia; Ir. = Irlandia; Tr. = Transsylvania; B. = Bavaria; C. = Carinthia; D. = Dalmatia.
(Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.)

	Mk.		Mk.
<i>Pupa.</i>		<i>pusilla</i> , Müll.	Ge. A. 0,5
<i>amicta</i> , Parr. It. septentr.	0,15	* <i>pyrenearia</i> , Boubée	Ga. mer. 0,15
<i>angustior</i> , Jeffr. "	0,10	<i>pygmaea</i> , Drp.	Ge. Tr. 0,5
<i>antivertigo</i> , Drp. A. Ir. Ge.	0,10	<i>quinquedentata</i> , Born.	Pisa 0,15
<i>avenacea</i> , " Ge. merid. It.	0,10	<i>Ressmanni</i> , Villa	C. 0,15
— var. <i>transiens ad mega-</i>		* <i>ringens</i> , Mich.	Ga. merid. 0,30
<i>chilon</i> Tirol	0,20	<i>secale</i> , Drp.	A. u. Ge. merid. 0,10
<i>bergamensis</i> , Charp. It. sept.	0,10	* <i>Sterrii</i> , Voith	B. 0,15
* <i>Boileausiana</i> , " Gemerid.	0,40	<i>Strobili</i> Gred.	Tirol 0,10
<i>cinerea</i> , Drp. It. u. do.	0,15	<i>triplicata</i> , Stud.	" 0,20
<i>claustralis</i> , Gred.	Tirol 0,30	<i>truncatella</i> , Pfr.	C. 0,10
* <i>costulata</i> Nils. Ge. Schwed.	0,30	<i>umbilicata</i> , Drp.	A. Dr. 0,10
* <i>dilucida</i> , Zgl. It. septen	0,20	<i>variabilis</i> , Drp.	Gallia mer. 0,15
<i>doliolum</i> , Brug. Ge. u. Tirol	0,10	<i>ventrosa</i> , Heynem. Frkft a. M.	0,20
<i>dolium</i> , Drp.	C. 0,20	* <i>Klunzingeri</i> , Jick. Abyssinia	0,50
<i>edentula</i> , " A. Ga.	0,5	<i>Reinhardtii</i> , " "	0,40
<i>Ferrari</i> , Porro, It. septen.	0,20	* <i>bisulcata</i> , " "	0,50
<i>frumentum</i> , Drp.	Ge. 0,10	<i>lardea</i> , " "	0,40
— v. <i>elongata</i> , Rssm. Tirol	0,15	<i>fontana</i> Krauss	" 0,40
— v. <i>illyrica</i> , " "	0,15	<i>Clausilia.</i>	
<i>Kokeilii</i> , Rssm.	C. 0,50	<i>agnata</i> , Partsch, D. u. Croatia	0,25
<i>megachilos</i> , Jan.	Tirol 0,15	<i>almissana</i> , Küst.	D. 0,25
*—v. <i>bigorriensis</i> , Charp. Ga.	0,15	<i>asphaltina</i> , Zgl.	C. 0,20
<i>minutissima</i> , Hartm.	Tirol 0,20	<i>Bergeri</i> , Meyer	C. 0,25
<i>muscorum</i> , L.	Ge. It. 0,5	<i>Bielzi</i> , Parr.	Tr. 0,20
* <i>Mühlfeldi</i> , Küst.	D. 0,25	<i>bilabrata</i> , Edg. Smith Japan	1
<i>Philippii</i> , Cantr.	Athen 0,15	<i>biplicata</i> , Montg.	Ge. A. 0,10

	Mk.		Mk.
biplicata v. bohémica, Cls. Bh.	0,25	itala v. pura, Tirol.	0,25
bogatensis, Bielz Tr.	0,20	japonica, Crosse var. nip-	
*Boissieri, Charp. Syria	0,35	ponensis, Kob. Japan	2
cana, Held Tr.	0,10	*Kephissiae, Roth Parnass	0,40
— v. farta, A. Schm. Tr.	0,15	laminata, Montg. Tr.	0,10
— v. transylvanica Blz. „	0,15	— v. alpestris, Blz. Tr.	0,20
— v. iostoma, A. Schm. „	0,20	*latestriata, Blz. „	0,25
canescens, Parr. „	0,20	leucostigma, Zgl. It.	0,20
— v. glabrata, Blz. „	0,25	v. candilabris, Porro. It.	0,20
cineta, Bruma. C.	0,20	— v. opalina Zgl. „	0,20
concilians, A. Schm. Tr.	0,20	lincolata, Held Ge.	0,25
*cruciata, Stud. B.	0,30	Lischkeana, Parr. Tr.	0,25
— minor, Silesia	0,25	— v. livens, Blz. „	0,30
dacia, Friv. Bosnia	0,20	macarana, Zgl. D.	0,20
*dalmatina, Partsch. D.	0,25	*madensis, Fuss Tr.	0,30
*decipiens, Zel. (Rssm.) It.	0,30	maesta, Fér. Palestina.	0,35
dubia Drp. Tr.	0,20	*mamertina, Gulia. Gozzo.	9
elata, Ziegler „	0,20	marginata, Zgl. Tr.	0,20
— v. major, Blz. „	0,25	Marisii, A. Schm. „	0,20
elegans, Blz. „	0,25	*Menelaos, Sparta	0,35
*— v. cerasina, Blz. „	0,30	*Meschendorferi, Blz. Tr.	0,35
exarata, Zgl. D.	0,20	montana, Stenz „	0,25
fallax, Rssm. Tr.	0,20	*nigricans, Pult. A. u. Ge.	0,20
filograna, Zgl. „	0,25	*olympica, Friv. Olymp	0,30
fimbriata, Mühlf. C.	0,25	ornata, Zgl. Styria, Croatia	0,20
formosa, Zgl. D.	0,25	Orsiniana, Villa, It.	0,40
fusca, de Betta It. septentr.	0,20	orthostoma, Mnke. Tr.	0,20
Fussiana, Blz. Tr.	0,20	*pachychila, Pfr. D.	0,35
— v. grandis, Blz. „	0,25	pagana, Zgl. Tr.	0,20
— v. pruinosa, „ „	0,20	papillaris Mühlf. It.	0,20
*gibbula, Zgl. D.	0,30	parvula, Stud. Ge. u. Norweg.	0,20
gracilis, Rssm. Ge. merid.	0,20	patula, Charp. Attica	0,30
graeca, Pfr. Argos.	0,35	Pfeifferi, Küst. D.	0,25
grisea, Desh. Nauplia.	0,20	piceata, Zgl. var. D.	0,25
incisa, Küster It. septentr.	0,30	platydera, v. Mart. Japan	0,70
interrupta, Zgl. C.	0,20	plicata, Drp. C.	0,20
— v. diaphana, Rssm. C.	0,25	— v. costata, Wallachei	0,35
*istriana F. J. Schm. Istria.	0,25	— v. implicata, Bz. Tr.	0,25
itala v. Mart. It. septentr.	0,20	*plicatula, Drp. Carniola	0,15

		Mk.			Mk.
plumbea, Rssm.	Tr.	0,20	NB. Die früher angezeigte		
— v. cornea, Bz.	Tr.	0,20	Clausilia gulo Rossm. ist nach		
pumila Zgl.	B. Tr.	0,20	Dr. Böttger = turgida, Zgl.		
*punctulata, Küst. Calabria		0,35	<i>Baleo-Clausilia.</i>		
regalis Blz.	Tr.	0,25	Haueri, Blz.	Tr.	0,25
— v. Wallachiensis Bz. Wall.		0,25	glaucia, Blz.	„	0,25
Reiniana, Kob.	Japan	1,50	— v. costata, Blz.	„	0,30
Rolphii, Leach. C. u. 7 Gebirge		0,25	— v. latens, Fér.	„	0,25
Rossmässleri, Pfr.	C.	0,30	— v. minor. Blz.	„	0,20
rugicollis, Zgl.	Tr.	0,25	lactea, Blz.	„	0,30
— v. banatica, Blz. Banat		0,25	— v. glorifica, Parr.	„	0,30
— v. oleata, Rssm.	C.	0,25	livida, Muke.	„	0,20
Schmidtii, Pfr. var. rablensis,			— v. costiculata	„	0,35
Gallenst. C.		0,25	— v. Blz.	„	0,25
*socialis, Friv.	Varna	0,30	<i>Helix.</i>		
solida, Drp. It. sept. Ga. mer.		0,30	acuta, Müll.	It. sept.	0,05
— v. mofellana, Parr.	It.	0,30	ammonis, A. Sch.	„	0,15
Spreati Pini. It. septentr.		0,30	— varietas	„	0,20
Stabilei, Charp.	„	0,35	apennina, Porro Apenn.		0,25
*stabilis, Zgl.	Tr.	0,30	bathyomphala, Chrp. u. v.	„	0,30
Stenzii Rssm.	C. Tr.	0,30	bella, Pfr.	Ind. orient.	1,25
straminicollis Parr.	Tr.	0,20	coelata, Stud.	Ge. mer.	0,25
— v. occidentalis	Tr.	0,25	frigida, v. insubr., Jan. It. spt.		0,25
strigillata, Mühlf.	D.	0,25	frigidissima, Admi. n. sp. It. spt.		0,50
*styriaca, A. Schm.	Styria	0,25	ligata, Müll. var.	„	0,20
sulcosa Zgl.	D.	0,15	nebrodensis, Piraj	„	0,25
tau, Böttger	Japan	0,60	planospira, Lam. v. & v.		
*transsylvanica, Zgl.	Tr.	0,35	etrusca Adami. It. sept.		0,25
tridens, Chm.	Portorico	0,80	profuga A. Schm. v.	„	0,15
tumida, Zgl.	Tr.	0,35	pisana, Müll. var.	„	0,10
turgida, Zgl.	Tr.	0,35	pyramidata, Drp.	„	0,10
ungulata, Zgl.	Carniola	0,25	serpentina, Jan. v.	„	0,20
varians Zgl.	C.	0,25	setipila, Zgl.	„	0,45
ventricosa, Drp.	C.	0,25	strigata, Müll. & v.	„	0,25
*vetusta, Ziegl.,	Carniola	0,30	— v. Molteni, Admi.	„	0,50
*vibex, Rssm. v. obesa, Pfr. D.		0,30	tenuilabris, Braun, Regensbg.		0,50
*Voithii, Rssm.	Grecia	0,35	tigrina, Jan.	Italien	0,25
ossetica, A. Schm. Kaukasus		1,50	Pupina artata, Bens.	Birma	0,50
foreicollis, Parr.	„	1,—	Daudebardia rufa, Stz.	B.	1,20
Dubois, Chrp.	„	0,60	Vitrella acicula, Held.	B.	1,10

	Mk.		Mk.
Vitrella pellucida Crnz. Baden	1,10	Natica melanost. Gmel. Ö.in.	0,40
Planorbis Clss., Wstrl. Galizia	0,50	Litorina undulata, Gray In.or.	0,25
Neritina pelopon. Bck. Euboea	0,15	Thalotia conica Sow. „	0,35
Bithynia Ors., Chrp. Lepante	0,25	Haliotis asinina, L. „	0,60
Anodonta idrina, Spin. It.	0,40	Patella saccharina L. „	0,35
Unio Spinellii, Villa It.	0,40	Solen Deless., Chm. Pto. Cab.	0,45
— marginalis, Lm. Ganges	1.—	Tellina vulsella. Lm. Zebu	0,90
— — var. „ „	1.—	Venus ovum, Hanl. Oc. ind.	0,45
— birmanus, Blf. Birma	1,50	Circe dispar, Ch. „	0,50
Corbicula occiens, Bns. O.ind.	0,35	Cardium austr. Rve. Maurit.	0,40
— striatella, Desh. „	0,35	— areniculum „ „	0,80
Nassa subspinoso, Lm. O.ind.	0,40	— lacunosum „ „	0,40
Eburna spirata, L. „	1.—	— rugosum, Lm. „	0,40.50
Purpura Rudolphi, Lm. „	1,20	— serratum, „ „	0,60
Ricinula horrida, Lm. „	0,75	— muricatum, L. W.-Ind.	0,25
Mitra cinctella „ „	1.—	— magnum, Lm. Ma. rub.	0,25
— amphorella „ „	0,50	Hemicardium card., L. Oc. ind.	1.—
Marg. diaphana, Kn. Ind. occ.	0,20	Cardita bicolor „	1,80
Cassis canaliculata, Gml. O.in.	1.—	Perna costell., Conr. Sandw. I.	1.—

Literaturbericht.

Annuaire Report of the Trustees of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College in Cambridge for 1876.

Dem Bericht über die conchologische Abtheilung entnehmen wir die Notiz, dass die conchologische Sammlung jetzt 11,312 Arten Univalven zählt, eine Zahl, welche von wenig Sammlungen in Europa übertroffen werden mag; die Bivalven sind noch nicht catalogisirt.

Döring, Dr. Ad., Aprintes sobre la Fauna de Moluscos de la Republika Argentina. Tercera Parte. Cordoba 1876.

Als neu beschrieben werden: Patula Strobiliana, Stelzneriana, Eurycampta Hidalgonis, Plagiodontes n. subg. Odostomorum; Brackebuschii, Weyemberghii; Odontostomus Achalanus, Popanus, Aconigastanus, multispiratus, Bergii, salinicola, Chancaninus, Champaquianus, reticulatus, Borus d'Orbigny, Lorentzianus. Die neuen Arten sind vom Autor sämmtlich für die Normalsammlung eingeschickt worden und kommen im nächsten Jahrgange der Jahrbücher zur Abbildung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Tausch-Catalog 12-15](#)