

T a u s c h - C a t a l o g
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.
 (Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.)

	Mk.		Mk.
<i>Helix</i>			
aculeata, Müll., Anglia	0,20	rupestris Drp., Germ., Irl.,	
anconae, Issel, Italia	0,30	u. Transylv.	0,5
bidens, Chm., Germ. etc.	0,20	Schmidtii, Zgl., Carniola	0,30
— v. dibothrion, Fr. Trans.	0,30	solaria, Menke, Carinthia	0,15
caeca, Guppy, Trinidad	0,15	strigella, Drp., Brandenburg	0,15
candidula, Stud., Nassau	0,5	umbrosa, Partsch, Carinthia	0,20
caperata, Mont., Ang. Irl.	0,15	villosa, Drp., Germ. merid.	0,25
— var. ornata, Wales	0,20	virgata, Mont. in var., Wales	0,20
cingulella, Zgl. Hungaria	0,25	Hyalina contracta, Wstrl.,	
concinna, Jeffr., Anglia	0,15	Berlin	0,15
conica, Drp., Italia	0,15	Nanina gularis, Say Tennessee	0,25
costata, Müll., Germania	0,10	<i>Pupa</i>	
costulata, Zgl., Metz u.		gularis, Rssm., Carinthia	0,25
Transsylvaniae	0,20	— var. spoliata, Hungaria	0,25
exigua, Stimp., Maine, V. St.	0,20	obtusa, Drp., Carinthia	0,40
fringilla v. alba Pfr., Austr.	1,20	<i>Clausilia</i>	
fusca, Mont., Angl. u. Irl.	0,75	bidens, L. v. minor, Italia	0,20
hirsuta, Say, Ver. St.	0,20	binotata, Zgl., Dalmatia	0,25
hortensis, Müll. u. var., Germ.	0,10	blanda, " "	0,30
incarnata, Müll., Bavaria	0,25	cattaroensis, Zgl., "	0,30
intermedia, Fér., Carinthia	0,15	conspurcata, Jan., "	0,30
inversicolor, " u. var., Maur.	0,25	dalmatina, Prtsch., "	0,25
lamellata, Jeffr., Irlandia	0,30	decipiens, Rssm., "	0,30
leucozona, Zgl., Carniola	0,25	fontana, Zgl., "	0,30
nemoralis, L. in var., Germ.	0,10	gibbula, " "	0,25
obvoluta, Müll., Germania	0,20	irregularis, Zgl., "	0,30
personata, Lm., "	0,20	laevissima, " "	0,25
Pietruskyana, Parr. Hungaria	0,35	messenica, v. Mart, Messene	0,50
polygyrata, Born, Bras. 1,20-	1,40	ungulata, Zgl., Carniola	0,20
pulchella, Müll., Germania		Baleo-clausilia livida, Mnke.	
u. Transylvania	0,5	var. clausiliaeformis, Bttg.	2
pygmaea, Drp., Angl., Germ.		mit Clausilium, Transylv.	
u. Italia	0,5	<i>Achatina</i>	
ruderata, Stud., Carinthia	0,10	algira, Fér., Africa	1,50
		fulica, Fér., "	1

	Mk.			Mk.
variegata, Lam., Africa	1,80	pomum, L., India occid.	1,20	
zebra, Lam., "	1,30	radix, Gmel., Pacific	1,20	
Bulimus ovatus, Müll., Bras.	2	ramosus, L., Madagascar	1,50-2	
— oblongus, Müll., S.Amer.	0,90	rota, Sow. M. rub.	3	
Cyclostomus Listeri, Gray		Senegalensis, Gml., Senegal	1,50	
v. grandis, Maurit. in 4 var.	0,80	tenuispina, Lm. In. or.	2-3	
<i>Planorbis</i>		tetragonus, Brod., Maurit.	0,90	
Villae, Adami, Italia	0,20	trunculus, L., M. medit.	0,50-	0,80
corneus, L., gross., Germ. mer.	0,20	Delphinula laciniata, Lam.,		
— hungaricus, Hungaria	0,30	Philippinen 60-	1,30	
charteus, Held, Berlin	0,10	Monoceros cingulatum, Kien.,		
Clessini, Wstrld., Galizia	0,30	Mexico	0,80	
Hydrobia Steinii, var. Mart.		Cerithium ocellatum, Brug.,		
Berlin	0,10	Ocea. ind.	0,25	
Valvata macrostoma, Steenb.		Bul. Reinianus, Kob., Japan	2	
Berlin	0,15	Strombus accipitrinus, Lm.,		
<i>Voluta</i>		W.-Ind.	3	
indica, Gmel., Ocean. ind.	4	— gigas, L., cum operculo		
vespertilio, L., "	1	W.-Ind.	5	
musica L.	2	Cassis tuberosa, Rve., "	3	
lapponica, Gmel.	1	Triton variegatum, Lam.,		
scapha	"	W.-Ind.	2-4	
<i>Murex</i>		Pyrula melongena, L., cum		
acanthopterus, L., Philippin.	1	operculo W.-Ind.	3	
adustus, L., Ind. orient.	1,20	Fusus proboscidiferus, Lm.,		
anguliferus, Kien., Ceylon	1,80	Oc. ind.	10	
axicornis, Kien., Philippinen	1,50	Venus gnidia, Brod., Pacific	4	
bicolor, Valenciennes, Pacific	1-2	Cardium pseudolima, Lam.,		
calcitrapa, Lam., W.-Ind.	1	Oc. ind. weiss 2, rosa	3	
clavus, Kien., Mauritius	10-12	Marginella sapotilla, Hnds.		
cornutus, L., Africa besch.	1-2	Panama	0,50	
Cumingii, A. Ad., Maurit.	1	Lithodomus caudiger, Lm.,		
endivia, Lm., Ind. or.	1-1,80	M. rub.	0,60	
fenestratus, Chm., Maurit.	1	Spondylus nicobaricus, Ch.,		
haustellum, Lm., Ceylon	1	Maurit.	1,50	
inflatus, Lm., Tahiti	2	— ocellatus, Rve., "	1,20	
palma rosae, Lm., Ceylon	4,50	— zonalis, Lm., "	1,60	.

Der Tauschverein sucht gegen baar oder im Tausch: *Helix nautiliformis*, *Porro*; *arbustorum* v. *rudis* und v. *picea*. Ferner Species von *Gundlachia*, *Latia* und *Camptoceras*.

T. A. Verkrüzen,
Frankfurt a. M., Oederweg 96.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Verkrüzen T.A.

Artikel/Article: [Tausch-Catalog 30-31](#)