

T a u s c h - C a t a l o g

der deutschen malakozologischen Gesellschaft.

Auf vieles Verlangen erfolgt jetzt Liste der Heliceen. Von den mit * bezeichneten, die schwach vertreten sind, und allen nicht aufgeführten übernimmt der Tauschverein von 4 bis 40 Stück, je nach Werth.

(Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.)

| | Mk. | | Mk. |
|--------------------------------|------|--------------------------------|------|
| <i>Heliceen.</i> | | | |
| Streptaxis dejectus, Petit. | | Jenynsi, Pfr., Zanzib. | 0,10 |
| Brasil. | 0,75 | labiata, „ Himalaya, bes. | 0,35 |
| <i>Ennea</i> | | | |
| mauritiana, Morlt., Maurit. | 0,35 | *mossambicensis, Pfr., Mozamb. | 0,25 |
| — v. multistriata, „ | 0,35 | *Nouleti Gil., Viti-I., bes. | 0,60 |
| *ovoidea, Brug., Socotra | 2 | *ovum, Val., Ind. orient. | 1,50 |
| modiolus, Fér., Mauritius | 0,40 | rectangula, Pfr., Marquesas | 0,35 |
| *pagoda, Fér. (Gibbus), „ | 1,80 | Sophiae, Gask., L. Hood I. | 1,50 |
| palanga, Pfr., „ | 0,50 | Swainsoni, Pfr., Tahiti | 0,40 |
| palangula, Morelet, „ | 0,35 | Thais, Hombron, Viti-I. | 0,40 |
| sulcata, Müll. (Gibbus), „ | 1 | trochiformis, Fér. Tahiti or. | 0,25 |
| teres, Pfeiffer, „ | 0,50 | Troilus, Gould, Oc. pacif. | 0,40 |
| <i>Vitrina</i> | | | |
| *angelicae, Beck, Grönland | 0,60 | vitrioides, Desh., Bengal. | 0,80 |
| brevis, Fér., Germania | 0,15 | <i>Zonites</i> | |
| diaphana, Drp., „ | 0,15 | *acies, Partsch, Dalmat. | 0,30 |
| elongata, „ Bavaria | 0,15 | *algirus, L., Gallia | 0,40 |
| Isseli, Morel., Abyssinia | 0,70 | *compressus, Zgl., Croatia | 0,30 |
| limpida, Gould, Maine | 0,40 | croaticus, Partsch, „ | 0,30 |
| *major, Fér., Germ | 0,25 | *microconus, Mouss., Viti-I. | 0,30 |
| pellucida, Müll., „ | 0,10 | *Newcombianus, Binn., Calif. | 0,60 |
| plicosa, Blz., Hungaria | 0,35 | *samoensis, Mouss., Samoa | 0,30 |
| *praestans, Gray, Birmah. | 1,30 | verticillus, Fér., Germ. | 0,20 |
| <i>Nanina</i> | | | |
| bermudensis, Pfr., Bermuda | 0,40 | *vitiensis, Mssn., Viti-I. | 0,30 |
| citrina, L., Ind. orient. | 0,35 | <i>Hyalina</i> | |
| *firmostyla, Mouss., Wallis-I. | 0,30 | *aequata, Mssn., Grecia | 0,25 |
| *Godeffroyana, Gml., Viti-I. | 1 | alliaria, Mill., Anglia etc. | 0,10 |
| gularis, Say, Tennessee | 0,25 | arborea, Say, Ohio | 0,25 |
| *Hoyti, Grl., Viti-I. | 0,50 | cellaria, Müll., Angl. etc. | 0,10 |
| *Humphreysiana Lea, Ind. or. | 0,60 | Chersina, Say, Amer. bor. | 0,35 |
| | | concepta, Bens., Birma | 0,45 |
| | | contracta, Wstrl., Berlin | 0,15 |
| | | crystallina, Müll., German. | 0,10 |

| | Mk. | | Mk. |
|--------------------------------|------|---------------------------------|---------------|
| *electrina, Gld., Massach. | 0,25 | *advena, Webb., Cap. v. In. | 0,40 |
| excavata, Bens., Anglia | 0,50 | aemula, Rssm., Tirol | 0,30 |
| — var. vitrina, " | 0,60 | alabastris, Mich., Oran | 0,50 |
| fulva, Drp., Germ. & Anglia | 0,20 | alauda, Fér., Cuba | 0,75 |
| glabra, Stud., " | 0,20 | albolabris, Say, Amer. bor. | 0,35 |
| indentata, Say, Amer. bor. | 0,45 | alonensis, Fér., Hispan. | 0,35 |
| interna, Say, Ohio | 0,50 | alternata, Say, Amer. bor. | 0,20 |
| Kopnodes, Binn., Alabama | 0,80 | *ambrosia, Angas., Admir.-I. | 1 |
| labyrinthica, Say, Florida | 0,15 | anomala, Pfr., Jam. | 0,60 |
| limatula, Ward., Ohio | 0,30 | aperta, Born., Algier, Europ. | 0,30 |
| lineata, Say, Pensylvan. | 0,20 | apicina, Lm., Algeria | 0,20 |
| lucida, Drp., Germ. Gall. | 0,15 | appenina, Porro, Umbria | 0,25 |
| nitens, Müll., Germ. | 0,15 | appressa, Say, Ohio | 0,25 |
| nitida, " " | 0,15 | arabica, Terv., Algier | 1 |
| nitidosa, Fér., Angl. | 0,15 | arborea, Say, Ohio | 0,20 |
| nitidula, Drp., Germ. | 0,15 | arbustorum, L., Ang. Ger. etc. | 0,20 bis 0,25 |
| osculans, C. B. Ad., Jamaica | 0,25 | — v. aethiops, Blz., Transs. | 0,30 |
| pura, Alder., Anglia | 0,20 | — v. alpestris, Zgl., Alpes | 0,30 |
| subterranea, Bourg., Bavaria | 0,80 | — v. rudis, Mühlf., Tirol | 0,45 |
| *suppressa, Say, Tennessee | 0,40 | arenarum, Bourg., Algier | 0,30 |
| vitrea, Bielz., Transsylvan. | 0,35 | arrosa, Gld., Californ. | 0,60 |
| <i>Macrocyclus</i> | | | |
| vancouverensis Lea, Amr. bor. | 1 | aspersa, Müll., Angl. Ger. Alg. | 0,20 |
| <i>Sagda</i> | | | |
| *Cookiana, Gmel., Jamaica | 0,70 | — var. tenuis, Jersey | 0,30 |
| Jayana, C. B. Ad., " | 0,70 | asteriscus, Morse, Maine | 0,25 |
| <i>Leucochroa</i> | | | |
| candidissima, Drp., Afr. sept. | 0,25 | *atrolabiata, Kryn., Kaukasus | 0,50 |
| — var. hierochuntina, Mssn. | | auricoma, Fér., Cuba | 0,25 bis 0,60 |
| Jerusalem | 0,35 | auriculata, Say, Amer. bor. | 0,50 |
| cariosula, Mich., Algier | 0,50 | austriaca, Mühlf., Austria | 0,20 |
| <i>Helix</i> | | | |
| acompsia, Bourg., Algier | 0,40 | — varietates, " | 0,25 |
| aculeata, Müll., Germ. | 0,20 | badia, Fér., Guadaloupe | 0,40 |
| acuta, Müll. (Bul.), Dalm., | | barbigera, Rdd., N.-Carolina | 0,80 |
| Ital., Ang. | 0,5 | *bathyomphala, Chrp., | |
| — v. bizona, Jeffr., Wales | 0,10 | Ital. sept. | 0,30 |
| — v. inflata, " Anglia-Tr. | 0,10 | bidens, Chm., Germ. | 0,20 |
| acuta, Lam., Jamaica | 0,75 | — v. major = dibothrion, Fr. | 0,30 |
| | | Transsylvania | 0,30 |
| | | *Bielzi, A. Schm., Germ. | 0,30 |
| | | bifasciata, Burr., Brasil. | 0,40 |

| | Mk. | | Mk. |
|--------------------------------|------|---------------------------------|------|
| Binneyana, Morse, Maine | 0,50 | colubrina, Jan., Car. Ital. | 0,30 |
| Boissyi, Terver, Oran. | 1,50 | columbiana, Lea, Californ. | 0,50 |
| Bonplandi, Lm., Ind. Oc. | 1 | concinna, Jeffr., Anglia | 0,15 |
| Brocheri, Gutz., Cuba | 0,60 | conoidea, Drp., Algeria | 0,10 |
| caeca, Guppy, Trinidad | 0,15 | Constantinae, Forbes, Algeria | 0,50 |
| caerulans, Mühlf. Croatia | 0,35 | corrugata, Gml., Sicilia | 0,35 |
| Caldwelli, Bens. Maurit. | 0,50 | costata, Müll., Germ. etc. | 0,10 |
| calendyma ? Bourg. Algier | 0,50 | costulata, Zgl., Transsylv. | 0,20 |
| californiensis, Lea, Californ. | 0,50 | *costulifera, Pfr., N.-Caledon. | 0,40 |
| camaena, Brasil. | 0,40 | *Coxi, Crosse, Austral. | 2 |
| candicans, Zgl., Hungaria | 0,30 | cretica, Fér., Creta | 0,30 |
| candidula, Stud., Germ. | 0,5 | cubensis, Pfr., Cuba | 0,50 |
| cantiana, Mtg. Angl. etc. | 0,20 | cumberlandiana, Lea, Tenn. | 1 |
| caperata, " " | 0,15 | *cyclostomata, Mssn., Austral. | 0,80 |
| — v. ornata, Wales | 0,20 | dentiens, Fér., Martinique | 0,45 |
| *caribaea, Weinl., Baham. | 0,40 | depilata, Pfr., Germ. etc. | 0,20 |
| carmelita, Fér., Jam. | 1,80 | depressula, Parr., Oran. | 0,40 |
| carpatica, Friv., Carpath. | 0,35 | desertella, Jick., Afr. orient. | 0,45 |
| Carpenteriana, Bld., Florida | 0,40 | desertorum, Forsk., Egypten | 0,25 |
| carsোলana, Fér., Italia | 0,30 | — varietates, " | 0,25 |
| carthusiana, Müll., Carinth. | 0,20 | devia, Gould, Californ. | 0,60 |
| — v. carthusianella Drp. " | 0,20 | *dicromolena, Bourg., Umbria | 0,35 |
| cereolus, Mühlf., Florida | 0,30 | *discolor, Fér., Ind. occid. | 0,45 |
| cespitum, Drp., Algier, Italia | 0,35 | Dupetit-Thouarsi, Dsh. Calif. | 0,60 |
| — v. Constantinae, Const. | 0,35 | Dupotetiana, Bourg., Oran. | 0,40 |
| — v. Affreville, Algeria | 0,35 | edentula, Drp., Carniola etc. | 0,25 |
| — v. Altass, " | 0,35 | *Edwardsi, Bland., Kentucki | 0,45 |
| chamaeleon, Parr., Carinth. | 0,30 | Ehrenbergi, Roth., Egyptus | 0,50 |
| chersina, Say, Ohio | 0,40 | elegans, Gmel., Ital. | 0,30 |
| cicatricosa, Müll., China | 0,50 | elevata, Say, Amer. bor. | 0,80 |
| ciliata, Venez., Tirol | 0,10 | ericetorum, Müll., Germ. etc. | 0,10 |
| cinctella, Drp., Carinth | 0,30 | *erinacea, Pfr., Salom.-Ins. | 2,50 |
| cingulata, Stud., " | 0,30 | Erjavecii, Brug., Croatia | 0,30 |
| — v. albina, selten. Tirol | 2 | exarata, Pfr., Californ. | 0,40 |
| *cingulella, Zgl., Hung. mer. | 0,25 | exigua, Stimps., Amer. bor. | 0,20 |
| clausa, Say, Ohio | 0,20 | *exoleta, Binney, Ohio | 0,45 |
| *Cleryi, Recl., Salom.-I. | 0,50 | explanata, Müll., Algier | 0,35 |
| cobresiana, v. Alten, Carinth | 0,25 | facta, Newcomb, Californ. | 0,60 |
| *coelatura, Fér., I. Reunion | 1 | *fallaciosa, Fér., Ceylon | 0,40 |

| | Mk. | | Mk. |
|--------------------------------|------|------------------------------|------|
| fallax, Say, Amer. bor. | 0,30 | Juilleti, Terver, Algeria | 0,60 |
| faustina, Zgl., Gallizia etc. | 0,40 | Kabyliana, Debeau, " | 0,45 |
| — v. fortunata, Parr., Trans. | 0,35 | Kelletti, Forb., Californ. | 0,40 |
| Febigeri, Bland., Alabama | 0,70 | Kollari, Zeleb., Serbia | 0,40 |
| *fidelis, Gray, Californ. | 0,50 | lactea, Müll., Algier | 0,35 |
| foetens, Stud., Carinth | 0,30 | — v. Lucasii, Desh., Oran. | 0,50 |
| — v. achates, Zgl., Tirol | 0,35 | lamellata, Jeffr., Irland | 0,30 |
| *Fosteriana Pfr., Austral. | 0,50 | laticida, L., Germ. etc. | 0,10 |
| fringilla, Pfr., Salomon-I. | 1 | apicina, Lam., Algier | 0,10 |
| — v. alba, Austral. | 1,20 | *Leai, Ward., Ohio | 0,50 |
| fruticum, Müll., Germ. etc. | 0,15 | *Lefeburiana, Fér., Carniola | 0,40 |
| fusca, Montg., Anglia | 0,75 | *lens, Fér., Grecia | 0,45 |
| *gallo-pavonis, Val., Hayti | 0,40 | lenticula, Fér., Algier | 0,15 |
| globularis, Zgl., Sicil. | 0,30 | *leucostyla, Pfr., Maurit. | 0,40 |
| *globulus, Müll., Afric. mer. | 1 | leucozona, Zgl., Carniola | 0,25 |
| Gobanzi, Frfld., Tirol | 0,35 | *liberta, Wstrl., Baiern | 0,30 |
| *graminicola, Adms., Jam. | 0,40 | *ligata, Müll., Toscana | 0,30 |
| *Grayi Pfr., Austral. | 1,20 | Locheana, Bourg., Algier | 0,45 |
| haemastoma, L., Ceylon | 0,35 | *Lombeii, Pfr., Admiral.-I. | 1,30 |
| Hargravei, Angas, Salom.-I. | 1,20 | loricata, Gld., Californ. | 0,35 |
| *Heldreichi, Shuttll., Grecia | 0,40 | lutescens, Zgl., Transylv. | 0,40 |
| Hermesiana, Pini, Ital. | 0,35 | Mackenzii, Val., Japan | 1,50 |
| hieroglyphicula, Mich., Oran. | 0,50 | moesta, Parr., Algeria | 0,40 |
| hirsuta, Say, Amer. bor. | 0,25 | marginata, Müll., Ceram | 0,80 |
| *hispana, L., Carniola | 0,30 | maritima, Drp., Germ. etc. | 0,10 |
| hispida, L., Germ. etc. | 0,15 | mauritanica, Pfr., Maurit. | 0,40 |
| *Hombroni, Pfr., Salom.-I. | 1 | *Mazzullii, Jan., Sicilia | 0,50 |
| *hopetonensis, Sh., N.-Carol. | 0,45 | melanostoma, Drp., Alexandr. | 0,50 |
| bortensis, Müll., Germ. etc. | 0,10 | meta, Pfr., Salom.-I. | 1 |
| jamaicensis, Chm., Jam. 1 bis | 1,50 | microdonta, Desh., Bermuda | 0,30 |
| *Janeae, Grl., Ins. pacif. | 0,30 | migratoria, Pfr., Salom.-I. | 0,70 |
| *imperfecta, Desh., Maurit. | 0,60 | Mitchelliana, Lea, Ohio | 0,50 |
| incarnata, Müll., Bavaria etc. | 0,25 | *monodonta, Rack., Maine | 0,50 |
| *Incei, Pfr., Austral. | 1,30 | *monodonta, Lea, Amer. bor. | 0,40 |
| incerta, Fér., Ind. occid. | 0,45 | *mucronata, Pfr., Maurit. | 0,40 |
| inflecta, Say, Amer. bor. | 0,20 | multilineata, Say, Ohio | 0,30 |
| instabilis, Zgl., Hungar. | 0,30 | *muralis, Müll., Sicil. | 0,30 |
| intermedia, Fér., Carinth | 0,15 | muscarum, Lea, Cuba | 0,50 |
| inversicolor, " Maurit. etc. | 0,35 | neglecta, Drp., Grecia | 0,30 |

| | Mk. | | Mk. |
|----------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| nemoralina, Petit, Antill. | 0,15 | pustula, Fér., Georgia | 0,35 |
| nemoralis, L., German. | 0,10 | pygmaea, Drp., Germ. etc. | 0,5 |
| *niciensis, Fér., Nizza | 0,30 | pyramidata, Dp., Alg. Toscan. | 0,10 |
| *nummus, Ehrenb., Syria | 0,50 | — v. minor, Alger | 0,15 |
| obvia, Zgl., Germ. etc. | 0,15 | *quaesita, Dsh., Japan | 2 |
| obvoluta, Müll., „ | 0,20 | *Raspailli, Payr., Corsica | 0,75 |
| Oranensis, Bourg., Oran. | 0,40 | Rawsonis, Barcl., Mauritius | 0,60 |
| — v. Mostaghanem, Algeria | 0,50 | rebondiana, Bourg., Oran. | 0,40 |
| *pachygastra, Gray, Guadal. | 0,80 | reticulata, Pfr., Californ. | 0,45 |
| *pachystoma, Theob. v. minor | | *Rivoli, Desh., Ceylon | 1 |
| Birma | 1 | *Römeri, Pfr., Texas | 1 |
| *pachystyla, Pfr., Austral. | 2 | roseotincta, Forb., Alger | 0,25 |
| palliata, Say, Amer. bor. | 0,30 | — v. Blidah, Algeria | 0,30 |
| *paludosa, Pfr., Cuba | 0,50 | rostrata, Pfr., Cuba | 1 |
| *parilis, Fér., Antillen | 0,40 | rotundata, Müll., Germ. etc. | 0,10 |
| pensylvanica, Green, Ohio | 0,40 | Rozeti, Mich., Algeria | 0,45 |
| *peracutissima, C.B.Ad., Jam. | 2 | rubiginosa, Zgl., Transsylv. | 0,35 |
| personata, Lam., Germ. etc. | 0,20 | ruderata, Stud., Germ. | 0,10 |
| perspectiva, Say, Ohio | 0,40 | rufa, Lesson, Mauritius | 0,30 |
| phalerata, Zgl., Carniola | 0,25 | rufescens, Penn., Germ. etc. | 0,15 |
| *Phönix, Pfr., Ceylon | 0,80 | rufotincta, Adms., Maurit. | 0,35 |
| *Pietruskyana, Parr., Hungar. | 0,35 | *Rugeli, Shuttl., Tennessee | 0,35 |
| *picta, Born., Cuba | 0,60 | rupestris, Dp., Suez., Irl., Trns. | 0,5 |
| pisana, Müll. & varietates | | *Sayi, Binney, Tennessee | 1 |
| Germ. etc. | 0,10 | *Schmidti, Zgl., Carniol | 0,30, |
| planospira, Lm., Ital. Carinth | 0,25 | *secernenda, Rssm., Dalmat. | 0,30 |
| *platychela, Mnke., Sicilia | 0,40 | *semicastanea, Pfr., Austral. | 1 |
| *polygyrata, Born., Bras. 1, 20- | 1,40 | senilis, Lowe, Mauritius | 0,60 |
| pomatia, L., Germ. etc. | 0,20 | septemvolva, Say, Florida | 0,25 |
| — v. minor, Transsylv. | 0,30 | *sepulchralis, Fér., Madagasc. | 0,60 |
| *Postelliana, Bld., Georgia | 0,45 | sericea, Drp., Germ. etc. | 0,30 |
| Presli, Schm., Carinth | 0,30 | setipila, Zgl., Ital. merid. | 0,40 |
| * — v. nisoria, Rssm., It. sept. | 0,40 | *setosa, „ Dalmat. | 0,45 |
| profuga, A. Schm., Umbria | 0,15 | sicana, Fér., Sicil. | 0,40 |
| profunda, Say, Amer. bor. | 0,35 | similaris, „ Brasil. | 0,20 |
| psammoica, Morelet, Algeria | 2 | sinuata, Müll., Jamaica | 0,60 |
| psara, Bourg., „ | 0,45 | solaria, Mnke., Carinth. | 0,20 |
| pulchella, Müll., Germ. etc. | 0,5 | *solitaria, Say, Amer. bor. | 0,50 |
| punctata, Müll., Oran. | 0,35 | sphaerita, Hartm., Oran. | 0,50 |

| | Mk. | | Mk. |
|--------------------------------|------|--------------------------------|------|
| *spinosa, Lea, Tennessee | 0,60 | *Townsendiana, Lea, Calif. | 0,80 |
| *spiriplana, Oliv., Jerusalem | 0,75 | triaria, Friv., Transsylyv. | 0,25 |
| *splendida, Drp., Ital. | 0,30 | tridentata, Say, Amer. bor. | 0,25 |
| stenotrema, Fér., Tenn., 0,30- | 0,40 | *trizona, Zgl., Banat. | 0,35 |
| striata, Müll., Transsylyv. | 0,25 | trochoides, Poir., Italia | 0,15 |
| *striatella, Anth., Ohio | 0,30 | *Troostiana, Lea, Tennessee | 0,50 |
| *strigata, Müll., Ital. m. | 0,25 | *Tryoni, Newc., California | 0,50 |
| — v. Molteni, Adami, Umbr. | 0,40 | tuberculosa, Conr., Palestina | 0,45 |
| strigella, Drp., Germ. | 0,15 | *tudiculata, Binney, Californ. | 1 |
| *stylodon, Pfr., Maurit. | 0,70 | umbrosa, Partsch, Austria | 0,20 |
| submaritima, Desm., Algeria | 0,10 | *unidentata Chm., Seychellen | 1,20 |
| — v. constantinae, Const. | 0,25 | uvulifera, Shuttlew., Florida | 0,40 |
| submeridionalis, Brg., Oran. | 0,40 | van Nostrand, Bland, S.-Car. | 0,70 |
| subrostrata, Fér., Algier | 0,40 | variabilis, Drp., Italia etc. | 0,15 |
| — v. Atlass, " | 0,40 | — v. virgata, Mntg., Anglia | 0,20 |
| *sulcifera, Adms., Maurit. | 2 | varians, Mnke., Bahamas | 0,40 |
| *sulculata, Mühlf., Istria | 0,35 | ventricosa, Drp., Gallia | 0,15 |
| *suppressa, Say, Ohio | 0,40 | vermiculata, Müll., Dalm., It. | 0,30 |
| surrentina, Schm., Sicilia | 0,30 | versicolor, Born., Cuba | 0,60 |
| sylvatica, Drp., Germ. mer. | 0,20 | vestalis, Parr., Palästina | 0,30 |
| *tenuilabris, Braun, Regensb. | 0,50 | villosa, Drp., Badia, Bavaria | 0,25 |
| Terveri ?, Bourg., Oran. | 0,50 | *Xanthocheila, Pfr., Salom.I. | 1,50 |
| texasiana, Moric., Texas | 0,20 | Zapharina, Terver., Algeria | 0,50 |
| thyreoides, Say, Amer. bor. | 0,20 | *Zelebori, Pfr., Serbia | 0,15 |
| tigrina, Jan., Italia | 0,25 | Ziegleri, Schm., Carinth. | 0,25 |
| *touranensis, Soul., Cochin | 0,50 | (Der Rest folgt nächstens.) | |

Kleinere Mittheilungen.

Der Unterzeichnete geht Anfangs April auf drei Monate nach Süd-Italien und bittet Briefe und Kreuzbandsendungen für diese Zeit an Herrn D. F. Heyne mann in Frankfurt a. M., Schifferstrasse 53, zu adressiren.

Dr. W. Kobelt.

Mittwoch den 3. April und folgende Tage wird von mir in Hamburg, St. Georg, Langereihe 12, die Conchyliensammlung des Herrn Architecten H. S. Ehbeh meistbietend öffentlich versteigert werden.

Zu näherer Auskunft bin gern bereit und halte mich zu Aufträgen, den Ankauf einzelner Theile betreffend, bestens empfohlen.

Hartwig Petersen, Makler,
St. Pauly, Elmsbübler-Chaussee 1b.

Briefkasten. Herrn Dr. Döring, Cordoba. Ihre Geldsendung im Betrage von 60 Mark erhalten. Bitte um Nachricht, auf welche Weise dieselbe zu verwenden ist.

Johannes Alt.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Verkrüzen T.A.

Artikel/Article: [Tausch-Catalog 43-48](#)