

T a u s c h - C a t a l o g
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

* schön oder selten ; ** sehr schön oder sehr selten ; Austr. = Australia septentrionalis.

Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.

	Mk.		Mk.
<i>Helix</i>			
tranquebarica, Fab. Ceylon	1,20	Tellina perna, Spgl. & v. sul-	
planulata, Lam. Philipp.	0,60-1	phurea Lm. O. ind.	1
coluber, Beck.	1,50	Chione puerpera L. & v. Aust.	1,50
*rota, Brod.	2	“ reticulata, L. ”	2
**peracutissima, Adm. Jam.	3	Crista gibbia, Lm. O. ind.	0,45-60
**Weinkff., Crosse maj. Saig.	2,50	Cypriocardia coralliphaga,	
*Weinkanffiana „ minor „	1,50	Lm. O. ind.	1,20
**Falconeri, Rve. Australia	6	*Pect. pallium, L. v. regius, „	7,50
**nemor. sinistrorsa, L. Germ.	7,50	“ ” etwas besch. „	3,50
Batissa cyprin. Quoy. Afric.	2	Cultellus maximus, Gml. „	4
*Crassat. decipiens, Sw. Aust.	5	<i>Anculosia</i>	
Crassatella dec., Schalen „	2,50	costata, Anth. Ohio	0,20
<i>Arca</i>		praerosa, Say. typus „	0,25
Noae, L. Antillae	0,30-1	“ var. Tennessee	0,20
occidentalis, Phil. „	0,50-1	rubiginosa, Lea Coosa riv.	0,30
trapezia, Desh. Austral.	1,20	tintinabulum, Lea Tenn.	0,15-25
deformis, Dnkr.	0,70	Tryoni, Lewis „	0,15-25
granosa, L. „	1,30	<i>Angistrema</i>	
Barbatia cruciata, Phil. „	1	armigera, Say Wabash	0,40
Paralellipedum tortuosum,		salebrosa, Conrad Tenn.	0,35
L China 1	50-1,80	subglobosa, Say typus Tenn.	0,25
Cucullaea cucullata, „	2,50	“ varietates „	0,20
Mytil. smaragdinus Ch. O.ind.	0,40-60	verrucosa, Raf. „	0,15-25
Schizodesma Spengleri L. Cap	5	<i>Goniobasis</i>	
Mactra antiquata Spgl. O.ind.	0,80	aterina Lea „	0,20
Soletellina rostrata, Lm. „	2 & 3	arachnoidea, Anth. „	0,30
Donax serra, Chm. Cap	2	carinifera, Lm. „	0,30
*Mallens albus, Lm. Phil.	2 & 3	castanea, Lea „	0,10-20
*Tapes giganteus Lm. Mexico	7,50	depygis, Say Ohio	0,25
“ textilis, Gml. O. ind.	0,50	Haysiana, Lea Coosa riv.	0,30
*Corbis fimbriata, Lm. Austr.	2-4	livescens, Mnke. N.-York	0,20
Tellina rostrata, L. O. ind.	1	orrecta, Lea Tenn.	0,20
		semicarinata, Say Ohio	0,30

		Mk.		Mk.
simplex, Say	Tenn.	0,35	<i>Voluta</i>	
virginica, Gml.	Erie Canal	0,10-20	Rückeri, Crosse.	Austral. 5
<i>Pleurocera (Trypanostoma)</i>			Norrisii, Sow.	" 3,50
canaliculatum, Say	Ohio	0,15-25	vespertilio, L.	Oe. ind. 0,50-80
Anthentis, Lea	Tenn.	0,25	" v. <i>pellis serpentis</i> , "	1-1,50
Clarkii, Lea	Alabama	0,15-25	<i>scapha</i> , Gmel.	" 1,80
Estabrookii, Lea	Tenn.	0,20-30	<i>Terebra commacul.</i> , Gml.	" 1-1,50
filum, Lea	Alab.	0,20-30	<i>Mitra</i>	
gradatum, Anth.	Tenn.	0,15-25	? <i>balteolata</i> , v. Rve. Philipp.	1,50-2,50
moriferum, Lm.	Chattanooga	0,15-25	<i>intermedia</i> , Kien.	" 1-1,50
parvum, Lea	Tenn.	0,15-25	<i>caffra</i> , L.	Oe. ind. 1,20
ponderosum, Anth.	"	0,15-25	<i>vulpescula</i> , L.	" 1
robustum, Lea	Alab.	0,15-25	<i>circulata</i> , Kien.	" 0,60-1
subulare, Lm.	N.-York	0,15-25	<i>exasperata</i> , Chm. typus	" 0,60
unciale, Haldem.	Tenn.	0,15-25	<i>fenestrata</i> , Lam.	" 1,20
<i>Melantha</i>			? <i>granulosa</i> , Lam. Austral.	1,80
decisus, Say. typus Erie Can.		0,30	* <i>concinna</i> , Rve.	" 5,50
decisus, varietates		0,20	Deshayesi, Rve.	Oe. ind. 0,75
integer, Say. typ. Mohawk N.Y		0,35	<i>costellaris</i> , Lam.	" 1-1, 20
ponderosus, Say. typus Alab.		0,30-40	<i>erucentata</i> , Chm.	Philipp. 0,60
rufus, Haldemann	"	0,30	<i>limbifera</i> , Lm.	Oe. ind. 0,50
subsolidus, Anth. typ. Illinois		0,30	" varietas.	Mauritius 0,60
<i>Lioplax subcarinatus</i> , Say	"	0,30	* <i>rubiginosa</i> , Rve. In. Ticao	3,50
<i>Cypraea capensis</i> , Gray. Cap		1,50-2	* <i>subulata</i> , Lam.	Oe. ind. 3,50
" edentula, Sow.	"	1-1,20	<i>Nassa</i>	
" oniscus, "	"	1,50-1,80	<i>albescens</i> , Dkr.	Philipp. 0,40
<i>Conus rosaceus</i> , Chm.	"	1,50-2	<i>dispar</i> , H. Ad.	Oe. ind. 0,45
" " varietas	"	1,50	<i>bimaculosa</i> , H. Ad. & v.	" 0,50
** " <i>pennaceus</i> v. Born. O.ind.		2,50	<i>lurida</i> , Gmel.	Samoa-I. 0,35
† " <i>infrenatus</i> , Rve.	Cap	3	<i>margaritifera</i> , Dnkr. O. ind.	0,50
<i>Typhis</i> ?	"	0,30-50	<i>muricata</i> , Quoy.	" 0,40
<i>Nassa capensis</i> , Dnkr.	"	0,40	<i>Phos. Blainvillei</i> , Manl.	" 0,60
† <i>Turbo cidaris</i> , Gml.	"	0,50	" <i>senticosus</i> , L.	" 0,70
<i>Cassis achatina</i> , Lm.	"	1,50	<i>Harpa minor</i> v. <i>crassa</i> , Phil.	0,70
" <i>plicaria</i> , Lm. Philipp.		2,50	<i>Natica chinensis</i> , Lm. Oe. ind.	0,50
<i>Oliva glandiformis</i> , Oe. ind.		0,50	<i>Ficula reticulata</i> , Lm.	" 0,80-1,50
<i>Cymbium melo</i> , Soland.	"	2,80		

T. A. Verkrüzen,

Brönnnerstrasse 30 II. (früher Oederweg 96) Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Verkrüzen T.A.

Artikel/Article: [Tausch-Catalog 110-111](#)