

Literaturbericht.

Proceedings of the scientific Meetings of the Zoological Society of London for the year 1877. Part. I.

- p. 72. *Angas, Georg French*, Descriptions of seven new species of Landshells, recently collected in Costa Rica by Mr. Adolph Boucard (*Helix* Boucardi, *adela*, *aesopus*, *Cyclotus* Boucardi, *Bulimus* Josephus, *irazuensis*, *navarrensensis*).
- p. 74. *Angas, Georg French*, Description of a new species of *Latrix* (*L. elegans* unbekannten Fundortes).
- p. 105. *Smith, Edgar A.*, Description of a new species of *Helix* from Japan (*Camena* congener, der Abbildung nach vollkommen identisch mit *Amaliae* Kob., welche dem Autor unbekannt geblieben zu sein scheint).
- p. 275. *Cheesmann, S. T.*, Descriptions of three new species of Opisthobranchiate Mollusca from New Zealand (*Pleurobranchus ornatus*, *Novae Zealandiae*, *Aclesia glauca*).

Troschel, Dr. F. H., das Gebiss der Schnecken zur Begründung einer natürlichen Classification untersucht. — Bd. II. Lfg. 5.

Enthält die Fortsetzung der Rhipidoglossen; wir berichten darüber eingehend in den Jahrbüchern.

Jahrbücher der deutschen malacozoologischen Gesellschaft. V. 1878. Heft 3.

- p. 195. *Pfeffer, Georg*, Beiträge zur Naturgeschichte der Lungenschnecken. V. Die Gattung *Cochlostyla*. Mit Taf. 7.
- p. 202. *Wiegmann, Fr.*, anatomische Untersuchung der *Claus. Reiniana* Kob. (= *yokohamensis* Crosse).
- p. 208. *Verkrüzen, T. A.*, zur Fauna von Neu-Schottland und Neufundland.
- p. 231. *Kobelt, W.*, Cataloge der Gattung *Cominella* Gray, *Pseudoliva* Swains., *Adamsia* Dkr., *Euthria* Gray, *Oniscia* Sow., *Struthiolaria* Lam., *Triton* Lam.
- p. 251. *Pfeffer, Georg*, Beiträge zur Naturgeschichte der Lungenschnecken. I. Die Naniniden.
- p. 276. *Kobelt, W.*, zur Kenntniss der nordischen Mollusken. (Mit Taf. 9).
- p. 283. *Kobelt, W.*, *Hel. foetens* Stud.

The Quarterly Journal of Conchology. Vol. I. No. 16. —
 Aug. 1878.

Ausser einigen kleineren Notizen und Kritiken enthält das Heft:
 p. 353. *Garrett, A.*, Annotated Catalogue of Polynesian Cones.

Dieser wichtige Aufsatz enthält eine Zusammenstellung sicherer polynesischer Fundorte für nicht weniger als 81 Arten; von denselben kommen 64 im westlichen Polynesien vor und davon sind 21 noch nicht im östlichen gefunden worden; umgekehrt scheinen von 57 Arten des östlichen Polynesiens bis jetzt 15 ihm eigenthümlich; die ausserpolynesischen Fundorte sind leider nicht berücksichtigt. Am reichsten erscheint die Viti-Gruppe, welche 60 Arten geliefert hat. Zahlreiche sehr interessante Angaben über das Vorkommen einzelner Arten und deren Lebensweise sind beigelegt.

p. 368. *Gibbons, J. S.*, Notes on *Bullia rhodostoma* Gray. Thier und Lebensweise werden beschrieben.

p. 370. *Gibbons, J. S.*, an hours Shell Hunting at Curaçao.

p. 379. *Nelson, W.*, Description of a new species of *Planorbis* (*Gyraulis Gibbonsi* von Zanzibar).

p. 381. *Marrat, F. P.*, List of Westafrican Shells (Contin.). Neu *Nassa interstincta*, *Crassatella africana*, *Actinobolus africanus*. Interessant ist das Vorkommen der seither heimathlosen *Phasiarella Reevei* Jonas.

p. 383. *Witter, Prof. F. M.*, List of Mollusca collected at Muscatine, Iowa.

Martini-Chemnitz, Conchylien-Cabinet. Ed. II.

Lfg. 272. *Kobelt, W.*, Triton et Trophon.

Keine neue Art; zum erstenmal zur Abbildung kommen Triton Waterhousei Ad. et Angas, africanus A. Ad., Poulsenii Mörch, Krebsii Mörch, testaceus Mörch, Trophon Philippii Dkr., spiratus A. Ad., crassus A. Ad.

Smith, Edgar A., Mollusca. — *In Zoology of the Kerguelen Island.* — With Plate IX.

Smith hat die neuen, meist vom Rev. A. E. Eaton gesammelten Arten bereits früher beschrieben und unterwirft dieselben nun einer genaueren Besprechung und Abbildung. Es sind im Ganzen 33 Arten aus 25 Gattungen, davon 18 neu; die Fauna zeigt im Ganzen erheblich mehr Aehnlichkeit mit Patagonien und den Falklandinseln, als mit dem Cap; achtzehn Arten sind in beiden Gegenden identisch oder doch durch nah verwandte Arten vertreten. Die Fauna gehört offenbar zur Fauna antarctica, über

welche wir demnächst mehr erfahren werden, wenn die Bearbeitung der Ausbeute des Challenger erscheint; Trophon, Buccinum, Admete, Saxicava, Kellia, Yoldia, Doris, Margarita sind Analogieen mit der arctischen Fauna. — Für Buccinopsis Eatoni wird die neue Gattung Neobuccinum errichtet, da Radula und Deckel abweichen. Abgebildet sind folgende Arten: Neobuccinum Eatoni, Trophon albolabratum, der mit Philippianus Dkr. verwandt ist, aber gute Art scheint, Struthiolaria mirabilis = costulata Mart., Admete limnaeaeformis, Scissurella supraplicata, Littorina setosa, Hydrobia pumilio, caliginosa, Eatoniella caliginosa, kerguelensis, subrufescens, Rissoa Kergueleni, Patella kerguelensis, fuegiensis, Skenea subcanaliculata, Radula (Limatula) pygmæa Phil. = falklandiensis A. Ad., Lissarca rubrofusca, Yoldia subaequalateralis, Solenella gigantea, Kellia consanguinea, Saxicava bisulcata, Lepton parasiticum, Modiolarca minuta, exilis.

Malacozoologische Blätter, Bd. XXV. Fortges. von S. Clessin.

- p. 1. Bergh, Rud., Untersuchung der Chromodoris elegans und villafrauca (mit Taf. 1 und 2).
- p. 37. Ihering, H. von, G. Cuvier's Abhandlungen zur Begründung des Typus der Mollusken.
- p. 67. Clessin, S., Nordschwedische Mollusken (Hel. fruticum) var. Andersoni, Zonitoides nitidus var. borealis, Succinea putris var. suecica, Bythinia tentaculata var. bottnica, Limnaea stagnalis var. bottnica, auricularia var. Andersoni, palustris var. maritima.
- p. 79. Clessin, S., eine isländische Limnaea (L. Steenstrupii).
- p. 81. Clessin, S., einige hochalpine Mollusken (Helix unidentata var. alpestris, Succinea Pfeifferi var. microstoma, Pupa eumicra Bgt., Clausilia dubia var. alpicola, plicatula var. alpestris).
- p. 89. Clessin, S., eine neue diluviale Paludina (Melanthis ratisbonensis von Ammon).
- p. 92. Mörch, O. A. L., Necrolog.
- p. 96. Clessin, S., eine mitteldeutsche Daudebardia (D. hassiaca von Cassel).

Mittheilungen und Anfragen.

Meine Monographia Clausiliarum in regione palaeoarctica viventium (Lundae 1878, gr. 8°. pp. 220) et Supplementum Monographiae Clausiliarum (dispositio nova Sectionis Albinariae duce clar. O. Boettger; addenda et corrigenda; clavis dispositionis Clausiliarum) sind zusammen gegen M. 4.50 bei dem Herrn S. Clessin in Ochsenfurt bei Würzburg und bei dem Unterzeichneten franco zu bekommen.

Dr. C. Agardh Westerlund,
Ronneby in Schweden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht 113-115](#)