

Literaturbericht.

Koch, F. E., Ueber die Classificirung der Pleurotomidae, mit besonderer Berücksichtigung der in Mecklenburg vorkommenden fossilen Arten. — In Archiv. Mecklenb.

Es werden fünfzehn Gattungen anerkannt, von denen neun in Mecklenburg vertreten sind.

Jeffreys, J. Gwyn, Notice on some Shells dredged by Capt. St. John, R. N., in Korea Strait. — In Linnean Society's Journal. — Zoology vol. XIV. p. 418.

Es werden 14 Arten aufgeführt, welche den europäischen Meeren und der Strasse von Korea gemeinsam sind, oder fossil im Coralrag vorkommen. Davon waren seither nicht aus dem stillen Ocean bekannt *Anomia ephippium*, *Pecten similis*, *Lepton sulcatulum*, *Axinus flexuosus*, *Panopea plicata* und *Turbo sanguineus*, nur fossil bekannt *Nucinella ovalis* und *Kellia pumila*, welche letztere J. eher für eine *Scacchia* halten möchte.

Scientific Results of the Exploration of Alaska. — Art. IV. Dall, W. H., Report on the Limpets and Chitons of the Alaskan and Arctic Regions, with descriptions of genera and species believed to be new.

Der Haupttheil der Arbeit ist den Chitoniden gewidmet, für deren Molluskencharakter der Verfasser entschieden eintritt, doch ohne eigentlich neue Beweise dafür vorzubringen. Die Chitoniden sind nach dem noch nicht publicirten System des verstorbenen Carpenter geordnet, neu ist die Gattung *Nuttallia* Dall unter den *Acanthoidea*. — Die *Dokoglossen*, welche der Verfasser auf die *Patelliden* beschränkt, werden im Anschluss an seine früheren Arbeiten rascher aufgezählt. — Auf fünf Tafeln sind Zungenzähne von *Chiton* abgebildet.

The Annals and Magazine of Natural History; Fifth Series Vol. 2. — London 1878.

- p. 30. Etheridge, R. jun., Notes on Carboniferous Mollusks. (Ueber die systematische Stellung von *Pecten Sowerbii* McCoy, *Nuculana attenuata* Flem. und *Nucula gibbosa* Flem.)
- p. 377. Jeffreys, J. Gwyn, Notes on some British Land- and Freshwater Shells. (Schon früher besprochen.)
- p. 482. Smith, Edg. A., Descriptions of two new Land-Shells from New Granada (*Cyclotus robustus*, *Helicina Colombiae*).

- p. 94. *Gardner, J. S.*, on the Cretaceous Dentaliadae. — Vorläufige Mittheilung, 10 Sp. genannt, davon 8 neu.
- Journal de Conchyliologie*, 1879. No. 1.
- p. 5. *Crosse, H.*, Note sur l'Identité du *Voluta Americana* Reeve avec le *V. Cleryana* Petit; ersterer Name ist älter.
- p. 6. *Paulucci, M.*, Etude critique sur l'*Helix Balmei* Potiez et Mich. — Diese Art wird nach Vergleichung des Originalexemplars für *Hel. flavida* Zgl. erklärt.
- p. 15. *Paulucci, M.*, Etude critique sur quelques *Hyalina* de Sardaigne et description d'une espèce nouvelle. Es werden unterschieden *Hyal. Balmei* Shuttl. nec Pot. et Mich., *oppressa* Shuttl. und *Libysonis* n. sp. = *opaca* Paul. Mater.
- p. 21. *Fischer, P.*, Remarques sur la synonymie du *Bulla dilatata* Leach. Dieselbe heisst richtiger *B. Orbignyana* Fér.
- p. 22. *Fischer, P.*, Diagnoses *Trochorum novorum* (*Tr. smaltatus*, (*Minolia*) *semiustus* von Neu-Caledonien, *unicarinatus* von Neu-holland, *subincarnatus* = *incarnatus* Rve. nec Fischer von Nossibé).
- p. 25. *Souverbie et Montrouzier*, Description d'espèces nouvelles de l'Archipel Caledonien. — (*Bul. Loyaltiensis*, *Echinella Gaidei*, *Plesiotrochus Souverbianus*, *Monilea Lifuana*, *Tectaria Montrouzieri*, *Trochus Giliberti*).
- p. 34. *Bayle, E.*, Liste rectificative de quelques noms de Genres. Folgende Namen werden vorgeschlagen: *Haaniceras* = *Ceratites* de Haan nec Tournefort; *Lissoceras* = *Haploceras* Zittel nec d'Orb.; *Echioceras* Bayle = *Ophioceras* Hyatt nec Barrande; *Duncania* Bayle = *Macrocheilus* Philipps nec Hope; — *Inella* Bayle = *Ino* Hinds nec Samsuelle; — *Opisocardium* Bayle = *Lunulicardium* Gray nec Münster.
- p. 35. *Tournouer, R.*, Note sur la synonymie de deux espèces de Mollusques. (*Scutulum* Mont. und *Mathilda elegans* Brus. sind schon früher vergeben).
- p. 36. *Crosse, H.*, Description de deux Genres et de trois espèces nouvelles de Mollusques, provenant de la Nouvelle Guinée et du Japon. (*Leucoptychia Tissotiana*, *Perrieria clausiliaeformis*, *Voluta Prevostiana*).
- p. 43. *Crosse, H.*, Description de Mollusques terrestres inédits, provenant de la Nouvelle Calédonie (*Helix Berlierei*, *Derbesiana*).
- p. 46. *Crosse et Fischer*, Description d'un Genre nouveau et de deux espèces de Mollusques terrestres, provenant du Mexique. (Gen.

Amphicyclotus, Typus Cyclophorus Boucardi Sallé; — Eucalodium Sumichrasti, Blandianum var. β .)

- p. 49. *Crosse et Fischer*, Description d'une espèce nouvelle de Pupa, provenant de Nossi-Be. (P. Seignaciana).
- p. 50. *Fischer et Tournouer*, Diagnoses Molluscorum fossilium. — (Ostrea Sellei, Voluta miocenica).

Jousseume, Dr., Genre *Biplex* Perry. In: Le Naturaliste, Avril 1879 p. 5.

Der Autor tritt nicht nur für die Anerkennung dieser Gattung und des Perry'schen Namens, sowie die Verschiedenheit von *B. perca* und *pulchra* ein, sondern macht auch den freundlichen Vorschlag, statt *Murex* in Zukunft zu sagen *Purpura* Aldrov., den Gattungsnamen *Murex* aber den *Strombus* zukommen zu lassen.

Procès-Verbaux des séances de la Société Malacologique de Belgique. Tome VIII. Année 1879.

- p. V. *Rutot, A.*, Note sur les fossiles du Tongrien inférieur. Neu: *Cassidaria nodosa* var. *intermedia*.
- p. XI. *Rutot, A. et G. Vincent*, Observations nouvelles relatives à la faune du système Bruxellien et à celle de l'ancien Laekenien supérieur, actuellement système Wemmeliën. Es werden die Arten aufgezählt, welche dem Wemmeliën, den Sables moyens in Frankreich und dem Thon von Barton in England gemeinsam sind, 67 Arten.
- p. XVIII. *Van den Broeck et Paul Gogels*, Diluvium et Campinien. Réponse à Mr. le Dr. Winkler.

Folin, Leopold de, et Leon Périer, Notice sur les Fonds de la Mer. — In Mem. Soc. Sciences phys. nat. Bordeaux. 2. Ser. tome II. cah. 3.

Gibt eine kurze Uebersicht der Forschungen über den Boden der Tiefsee und deren Resultate.

Folin, Leopold de, Faune lacustre de l'ancien Lac d'Ossegor. Mit 2 Tafeln. Bayonne 1879.

Behandelt die nun durch einen Meereseinbruch vernichtete Fauna des Sees von Ossegor bei Cap Breton, wo in einem kaum brakischem Wasser neben *Limnaea*, *Physa* und *Planorbis* auch *Serobicularia piperata* und *Hydrobia ulvae* lebten, und bespricht namentlich ausführlich die Verkümmernng von *Limnaea limosa* und deren Ursachen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht. 58-60](#)