

- Poulsen*, Dr. Justizrath. Kopenhagen.
Quarterly Journal of Conchology. Leeds, England.
Scharff, R. Edinburgh, England.
Schepman, M. M. Rhoon bei Rotterdam.
Schmacker, B. Hongkong.
Schneider, G., Zoologisches Comptoir. Basel.
Smith, E. A., British Museum. London.
Société malacozoologique. Bruxelles, Belgique.
Società malacologica italiana. Pisa, Italia.
Sterki, Dr. med. Mellingen, Kanton Aargau.
Studer, Prof. Dr. T. Bern.
Thièsse, Madem. J. Chalcis, Euböa, Griechenland.
Tapparone-Canefri, Dr. C. Torino.
Verkrüzen, T. A. London.
Westerlund, Dr. C. A. Ronneby, Schweden.

Etwaige Berichtigungen und Zusätze sehr erwünscht.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozologie.

Gehäuseschnecken auf den grünen Schiefern des Taunus.

Von

Dr. Friedrich Kinkel.

Durch ein paar nach dem Kamme des Hainkopfes bei Eppstein im Taunus ausgeführte Excursionen ist es nun ausser Zweifel gestellt, dass eine originale, aber auch nichts weniger als arme Conchylienfauna im Taunus existirt, die bis dahin übersehen worden ist. Dieselbe beschränkt sich jedoch meinen Beobachtungen nach einzig auf den grünen oder Hornblende-Schiefer (Nachrichtsbl. d. mal. Ges. 1880 S. 58); der schmale, durch Buchenwald sich ziehende, aus wirt durcheinander liegenden quarzreichen Blöcken bestehende Rücken des Hainkopfes erreicht eine Höhe, die um wenig geringer ist als die der Rossertspitze. Nach der geologischen Karte von Dr. Carl Koch gehören beide

Höhen demselben Schieferzuge an. Ich führe die Hainkopff-
fauna gesondert auf, weil sie trotzdem nicht unwesentliche
Unterschiede aufweist, verglichen mit der nachbarlichen
des Rossert. Sie besteht aus:

Helix pomatia L. in grosser Menge und in colossalen
Exemplaren von fast 50 mm Höhe und Breite.

Helix nemoralis L. ziemlich häufig in folgenden Varie-
täten: fleischroth 0 0 0 0 0; citronengelb 0 0 3 4 5 mit
braunschwarzen Bändern, ebenso gelb 1 2 3 4 5 und
röthlich gelb, klein 1 2 3 4 5; ferner röthlich gelb und
klein, 1 2 3 4 5 mit schwarzen Bändern.

Helix hortensis Müll., ziemlich häufig, in folgenden
Varietäten: hellgelb 0 0 0 0 0; olivengelb mit hell-
braunen Bändern 1 2 3 4 5; hellgelb 1 2 3 4 5, fleisch-
roth-rothbraun 0 0 0 0 0, endlich bräunlichgelb 0 0 0 0 0,
so gross wie eine kleine *nemoralis*, Lippe und Nabel
schwarz. Das Thier wurde leider auf seinen Liebes-
pfeil nicht untersucht.

Helix lapicida L. häufig; *Helix incarnata* Müll. ziemlich
häufig; *Helix obvoluta* Müll. selten, ebenso *Helix*
rotundata Müll.

Hyalinia cellaria Müll. häufig, *Hyalinia nitidula* Drap.
selten, ebenso *Hyalinia Hammonis* Ström.

Vitrina major C. Pfeiff. nicht häufig.

Napaeus obscurus Müll. selten, ebenso *Pupa pusilla* Müll.
und *Pupa doliolum* Brug.

Clausilia biplicata Mont. mit 2 Gaumenfalten ziemlich
häufig, ebenso *Clausilia bidentata* Ström; *Clausilia*
laminata Mont. nicht selten.

Die Gehäuse, auch diejenigen der noch lebenden Clau-
silien, sind meist recht unansehnlich und lassen den
Aufenthalt im Wald wohl erkennen; bei *Cl. biplicata*
sind vielfach die Rippen sehr flach, fast verschwunden,

wie abgerieben, ohne dass das Thier in diesem kalkarmen Gebiete sie zu erhalten oder wieder zu ersetzen vermag.

Direkt unter der Spitze des Rossert, im Walde sammelte ich:

Helix pomatia L. ebenfalls gross und häufig.

Helix hortensis Müll. hellgelb 00000 und gelbroth 00000, der var. *fuscolabiata* nahe.

Helix lapicida ziemlich häufig, ebenso *Helix incarnata* Müll. häufig.

Helix rotundata, mutatio *albina*, weisslich grau, der braunen Flecken gänzlich entbehrend.

Hyalinia cellaria nicht selten, *Hyalinia pura*, mit hohem Gewinde *albin*, typ. selten.

Hyalinia fulva, hellhornfarbig, selten.

Vitrina major häufig.

Clausilia laminata Mont. zum Theil form. *albin*., ziemlich selten; *Clausilia bidentata* Ström häufig und *Clausilia biplicata* Mont. und form. *albin*.

Das auffälligste an diesen Conchylien der Rossertspitze ist der bei verschiedenen Mollusken auftretende Mangel an Farbstoff; es spricht sich derselbe im Albinismus der Schalen, wie auch in dem der Thiere aus. Das Thier von *Clausilia biplicata albina* z. B. ist ganz hellgrau, fast weiss. Damit mag wohl auch in Beziehung stehen, dass die *Helix hortensis*, die am Hainkopf stark und dunkel gebändert erscheint, hier gänzlich der Bänderung entbehrt. Was nun die quantitative Entwicklung angeht, so betrugen z. B. bei *Clausilia biplicata* die Albinos mehr als ein Drittel der Gesamtzahl. Zusammen auf einem mit Moos bewachsenen Felsen in dichtem Kleinwald fanden sich albine und normale Thiere. Einen anderen Unterschied, z. B. in der Grösse konnte ich unter denselben nicht erkennen, wohl aber verbindet diese Formen eine Anzahl Exemplare, bei denen man zweifelhaft ist, ob sie zu den albinen zu stellen

sind? Albine *Clausilia biplicata* zu züchten ist mir nicht gelungen. Es ist begreiflich, dass man an die Kalkarmuth des Hornblendeschiefers als mögliche Ursache dieser Abnormität denkt, mehrfach sieht man die glattschaligen *Clausilia laminata*, auch *Helix hortensis*, niemals jedoch die gerippten *biplicata*, von kalkhungrigen Standesgenossen stark in Grübchen angefressen. Von *Clausilia bidentata* fand ich nicht ein albinus Exemplar; es scheinen somit nicht alle Conchylien unter sonst gleichen Lebensbedingungen in gleichem Maasse zu Albinismus zu neigen. Bei Herrn Dr. Böttger sah ich das vielleicht einzig existirende Exemplar einer vollkommen albinen *Clausilia bidentata* Ström von Vollenborn. So wie die Sache hier liegt, scheint es mir auch das Wahrscheinlichste, *Nachrichtsbl. d. mal. Ges. 1878 pag. 33 und pag. 70*, dass in früherer Zeit hier auf dem Rossert die Faktoren sich eingefunden haben, die den Albinismus hervorrufen — wie Lichtmangel, Feuchtigkeit etc. und dass die albinen Thiere sich dann derzeit albin fortgepflanzt haben. Von diesem Jahre könnte sicherlich das Vorwiegen dieser beiden Faktoren nicht behauptet werden.

Hier ist es vielleicht am Platze, einiges für die Conchylienfauna der im Taunus gelegenen Schlossruinen vielleicht Neue mitzutheilen. Diese Notizen verdanke ich Herrn Eduard Morgenstern dahier. Derselbe sammelte

auf der Ruine Hattstein: *Helix hispida* L. 1 Stück; *Helix obvoluta* Müll. und *Clausilia lineolata* Held 3 Stück; die Vermuthung Dr. Böttgers, dass letztere hier ausgestorben sei, bestätigt sich also nicht.

auf der Burgruine Königstein: *Helix hispida* L. häufig; *Helix costata* Müll.; *Helix hortensis* Müll. gelb 00000, braunroth 12345; *Clausilia biplicata* Mont.; *Clausilia bidentata* Ström und *Pupa muscorum* L.

auf der Ruine Falkenstein: *Helix sericea* Alder, an Bäumen gesammelt von Herrn Baron von Maltzan; *Helix*

sericea var. liberta Westerl. und form. albina; *Helix obvoluta* Müll.; *Helix hortensis* Müll. gelb 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, braunroth 0 0 0 0 0; *Clausilia laminata* Mont. 3 Stck.; *Claus. plicatula* wurde nicht gefunden —, *Vitrina pellucida* Müll. und *Cionella lubrica* Müll. sehr selten.

Zur Molluskenfauna von Cassel.

Zierenberg.

Von

F. H. Diemar.

Ungefähr drei Stunden entfernt von Cassel liegt in nordwestlicher Richtung das althessische Städtchen Zierenberg. Dasselbe wurde im Jahre 1293 von dem Enkel der heiligen Elisabeth, dem Landgrafen Heinrich I, genannt das Kind von Brabant, dem Stammvater des bis zum Jahre 1866 regierenden Fürstenhauses, gegründet.

Zwischen stattlichen, meist bewaldeten Bergen, die eine Höhe bis zu 1900 Fuss überm Meere erreichen, ist die Lage des Ortes im Thale, welches das Flüsschen Warne durchzieht, eine überaus malerische. Begrenzt wird hier das Thal auf der linken Seite des Flüsschens von dem Rohrberg, Bärenberg und dem Gudenberg, auf der rechten Seite von dem Dörnberg, Schreckenbergr und dem Scharenberg.

Auf dem Gudenberg sind nur noch spärliche Reste der ehemaligen Burg vorhanden, wogegen die Ruine der Scharenburg ausser einigen Mauern noch einen aus Kalksteinen erbauten hohen Thurm aufweist, der noch Jahrhunderte zu überdauern vermag.

Eine mächtige Familie bewohnte einst diese Burg; von ihr hatten sich zwei Stämme abgezweigt, die dann den

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Kinkelin Georg Friedrich

Artikel/Article: [Gehäuseschnecken auf den grünen Schiefern des Taunus. 7-11](#)