

No. 38.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

TAUSCH-CATALOG 1883 No. 1
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Binnen-Conchylien aus dem paläarktischen Faunengebiet.

(Fortsetzung.)

Die genaueren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.

	Mk.		Mk.
Helix		<i>variabilis</i> Drap.	0,10-20
<i>muralis</i> Müll.	0,10-20	<i>var. virgata</i> Mont.	0,10
<i>var. crispata</i> Ben.	0,20	<i>tergestana</i> Stossic	0,20
<i>undulata</i>	0,20	<i>luteata</i> Parreyss	0,30-40
<i>globularis</i> Ziegl.	0,20-30	<i>subprofuga</i> Stab.	0,10-30
<i>var. saracena</i>	0,30	<i>turbinata</i> Jan.	0,20-30
<i>platychela</i> Mke.	0,20-40	<i>hellenica</i> Bourg.	0,20-30
<i>sicana</i> Fér.	0,20-40	<i>variegata</i> Friev.	0,10-20
<i>Paciniana</i> Phil.	0,20-30	<i>maritima</i> Drap.	0,10-20
<i>scabruscula</i> Desh.	0,20-40	<i>submaritima</i> Desm.	0,20-30
<i>Gualtieriana</i> L.	0,80-1,50		
<i>Niciensis</i> Fér.	0,20-40	<i>cretica</i> Fér.	0,30
<i>serpentina</i> Fér.	0,10-20	<i>var. cauta</i> Westl.	0,10-20
<i>tetrazona</i> Jan.	0,30-40	<i>Adolfi</i> Pfr.	0,50
<i>strigata</i> Müll.	0,20-30	<i>stiparum</i> Rossm.	1-1,20
<i>var. surrentina</i>	0,20	<i>Arigonis</i> Rossm.	0,20-40
<i>var. Molteni</i>	0,20-30	<i>cespitem</i> Drap.	0,20-40
<i>carsoliana</i> Fér.	0,20-30	<i>neglecta</i> Drap.	0,20-30
<i>Nebrodensis</i> Piraj.	0,20-40	<i>candicans</i> Zgl.	0,10
<i>spiriplana</i> Oliv.	0,50-80	<i>Ammonis</i> Ad. Schm.	0,20-30
<i>caesareana</i> Parr.	0,50-80	<i>ericetorum</i> Müll.	0,10
		<i>homoleuca</i> Sablj.	0,20
<i>desertorum</i> Forskal	0,20-30	<i>Theodosiae</i> Clessin	0,30-40
<i>var. inflata</i>	0,30	<i>derbentina</i> Andr.	0,20-30
<i>desertella</i> Jick.	0,50-80	<i>instabilis</i> Ziegler	0,20-30
		<i>destituta</i> Charp.	0,20
<i>aspersa</i> Müll.	0,10	<i>bathyomphala</i> Charp.	0,20
<i>Mazzullii</i> Jan.	0,20-30	<i>filimargo</i> Kryn.	0,30
<i>pomatia</i> L.	0,10-20	<i>corrugata</i> Gmel.	0,20-40
<i>var. sinistrorsa</i>	2-3	<i>explanata</i> Müll.	0,20
<i>lucorum</i> Müll.	0,40-50	<i>Ledereri</i> Pfr.	0,20-40
<i>var. straminea</i>	0,50	<i>apicina</i> Lam.	0,10
<i>radiosa</i> Ziegl.	0,40-80	<i>costulata</i> Ziegl.	0,10-20
<i>secernenda</i> Rossm.	0,40-50	<i>profuga</i> Schmidt	0,10-20
<i>ligata</i> Müll.	0,20-30	<i>substriata</i> Clessin	0,20-40
<i>var. truentina</i>	0,30	<i>candidula</i> Studer	0,10
<i>minor</i>	0,20	<i>conspurcata</i> Drap.	0,10
<i>cincta</i> Müll.	0,20-30	<i>meda</i> Porro	0,20-30
<i>var. Pollini</i> da Campo	0,40	<i>pyramidata</i> Drap.	0,10-20
<i>melanostoma</i> Drp.	0,20-30	<i>Thiesseae</i> Mouss.	0,20-30
<i>lutescens</i> Zgl.	0,30-40	<i>tuberculosa</i> Conrad	0,20-40
<i>Godetiana</i> Kob. II. Qual.	0,50	<i>trochoides</i> Poiret	0,10-20
<i>aperta</i> Born	0,20-30	<i>verticillata</i> Parr.	0,10-20
		<i>syrensis</i> Pfr.	0,20-40
<i>Seetzeni</i> Koch	0,20-40	<i>Newka</i> Dohrn	0,30-40
<i>var. fasciata</i>	0,40-50	<i>elegans</i> Gmel.	0,10
<i>pisana</i> Müller	0,10	<i>elata</i> Faure	0,20-30
		<i>Sequentiana</i> Ben.	0,20-30

	Mk.		Mk.
conoidea Drap.	0,10-20	Vescoi Bourg.	0,10-20
Pringi Pfr.	0,20-30	melampoides Lowe	0,30-40
ventricosa Drap.	0,10-20	oryza Lowe	0,20
acuta Müll.	0,10	vitrea Webb	0,20
Buliminus		tornatellina Lowe	0,20
detritus Müll.	0,10	Hierosolymarum Roth	0,20-30
var. radiatus Brug.	0,10	acicula Müll.	0,10
„ corneus Mich.	0,30	Stenogyra	
labiellus v. Mart.	0,30-40	decollata Linné	0,10-20
fasciolatus Oliv.	0,40-50	Pupa	
Hohenackeri Kryn.	0,40-60	pallida var. amytta Parr.	0,10-20
tauricus Lang	0,30-50	cinerea Drap.	0,10-20
v. zebriola Cless.	0,30	frumentum Drap.	0,10
bidens Kryn.	0,20-40	var. pachygastrls Zgl.	0,20
Retowskianus Cless.	0,30-50	„ apennina Charp.	0,10-20
zebra Oliv.	0,10	„ elongata Rossm.	0,10-20
var. boeticus	0,20	variabilis Drap.	0,10-20
Tournefortianus Fér.	0,80-1	affinis Rossm.	0,30-40
gibber Zgl.	0,40-50	pyrenaearia Boub.	0,20-30
montanus Drp.	0,10	megachilos Jan.	0,10-20
obscurus Müll.	0,10	var. bigorriensis	0,20
labrosus Oliv.	1	avenacea Brug.	0,10
var. diminutus Mss.	0,60	bergamensis Charp.	0,10-20
sidoniensis Charp.	0,50-80	Kobelti Hid.	0,30-40
		Farinesii Desm.	0,20
attenuatus Mouss.	0,60-1	calpica Westerl.	0,30
pupa Brug.	0,20	Mühlfeldtii Kstr.	0,10
pusio Brod.	0,30-40	rhodia Roth	0,10-20
venerabilis Parr.	0,30-40	Philippii Cantr.	0,10
		dolium Mich.	0,10-20
tridens Müll.	0,10-20	doliolum Brug.	0,10
var. eximia	0,20	var. scypus Friv.	0,10
„ Bayeri Parr.	0,30-40	Schmidti Kstr.	0,40
Bergeri Roth	0,20-30	Kokeili Rossm.	0,20-30
niso Risso	0,20-30	truncatella Zgl.	0,20-30
quadridens Müll.	0,10-20	biplicata Mich.	0,20-30
Thiesseanus Mouss.	0,20	var. excessiva Gredler	0,30
var. minor Blanc	0,20	Ferrarii Porro	0,10-20
Sauleyi Bourg.	0,30-40	pagodula Desm.	0,20
ovularis Oliv.	0,20-30	muscorum Linné	0,10
septemdentatus Roth	0,20-30	triplicata Studer	0,20
var. elongatus Roth	0,40	edentula Drap.	0,10-20
chondriformis Mouss.	0,30	minutissima Hartm.	0,10-20
obtusa Drp.	0,40-50	costulata Nilss.	0,10-20
Cionella		antivertigo Drap.	0,10
lubrica Müller	0,10	Lilljeborgi Westerl.	0,20-30
maderensis Lowe	0,20	pygmaea Drap.	0,10
tridens Pult.	0,20-30	pusilla Müll.	0,10-20
var. Noulletiana Dup.	0,30	angustior Jeffr.	0,10
pupaeformis Cantr.	0,30	Balea	
folliculus Gronov.	0,10	fragilis Drap.	0,10-20

Bei sofortiger Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschvereins 10 % Rabatt.

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren.

Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut

Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

TAUSCH-CATALOG 1883 No. 2
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

		Mk.			Mk.
Oliva.			Callianax		
Araneosa Lam.	Calif.	0,30-60	biplicata Sow.	Calif.	0,20-50
carneola Gmel.	Philipp.	0,20-30	columellaris Sow.	Peru	0,10-20
Cumingi Reeve	Panama	1-1,20	semistriata Gray	Columb.	0,10-20
dama Mawae	Calif.	0,20-50	Dipsacus		
erythrostoma Lam.	Oc. ind.	0,30-1	glabratus L.	Ceylon	0,40-1
episcopalis "	Maur.	0,30-50	Fasciolaria		
elegans "	Philipp.	0,30-50	filamentosa Lam.	Philipp.	1-1,50
flammulata "	Sénégal	0,20-60	var. inermis Jon.	m. rubr.	1
fusiformis "	Oc. ind.	0,50-1	salmo Brod.	Panama	1-2
graphica Marat	Real Llejos	0,30-50	trapezium L.	"	0,50-1
guttata Lam.	Philipp.	0,30-60	tulipa L.	Ind. occ.	0,50-1,50
inflata Lam.	Sansibar	0,20-30	Tudicla		
ispidula L.	Philipp.	0,10-30	spirillus L.	Singapore.	1-2
ligneola Reeve	Macacaibo	0,80-1	Turbinella		
litterata Lam.	Ind. occ.	0,20-50	armata Brod.	Elisabeth-I.	1-2,50
Keeni Mar.	Viti Ins.	0,60-80	ceramica L.	Philipp.	2-3
maura Lam.	Philipp.	0,50-1	cornigera Lam.	"	0,50-1
panniculata Ducl.	Ind. occ.	0,20-30	rhinoceros Chem.	Sansibar	0,60-1,50
ponderosa Ducl.	Maur.	0,40-50	Leucozonia		
peruviana Lam.	Peru	0,50-1	brasilia d'Orb.	Bras.	1-2
porphyrea "	Panama	1-4	cingulata Lam.	Panama	1-1,50
reticularis "	Ind. occ.	0,30-60	nassa Gmel.	Ind. occid.	1-2
sanguinolenta "	Molukk.	0,20-40	rudis Reeve	"	2
scripta "	Aust.	0,40-80	Plicatella		
tesselata "	Philipp.	0,20-40	brevicaudata Reeve	Ind. occ.	2-3
tremulina "	"	0,40-1	candelabrum "	"	1-2
var. = nobilis Reeve	"	0,60-1,50	castanea Reeve	Panama	3,50
tricolor Lam.	Maur.	0,20-40	craticulata Gmel.	Austr.	0,50-1,20
Olivancillaria			Carottiana Tapp.	Maur.	0,80-1,50
brasiliensis Chem.	Bras.	0,50-1,20	gibbula Gmel.	Austr.	1-2
gibbosa Born	Oc. ind.	0,30-80	infundibulum Gmel.	Ind. occ.	1-2
nebulosa Lam.	Salanga	0,50-80	Kobe ti Tapp.	Maur.	0,60-1
Aragonia			lancea Gmel.	Ticao	4-5
Steeriae Reeve	Gambia	0,40-60	maculata Reeve	Philipp.	0,50-1,50
Olivella			nodata Mart.	Austr.	1-2,50
nivea Gmel.	Ind. occ.	0,10-20	polygona Gmel.	Philipp.	1-1,50
var. monilifera Reeve	"	0,10-30	prismatica Reeve	Freundsch.	5
" oryza Lam.	"	0,10	turrita Gmel.	Philipp.	0,50-1
jaspidea Gmel.	"	0,20-30	Wagneri Anton	"	0,60-80
mutica Say	S. Carolina	0,10-20	Peristernia		
rosalina Duclos.	Jamaica	0,20-30	Forskali Tapp.	m. rubr.	0,40-60
ruffasciata Reeve	"	0,30-40	nassatula Lam.	Oc. ind.	0,50-80
tergina Duclos.	Panama	0,30-40	spinosa Mart.	Freundsch.-I.	0,80-1,20
volutella Lam.	"	0,10-20	Voluta		
undatella "	Acapulco	0,10-30	angulata Sow.	Patagonien	3-6
			fusiformis "	Austr.	4-6
			Ellioti "	"	3-4

		Mk.		Mk.
<i>mitraeformis</i> Lam.	Austr.	5—6	<i>olivacea</i> Reeve	Maur. 0,60-1
<i>marmorata</i> Swains.	"	12—18	<i>olivaefomis</i> Sw.	N.-Caled. 0,80-1
<i>Norrisi</i> Sow.	"	2—3	<i>pacifica</i> Reeve	Hoods-Is. 0,50-60
<i>pacifica</i> Sow.	N. Seel.	4—5	<i>Rüppelli</i> Reeve	Massaua 0,50-80
<i>Scapha</i> Chem.	Philipp.	1-2,50	<i>scabriuscula</i> Lam.	Maur. 0,80-1,20
<i>vexillum</i> L.	Ceylon	3—4	<i>spadicea</i> Dunker	Samoa-I. 0,50
<i>vespertilio</i> L.	"	0,50-1	<i>speciosa</i> Reeve	Maur. 1
Lyria				
<i>deliciosa</i> Bern.	N.-Caled.	6—9	<i>sphaerulata</i> Mart.	Philipp. 1—2
Mitra				
<i>adusta</i> Lam.	Philipp.	1—2	<i>stigmataria</i> Lam.	Maur. 3
<i>ambigua</i> Swains.	"	1-1,50	<i>ticaonica</i> Reeve	Philipp. 0,50-1
<i>angulosa</i> Kiener	Maur.	1-1,20	<i>tabanula</i>	Maur. 0,50-60
<i>annulata</i>	Ceylon	0,80-1	<i>thiarella</i> Sow.	" 0,60-80
<i>aureolata</i> Reeve	Maur.	0,60-80	<i>tigrina</i> A. Ad.	" 0,60-1
<i>brumalis</i>	"	0,60-1	<i>tuberosa</i> Reeve	" 0,60-80
<i>cadaverosa</i>	"	0,40-60	<i>turgida</i>	Samoa-I. 0,50-60
<i>cardinalis</i> Lam.	Philipp.	2	<i>turben</i>	Philipp. 1,50
<i>casta</i> Sol.	Maur.	2,50	<i>venustula</i>	Maur. 0,40-60
<i>circulata</i> Kien.	Ceylon	1-1,20	<i>variegata</i>	" 0,80-1,20
<i>caffra</i> Lam.	"	2	<i>vulpecula</i> Lam.	Philipp. 0,60-1,20
<i>cinerea</i> Reeve	Maur.	0,40-50	Conchelix	
<i>clathrata</i>	"	0,80-1	<i>marmorata</i> Swains.	Pelew-I. 0,30-40
<i>crocata</i> Lam.	"	1-1,20	Marginella	
<i>crenulata</i>	Philipp.	0,80 1,20	<i>advena</i> Kien.	St. Thomas 0,20 30
<i>Cumingi</i> Reeve	Maur.	1-1,50	<i>amygdala</i> Lam.	Goree 0,50-60
<i>cucumerina</i> Lam.	"	0,60-80	<i>cincta</i> Kiener	" 2
<i>costellaris</i> Lam.	Molukken	0,80-1	<i>cingulata</i> Dillw.	" 0,10-30
<i>corrugata</i>	Philipp.	0,60-1,20	<i>Cleryi</i> Petit	" 2
<i>dactylus</i>	"	2	<i>conoidalis</i> Lam.	Cuba 0,20-30
<i>exasperata</i> Chem.	Viti-I.	0,50-60	<i>curta</i> Sow.	Peru 1-1,20
<i>episcopalis</i> L.	Oc. ind.	1-1,50	<i>diaphana</i> Kien.	Ind. occ. 0,20-30
<i>ferruginea</i> Lam.	Maur.	0,50-1,20	<i>glabella</i> L.	Gorée 1—2
<i>filaris</i> L.	"	0,50-1	<i>Goodalli</i> Sow.	" 12—20
<i>fissurata</i> Lam.	"	2	<i>guttata</i> Dillw.	Jamaica 0,20-30
<i>filum</i> Wood	"	0,50-1	<i>lactea</i> Kien.	St. Thomas 0,20-30
<i>fulva</i> Sow.	"	0,80-1,20	<i>laeta</i> Jouss.	Gorée 1-1,50
<i>harpaefomis</i> Reeve	Dahlak-I.	0,30-50	<i>interrupta</i> Lam.	PortoCabello 0,10-20
<i>impressa</i> Ant.	Maur.	0,60-1	<i>monile</i> Lam.	Gorée 0,20
<i>lutea</i> Quoy	"	0,50-80	<i>pallida</i> L.	St. Jan 0,30-50
<i>muriculata</i> Lam.	"	0,60-1	<i>philippinarum</i> Reeve	Zebn 0,30-40
<i>nodosa</i> Reeve	"	0,60-80	<i>olivaefomis</i> Kien.	Gorée 1—2
<i>nucea</i> Gronov.	"	1-1,50	<i>persicula</i> Lam.	" 0,30-50
<i>obeliscus</i> Reeve	"	1	<i>pseudofaba</i> Sow.	" 12—16
			<i>prunum</i> Gmel.	Ind. occ. 0,30-60
			<i>quinqueplicata</i> L.	Molukk. 0,50-1
			<i>varia</i> Sow.	Calif. 0,20-30

Bei sofortiger Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschvereins 10 % Rabatt.

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren.

Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut

Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

TAUSCH-CATALOG 1883 No. 3

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Binnen-Conchylien

aus dem präæretischen Faunengebiet.

(Fortsetzung.)

Die genaueren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben

	Mk.		Mk.
<i>Clausilia.</i>			
agnata Partsch	0,10	var. triplicata Stud.	0,20
Adelinae Ben.	0,20-30	costulata Jan.	0,20-30
armata Kutschig	0,20 40	cana Held	0,10-20
almissana Küst.	0,20	clandestina Rossm.	0,30
albocincta Pfr.	0,20	f. minor	0,30
aquila Parr.	0,30	coarctata Mouss.	0,20-30
Agasilao v. Mart.	0,30	corynodes Held	0,10-20
archilabris Kutsch	0,20	cincta Rossm.	0,10-20
var. Rosinae Klec.	0,30-40	var. Rossmæssleri Pfr.	0,10-20
affinis Phil.	0,20	Stenzi Parr.	0,10-20
Alschingeri Küst.	0,30-40	concilians A. Schmidt	0,10-20
angustata Bielz	0,30	commutata Rossm.	0,10-20
asphaltina Zgl.	0,20	var. granatina	0,10-20
attica Parr.	0,20-30	var. fusca de Belta	0,10-20
bidens L.	0,10	var. unguolata Zgl.	0,10-20
bidentata Ström.	0,10	canescens Parr.	0,10-20
var. septentrionalis	0,10	crassilabris Küst.	
biplicata Mtg.	0,10	var. pharensis Klec.	0,30-40
subsp. bohémica Cl.	0,20-30	„ fasciolata Parr.	0,20-30
blanda Zgl. typus	0,40 50	dacica Friv.	0,30
bilabiata Wagn.	0,20-30	dubia Drap.	0,10
Blanci v. Mart.	0,20	var. transylvanica A. Schm.	0,20
Bergeri Mayer	0,10-20	densestriata Zgl.	0,10-20
binodata Zgl.	0,20	deltostoma Lowe	0,20
Boissieri Charp.	0,20-30	var. undulata Parr.	0,20
Bielzi Pfr.	0,20	dalmatina Partsch	0,20
bicristata Friv.	0,20	var. minor	0,20
var. tetragonostoma Pfr.	0,20-30	discolor Pfr.	0,30
„ canaliculata	0,20	var. flamulata Pfr.	0,20-30
Balsamoi Strobel	0,20-30	divergens Klec.	0,30-40
bilabiata Wagn.	0,20-30	Duboisii Charp.	0,20-30
cattaroensis Zgl.	0,10-20	decipiens Rossm.	0,20-30
conspurcata Jan.	0,10	exarata Zgl.	0,10-20
caerulea Fér. typus	0,10-20	elata Zgl.	0,20
subg. amorgis Bttg.	0,10-20	elegans Bielz	0,20
f. tinorensis Mouss.	0,10-20	var. cerasina Bielz	0,20-30
var. birugosa Parr.	0,10-20	fimbriata Mühlf.	0,10-20
f. antiparia Bttg.	0,10-20	var. pallida Jan.	0,10-20
f. naxia Bttg.	0,10-20	„ suturata Zgl.	0,10-20
f. nia Bttg.	0,10-20	Fusiana Bielz	0,20
candidescens Zgl.	0,10	filograna Zgl.	0,10-20
var. cinerea Phil.	0,10-20	fallax Rossm.	0,20
Conemenosi Bttg.	0,30-40	grayana Pfr.	0,30
chia Bttg. var. samia Bttg.	0,20-30	gibbula Zgl.	0,10
callifera Küst.	0,20-30	subsp. peucetana Kobelt	0,20
Calcarae Phil.	1	Grohmanniana Partsch	0,20-30
comensis Shuttl.	0,20-30	glauca Bielz	0,20
cruciata Stud.	0,10	grisea Desh.	0,10-20

	Mk.		Mk.
gastrolepta Zgl.	0,20	var. cornea Zgl.	0,10
grossa Zgl.	0,20-30	plicata Drap.	0,10
Haueri Bielz	0,30-40	parvula Stud.	0,10
Helena Klec.	0,40-50	punctulata Küst.	0,10
isabellina Pfr.	0,20	piceata Zgl.	0,20
itylensis Bttg.	0,50-60	var. gracilior	0,20
interrupta Zgl.	0,10-20	Pikermiana Roth	0,20
itala v. Mart.	0,10-20	Pfeifferi Küst.	0,20
var. punctulata Mich.	0,10-20	pachygastris Zgl.	0,20
var. ornata	0,10-20	var. bulla Parr.	0,20
var. nigra	0,10-20	pachystoma Küst.	0,20
incommoda Bttg.	0,20-30	profuga Charp.	0,30-40
incisa Küst.	0,20	pachychila Zgl.	0,20
Josephinae Bttg.	0,30-50	pumila Zgl.	0,10-20
Kutschigi Küst.	0,30-40	Pauli Mabilie	0,30-40
var. contracta	0,30	plicata Drap.	0,10
Kephissiae Roth	0,20-30	var. sine plicis	0,10-20
var. holostoma Bttg.	0,30-40	plicatula Drap.	0,10
laminata Mtg.	0,10	pagana Zgl.	0,20-30
leucostigma Zgl.	0,10	regalis Parr.	0,20
var. candidilabris Porro	0,10	regularis Parr.	0,30-40
„ opalina	0,20	rugosa Drap.	0,10-20
lunellaris Pfr.	0,20	var. monziana Lowe	0,20-30
livida Menke	0,20	„ Reboudi Dup.	0,20
var. minor A. Schm.	0,20	Rothi Zel. v. eustrophe Bttg.	0,40-50
Lischkeana Parr.	0,10-20	Rosinae Klec.	0,50-60
var. cornea A. Schm.	0,10-20	rugicollis Zgl.	0,20-30
leucoraphe Blanc	0,30-40	robusta Küst.	0,30
laevissima Zgl.	0,10-20	straminicollis Parr.	0,10-20
f. superstructa Partsch	0,20	sericata Pfr.	
Lowe Albers	0,60-80	var. biflosa Blanc	0,30
lineolata Held	0,10	sulcosa Wagner	0,20
lamellosa Wagn.	0,20	strigillata Mühlf.	0,20
maesta Fér.	0,20-30	syracusana Phil.	0,20-30
maculosa Desh.	0,20-30	septemplicata Phil.	0,20-30
messenica v. Mart.	0,20	solida Drap.	0,10-20
marginata Ziegl.	0,20	stigmatica Zgl.	0,20-30
montana Sten.	0,20-30	semilabiata Kutsch	0,20-30
mucida Ziegl.	0,10-20	semirugata Ziegl.	0,20
v. badia Zgl.	0,10-20	var. narentana K.	0,20-30
maritima Klec.	0,30-40	succineata Zgl.	0,10-20
Menelaos v. Mart.	0,20-30	stabilis Ziegl.	0,20-30
macarana Zgl.	0,20-30	sejuncta A. Schmidt	0,20
naevosa Fér.		turrita Pfr.	0,20
var. senilis Rossm.	0,20-30	virgata Jan. sp.	0,20
„ modesta Zgl.	0,20	ventricosa Drap.	0,10-20
negropontina Pfr.		varians Zgl.	0,10-20
var. costulata Thiesse	0,20-30	var. diaphana Zgl.	0,10-20
osculans v. Mart.	0,20-30	vallata Mouss.	0,30-50
orthostoma Mk.	0,10	vetusta Ziegl.	0,20
f. filiformis A. Schm.	0,10-20	var. festiva Küst.	0,10-20
ornata Zgl.	0,10-20	var. striolata Parr.	0,20-30
plumbea Rossm.	0,10-20	vibex Rossm.	0,20

Bei sofortiger Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschvereins 10 % Rabatt.

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren.

Briefe einfach an die

„LINNÆA“, Naturhist. Institut

Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Preisverzeichniss IV

verkäuflicher Mollusken d. Kaukasusländer

aus Hrn. H. Leder's Ausbeute 1882.

Alle angebotenen Stücke sind untadelhaft in Form und Farbe;
 † bedeutet nicht ganz tadellos. Preise in Reichsmark und Pfennigen;
 Emballage zum Selbstkostenpreis; Porto wird extra berechnet.

1 Mark = 1 Schilling = 1,20 Francs.

		Exemplare			
		1	2	4	6
Trigono-chlamys	imitatrix Bttg. in Spiritus 7,50 bis	10	—	—	—
Daubebardia	Lederi Bttg. in Spir. od. Schale 5,00 bis	7,50	—	—	—
"	Heydeni Bttg. desgl.	5,00	—	—	—
Glandina	Algira var. Mingrelica Bttg.	1,50	2 80	—	—
Limax	ecarinatus Bttg. in Spiritus	4,00	—	—	—
"	variegatus Drap. desgl.	0,60	1,10	—	—
"	agrestis L. var. desgl.	0,50	0,90	—	—
"	melanocephalus Kal. desgl.	0,40	0,75	1,20	1,60
"	intermittens Bttg. desgl.	3,00	—	—	—
Amalia	Lederi Bttg. desgl. 5,00 bis	7,50	—	—	—
"	Brandti v. Mart. desgl. 5,00 bis	7,50	—	—	—
Parnacella	Olivieri Cuv. desgl.	1,00	1,75	3,00	4,00
"	" Schale allein	0,60	1,10	1,80	2,40
†Vitrina	annularis Stud. todt gesammelt	0,40	0,75	—	—
"	(Trochovitrina) Lederi Bttg. in Spiritus	1,00	1,80	—	—
†	" " " todtte Schale	0,60	1,10	—	—
†	" " subcarinata Bttg. (jung)	1,00	1,80	—	—
Hyalinia	fulva Müll.	—	0,20	—	0,40
†	" (Conulopolita) Raddei Bttg. todt gesammelt	4,00	—	—	—
†	" suturalis Bttg. Mundsäum verletzt	0,75	1,40	—	—
"	cellaria var. Sieversi Bttg.	0,50	0,90	1,50	2,00
†	" pura Ald.	—	0,25	—	0,50
"	contortula Kryn.	0,40	0,70	1,20	1,60
"	angystropha Bttg.	1,75	3,00	—	—
"	nitida Müll.	0,20	0,35	0,65	0,80
†	" (Retinella) Mingrelica Mouss. typ.	3,00	—	—	—
"	" " var. intermissa Kob.	2,00	3,80	—	—
"	" " Kutaisiana Mouss. typ.	0,75	1,35	2,25	3,00
"	" " var. transitans Bttg.	1,00	1,90	—	—
"	" " filicum Kryn.	0,80	1,40	2,40	3,60
"	" " Duboisi Charp.	2,00	3,80	—	—
"	" " elegans Bttg.	1,50	2,75	4,50	—
†	" " Suanetica Bttg.	2,50	—	—	—

		Exemplare			
		1	2	4	6
Patula	rupestris Drap.	—	0,20	—	0,40
"	pygmaea Drap.	—	—	—	0,20
"	Lederi Bttg.	1,50	2,75	—	—
"	runderata Stud.	0,25	0,40	0,70	1,00
Helix	aculeata Drap.	—	—	—	0,20
"	pulchella Müll.	—	0,20	—	0,35
"	costata Müll.	—	—	—	0,20
"	globula Kryn. typ. und f. nana Bttg.	0,60	1,10	1,80	2,40
"	Talyschana v. Mts.	6,00	—	—	—
"	flaveola Kryn. typ.	1,75	3,00	—	—
"	" f. pallida Bttg.	1,50	2,75	4,50	—
"	" f. castanea Bttg.	2,50	—	—	—
"	Circassica Charp.	1,00	1,75	3,00	4,00
"	frequens Mouss. typ.	0,30	0,55	0,90	1,20
"	(Nummulina) Prometheus Bttg.	2,00	3,80	—	—
"	Ravergieri Kryn. typ.	1,75	3,25	—	—
†	" var. Transcaucasia Mouss.	1,00	1,80	—	—
"	Narzanensis Kryn. typ.	0,30	0,55	0,90	1,20
"	" var. cyclothyra Bttg.	0,80	1,50	—	—
†	" var. Suanetica Bttg.	1,00	1,80	—	—
†	" var. olivacea Bttg.	0,40	0,75	—	—
"	" var. Appeliusi Mouss. (abgerieben)	0,75	1,45	—	—
"	(Fruticocampylaea) flavolimbata Bttg. 3,00 bis	5,00	—	—	—
"	pratensis Pfr.	0,60	1,10	1,80	2,40
"	" f. major m.	0,70	1,30	—	—
"	(Fruticocampylaea) Pontica Bttg. u. var.	1,50	2,90	5,40	—
"	Derbentina Andr. u. var.	0,20	0,35	0,65	0,80
"	Krynicky Andr. u. var.	0,25	0,45	0,75	1,10
†	crenimargo Kryn., meist todt gesammelt	0,60	1,10	1,80	2,40
"	atrolabiata Kryn. var. subnemoralis v. Mts.	0,80	1,40	2,40	3,60
"	" " f. tricolor Bttg.	1,50	—	—	—
"	" " f. maculato-fasciata Bttg.	1,00	—	—	—
"	" " f. decussata Bttg.	1,25	—	—	—
"	" var. Pallasi Dub.	2,00	—	—	—
"	" var. Stauropolitana A. Schm.	1,00	1,80	—	—
"	" var. Lencoranea Mouss.	0,50	0,90	1,50	2,00
"	" " f. unicolor Bttg.	2,00	—	—	—
"	Buchi Dub. f. minor Bttg.	1,75	3,25	—	—
Buliminus	Hohenackeri Kryn.	0,20	0,40	0,60	0,80
"	(Retowskia) Schlaeflii Mouss. todt ges.	10	—	—	—
"	(Ena) Boettgeri Cless. (tener ol.)	1,50	2,75	—	—
"	" Caucasus Pfr., todt ges. 2,00 bis	3,00	—	—	—
"	(Chondrula) Lederi Bttg.	1,25	2,25	—	—
"	tridens Müll. und f. marcida m.	0,20	0,40	0,60	0,80
"	" var. eximia Rsm.	0,40	0,75	1,20	1,60
"	" var. Kubanensis Mouss.	0,50	0,90	—	—
"	didymodus Bttg.	0,60	1,10	1,80	2,40
"	lamelliferus Rsm. var. Phasianus Dub.	0,20	0,40	0,60	0,80

Exemplare

	1	2	4	6
<i>Cochlicopa lubrica</i> Müll. typ.	—	0,20	0,35	—
„ „ var. <i>minima</i> Siem.	—	—	0,20	—
„ „ var. <i>columna</i> Cless.	0,20	0,35	0,60	0,80
Pupa <i>granum</i> Drap.	—	0,20	0,40	0,50
„ <i>avenacea</i> Brug.	—	—	0,20	0,30
„ <i>muscorum</i> var. <i>Caucasia</i> Bttg.	—	0,30	0,50	0,60
„ <i>triplicata</i> Stud. und var.	0,20	0,35	0,60	0,80
„ <i>interrupta</i> Reinh.	0,40	0,70	1,20	1,60
„ <i>cylindracea</i> Da Costa	—	—	—	0,20
„ <i>Semproni</i> Charp. typ.	0,50	—	—	—
„ „ var. <i>Caspia</i> Pfr.	0,50	0,90	1,50	—
„ <i>superstructa</i> Mouss. typ.	0,30	0,55	0,90	1,20
„ „ var. <i>zonata</i> Bttg.	0,50	0,90	—	—
„ <i>doliolum</i> Brug.	—	—	—	0,20
„ <i>Raymondi</i> Bgt.	0,60	1,10	1,80	2,40
„ <i>claustralis</i> Gredl. var. <i>clavella</i> Reinh.	0,40	0,70	1,20	1,60
„ <i>Strobeli</i> Gredl.	0,60	—	—	—
„ <i>costulata</i> Nilss.	—	—	—	0,20
„ <i>minutissima</i> Hartm., todt gesammelt	0,20	—	—	—
„ <i>pagodula</i> Desm. var. <i>Lederi</i> Bttg., desgl.	0,50	0,90	1,50	—
„ <i>antivertigo</i> Drap.	—	—	—	0,20
„ <i>pygmaea</i> Drap.	0,20	—	—	—
„ <i>Sieversi</i> Bttg. typ.	1,00	1,80	3,00	—
„ <i>pusilla</i> Müll.	0,20	0,40	—	—
„ <i>angustior</i> Jeffr.	0,30	—	—	—
<i>Clausilia perlucens</i> Bttg., todt gesammelt	3,00	—	—	—
„ (<i>Acrotoma</i>) <i>semicineta</i> Bttg.	2,00	3,80	—	—
„ <i>serrulata</i> Pfr.	0,60	1,10	1,80	2,40
„ <i>Sieversi</i> Mouss.	0,75	1,25	2,25	3,00
„ <i>semilamellata</i> Mouss.	0,50	0,90	1,50	2,00
„ <i>Lederi</i> Bttg. typ.	4,00	—	—	—
† „ „ var. <i>gradata</i> Bttg.	2,00	—	—	—
„ <i>litotes</i> A. Schm. typ.	0,25	0,40	0,70	1,00
„ „ var. <i>Suanetica</i> Bttg.	0,40	0,70	1,20	1,60
„ <i>Duboisii</i> Charp. u. f. <i>minor</i> Ad. Schm.	0,20	0,30	0,55	0,70
„ <i>Strauchi</i> Bttg.	1,00	1,80	3,00	—
„ <i>pleuroptychia</i> Bttg. var. <i>polygyra</i> Bttg.	0,80	1,50	2,40	3,20
„ <i>dipolauchen</i> Bttg.	0,90	1,70	2,70	3,60
† „ <i>pumiliformis</i> Bttg., schwach verletzt	5,00	—	—	—
„ <i>quadriplicata</i> A. Schm., abgerieben.	0,80	1,50	2,40	—
„ <i>derasa</i> Mouss. typ.	1,00	1,80	3,00	—
„ „ var. <i>Ossetica</i> A. Schm.	1,00	1,80	3,00	—
„ <i>Tschetschenica</i> Bay.	0,40	0,70	1,20	1,60
„ <i>foveicollis</i> Charp.	0,20	0,35	0,60	0,80
† „ <i>Gustavi</i> Bttg. 2,00 bis	4,00	—	—	—
„ (<i>Micropontica</i>) <i>closta</i> Bttg. nach Güte 3,00 bis	5,00	—	—	—
<i>Succinea putris</i> L. var., sehr kleine Form	0,30	0,55	—	—
„ <i>Pfeifferi</i> Rssm., kleine Form	0,30	0,55	—	—
<i>Carychium minimum</i> Müll. var.	—	—	—	0,20

Exemplare

	1	2	4	6
<i>Carychium Lederi</i> Bttg.	0,50	0,90	1,50	—
<i>Acme Moussoni</i> Bttg.	4,00	—	—	—
<i>Pomatias Lederi</i> Bttg.	1,00	1,90	—	—
<i>Cyclostoma costulatum</i> Rssm.	0,20	0,30	0,55	0,70
" " var. <i>Hyrcana</i> v. Mts.	0,30	0,55	0,90	1,20
<i>Cyclotus Sieversi</i> Pfr.	0,60	1,10	1,80	2,40
<i>Melanopsis praerosa</i> var. <i>Mingrelica</i> Mouss.	0,50	0,90	1,50	—
† <i>Neritina liturata</i> Eichw.	0,20	0,35	0,60	0,80
" <i>fluviatilis</i> var. <i>thermalis</i> Boub.	—	0,20	0,35	0,50
<i>Limneus tener</i> Parr., todt gesammelt	0,20	0,35	0,60	0,80
" <i>truncatulus</i> Müll., desgl.	0,20	0,35	—	—
" <i>pereger</i> Drap.	0,20	0,35	—	—
" <i>lagotis</i> Schrank, todt gesammelt	0,40	0,70	1,20	1,60
" <i>stagnalis</i> var. <i>turgida</i> Mke., desgl.	0,50	0,90	1,50	2,00
" " var. <i>lacustris</i> Stud.	0,60	1,10	1,80	2,40
<i>Planorbis umbilicatus</i> var. <i>subangulata</i> Phil.	0,20	0,35	0,60	0,80
" <i>glaber</i> Jeffr., todt gesammelt	0,20	0,35	0,60	0,80
<i>Corbicula fluminalis</i> var. <i>fluviatilis</i> Cless.	0,60	1,10	1,80	2,40
" " var. <i>crassula</i> Mouss.	0,80	1,50	—	—
<i>Pisidium fossarinum</i> Cless. var.	—	0,20	0,40	0,50
" <i>obtusale</i> C. Pfr.	0,40	0,70	—	—
<i>Unio Batavus</i> var. <i>Mingrelica</i> Drouët	0,60	1,10	—	—
<i>Anodonta anatina</i> L. var.	0,40	0,75	—	—
" <i>piscinalis</i> Nilss. var. <i>cyrea</i> Drouët	3,00	5,50	—	—

Adresse für Bestellungen: Hrn. Dr. O. Boettger,
Seilerstrasse 6, Frankfurt am Main.

TAUSCH-CATALOG 1883 No. 4
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

		Mk.			Mk.
Columbella.			Malea.		
bicolor Kiener	Panama	0,30-40	dentata Born	Mexiko	2-3
cribriaria Lam.	Cuba	0,10-20	pomum L.	Ind. or.	0,30-1
Duclosiana Sow.	Molucc.	0,20-30	Ficula.		
fulgurans Lam.	Oc. ind.	0,10-20	Dussimieri Val.	China	1-3
var. punctata	" "	0,10-20	ficus L.	Oc. ind.	1-2
laevigata L.	Cuba	0,10-20	ficoides L.	"	1-3
ligula Ducl.	I. Ticao	0,40-50	reticulata Lm.	Sooloo. Ins.	1-3
lyrata Sow.	Panama	0,30-40	Scalardia.		
major "	Amer. c.	0,50-60	Pallasii Kien.	Philippn.	2-3
mendicaria	M. ind.	0,20-30	pretiosa Lm.	China	6-18
mercatoria L.	W. Ind.	0,10	scaliola elata Semp.	Djedda	0,20-30
nitida Lam.	"	0,10-20	Terebra.		
pellucida Rv.	I. Viti	0,20-30	aciculata Lm.	Akapuleo	0,10-30
pardalina Lm.	I. Guimar	0,20-30	affinis Gray	I. Tahiti	0,20-40
rustica L.	M. med.	0,10-20	babylonia Lm.	"	0,50-60
subulata Ads.	W. Ind.	0,20-30	caerulescens Lm.	I. Viti	0,30-40
turturina Lm.	Maur.	0,20-40	cerithina Lm.	I. Timor	0,30-40
valga Gould.	I. Tolau	0,40-50	chlorata	I. Seychell.	0,60-80
Harpa.			hastata Gm.	Ind. oc.	0,30-40
articularis Lam.	Philippn.	0,50-1,50	crenulata L.	Maur.	0,80-1,50
conoidalis Lm.	Maur.	2-3	cingulifera Lm.	Philippn.	0,80-1,50
costata L.	Maurit.	10	monilis Quoy	I. Marq.	0,50-1
gracilis Brod. et Sow.	Phil.	1	duplicata L.	Zanzibar	0,30-80
minor Rumph	M. ind.	0,20-80	var. Lamarki Kien.	Mad.	0,30-50
var. crassa Phil.	Philipp.	0,20	v. Dussimieri Kien.	Hain.	0,40-1,20
nobilis Rumph	I. Ticao	1-2	dimidiata	I. Tahiti	0,40-1
ventricosa Lm.	M. ind.	0,50-2	muscaria Lm.	I. Ticao	0,40-1,50
Cassis.			maculata Lm.	Ind. or.	0,40-1,50
abbreviata Lm.	Mazatlan	1	Petiti Kien.	Sth. Carolina	0,50-60
areola L.	Molucc.	0,50-1,20	simplex Carp.	Calif.	0,20-30
coarctata Gray	Peru	1-2	tigrina Gm.	Ind. oc.	0,30-50
cornuta L.	Oc. ind.	1-3	Pyramidella.		
fimbriata Quoy	Aust.	1-3	auris-cati Ch.	Maur.	0,30-50
flammea L.	Oc. ind.	0,50-1,50	nitida A. Ad.	Philippn.	0,20-30
glanca L.	Philippn.	1-2	propinqua A. Ad.	I. Societ.	0,30-40
var. coronulata Sow.	"	2	Obeliscus.		
japonica Rv.	Japan	1-1,50	dolabratus L.	Loanda	0,30-50
Madagascariensis Lm.	Madg.	2-4	punctatus Chem.	Philipp.	0,30-50
pila Rv.	China	0,50-1	tesselatus A. Ad.	Maur.	0,20-40
rufa L.	Oc. ind.	1-2	Eulima.		
sulcosa Brug.	M. med.	0,40-1	brevis Sow.	Hoods Ins.	0,60-80
var. granulosa Küst.	"	0,50-60	cumingiana A. Ad.	W. Afrika	1
testiculus L.	Ind. occ.	0,30-1	eburnea Mühlf.	Pt. au Prince	0,40-50
torquata Rv.	N. Holl.	1	flexuosa A. Ad.	Mauritius	0,40-60
undata Mart.	Molucc.	1-2	grandis A. Ad.	Philippn.	1,20
vibex L.	Oc. ind.	0,30-1	hastata Sow.	Mauritius	0,80
var. erinacea L.	" "	0,30-60	lactea A. Ad.	Philippn.	0,60-80
Oniscia.			major Sow.	"	0,50-80
cancellata Sow.	China	2	pusilla	St. Elena	0,40
oniscus L.	Ind. occ.	0,40-1	vitrea A. Ad.	Fidji Ins.	0,50-60
Dolium.			Stylifer.		
fasciatum Brug.	Ind. or.	1-1,50	acicula Gld.	I. Tahiti	0,20-30
galea L.	M. med.	1-2	deformis Pse.	"	0,50
olearium L.	Ind. or.	0,80-1,50	subulata Brod.	Mauritius	1,20
perdix L.	Maur.	1-2			

		Mk.			Mk.
<i>Conus.</i>					
achatinus Ch.	Philippn.	1—2	marmoreus L.	Or. ind.	0,30-1
acuminatus Hwass	M. ind.	0,80-2	mercator L.	Sénégal	0,50-2
Adansoni Lm.	Sengl.	1—2	miles L.	Philipp.	0,40-1,50
Amadis Ch.	Oc. ind.	1—2	miliaris Hwass	Annaa	0,20-50
ammiralis L.	Oc. ind.	6—15	miltepunctatus L.	Maur.	1—2
anemone Lm.	Australien	1—2	minimus L.	Manil B.	0,20-50
arenatus Hwass	Philippn.	0,30-1	monile Hwass	Ceylon	0,50-1,50
augur. Hwass	Ceylon	2—3	mustelinus Hwass	I. Bohol	1—2
aulicus L.	Oc. ind.	2—5	Nemocanus Hwass	Oc. pacif.	0,50-2,50
aurantius Hwass	Molucc.	4—12	Nicobaricus Hwass	Nicobar	3—5
aurisiacus L.	Molucc.	8—35	nocturnus Hwass	Molucc.	3—8
australis Ch.	Australien	2—3	v. Deburghiae Sow.	"	10
bandanus Hwass	Philippn.	1—3	Nov. Hollandiae. Ad. N. Holl.	"	1
betulinus L.	Ind. or.	1—2	nussatella L.	Philippinen	0,40-2
baeticus Rve.	Philippn.	2—3	obesus Hw.	Oc. ind.	1—2
bullatus L.	Ind. or.	3—5	omaria Hwass	Ind. or.	0,80-1,50
californicus Hinds	Californ.	0,50-1	Orbigny And.	China	40
canonicus Hwass	Or. ind.	0,50-1	papilionaceus Hw.	Guinea	1—4
capitaneus L.	Philippn.	0,20-1	princeps L.	Amer. c.	3—5
catus Brug.	Tahiti	0,40-1	pulicarius Hwass	Tahiti	0,40-80
cedo-nulli Klein	Ind. occ.	12—30	punctulatus Hwass	China	0,30-50
characteristicus Ch.	"	3—4	purpurascens Brod.	Panama	1—3
classarius Hwass	Montijo B.	1—3	pygmaeus Rv.	S. Domingo	0,20-40
consors Sow.	N. Cald.	1—2	quercinus Hwass	Ceylon	0,40-1,20
dancus Hwass	Ind. occ.	1—2	regalitis Sow.	Real. Lejl	2—3
distans Hwass	Aust.	1—3	senator L.	Guinea	0,50-1
eburneus Hwass	Ceylon	0,30-1	spectrum L.	Mauritius	1,50-2,50
Elisae Kien.	Madagascar	4—5	sponsalis Ch.	L. Hood	0,30-40
emaciatus Reeve	I. Viti	1-1,50	stercus=muscarum L.	Ceyl.	0,50-1,20
encanustus Kien.	I. Marq.	1—2	striatus L.	Austr.	0,40-1,20
figulinus L.	Amboin	0,40-1	sulcatus Hwass	China	0,80-2
flavidus Lm.	Tahiti	0,30-80	Sumatrensis Hwass	M. ind.	2-2,50
fuscatus Born	Maur.	1—2	Suratensis	"	4—12
Gabriel Kien.	Philippn.	2—3	tabidus Rv.	Afric. occ.	2—5
generalis L.	M. ind.	0,50-1,20	taeniatus Hwass	China	0,50-1
gladiator Brod.	Panama	0,50-1,20	tahitensis	Tahiti	0,80-1,50
geographus L.	Australien	0,50-2	terebra Born	Philipp.	0,50-2
glans Hwass	? Philippn.	0,50-1,50	tesselatus Hwass	Oc. ind.	0,40-1
gubernator, Hwass	Ceylon	1—4	testudinarius Mart.	In. occ.	1—3
Hebraeus L.	Oc. ind.	0,20-80	textile L.	Oc. asiat.	0,50-2,50
Janus Hwass	Maur.	4—6	tulipa L.	Oc. ind.	1—2
imperialis L.	Philippinen	1—3	varius L.	Philippinen	1—2
interruptus Brod.	Mazatlan	2—3	vennatus Hwass	Philippn.	1—4
lineatus Ch.	Ceylon	0,30-1	v. ateralbus Kien.	Africa	2—3
lithoglyphus Meusch. J. Ticao	"	0,50-1,50	verriculum Rv.	Ceylon	0,50-2
litteratus L.	Or. ind.	1—2	verrucosus Hw.	Mozambq.	0,50-80
lividus Hwass	Philippinen	0,30-60	vexillum Mart.	Philippinen	1-3,50
magus L.	Or. ind.	0,20-1	vicarius Lm.	Maurit.	1—2
var. carinatus Hwass	"	0,50-2	virgo L.	Ceylon	0,30-1
mahogani Rv.	Salango	2—3	viridulus Lm.	Oc. ind.	1—2
Malaccanus Hwass	Malacc.	6—22	vitulinus Hwass	"	0,50-1
Maldivus Hwass	Ceylon	1-1,50	zonatus	"	20

Bei sofortiger Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschvereins 10 % Rabatt.

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren.

-Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Binnen-Conchylien
aus dem paläarktischen Faunengebiet.

(Fortsetzung).

	Mk.		Mk.
a. Aus Kreta.			
Die nähere Angabe der Fundorte erfolgt bei Bestellungen auf den Etiquetten.			
<i>Daudebardia Saulcyi</i> Bourg.		<i>Clausilia</i> var. <i>gracilior</i> Bttg.	0,40
Thier in Alcohol	2—4	" <i>byzantina</i> Charp. . .	0,40
" <i>junge Schale</i> . . .	0,50	" " var. <i>intermedia</i>	
<i>Hyalina Botterii</i> Pfr. . .	0,20-30	A. Schm.	0,40
" <i>hydatina</i> Rossm. . .	0,20-30	" " var. <i>solidula</i> Pfr.	0,20
" <i>cydoniensis</i> Blc. defect	1-1,50	" " f. <i>minor</i> . . .	0,20
" <i>protensa</i> Fér. vera		" <i>Candida</i> Pfr. . . .	0,40
nicht frisch	0,40-80	" " var. <i>major</i> . . .	0,50
<i>Helix aspersa</i> Müll. . .	0,10-20	" <i>clara</i> Bttg.	1—2
" <i>aperta</i> Born	0,20	" " v. <i>pauciosata</i> Bttg.	1—2
" <i>acuta</i> Müll.	0,10	" <i>corrugata</i> Drap. typus	0,50
" <i>amphiconus</i> v. Maltz.	0,60-80	" " v. <i>almyrosana</i> Bttg.	0,40
" <i>aegopinoides</i> " todt gs.	2-3	" " f. <i>minor</i>	0,30
" <i>barbata</i> Fér.	0,40-60	" " var. <i>homaloraphe</i>	
" <i>bathytera</i> Blanc. . . .	0,40-50	Bttg.	0,40
" <i>Cretica</i> Fér.	0,20-30	" " <i>subsp. inflata</i> Oliv.	0,20
" " var. <i>alba</i>	0,30	" " " var. <i>gracilior</i>	
" <i>Diensis</i> v. Maltz. . . .	0,40-50	Bttg.	0,30
" <i>Freytagi</i> "	0,60-1	" " " f. <i>minor</i> . . .	0,20
" <i>lecta</i> Fér.	0,40-60	" " " <i>Draparnaldi</i>	
" <i>mesostena</i> Westerl. . .	0,30-40	Beck.	0,50
" <i>Naxia</i> Fér.	1-2,50	" <i>cretensis</i> Rossm. . .	1,20-1,50
" v. <i>Westerlundi</i> Blanc.	1—2	" " var. <i>minor</i> . . .	0,80-1
" <i>noverca</i> Friv.	0,40-1	" <i>extensa</i> Pfr.	0,80-1,20
" <i>pellita</i> Fér.	0,20	" " var. <i>centralis</i> Bttg.	1,20
" " var. <i>major</i>	0,40	" " var. <i>tenerima</i> "	1-1,50
" <i>pisana</i> L.	0,10	" <i>glabella</i> Pfeiff. . . .	0,80
" <i>Psiloritana</i> v. Maltz.	0,40-50	" " var. <i>pura</i> Bttg.	1
" <i>Rothi</i> Pfr.	0,20-30	" <i>Grabusana</i> Bttg. . .	1
" <i>profuga</i> A. Schm. . . .	0,10-20	" " v. <i>humillima</i> Bttg.	0,60-80
" " var. <i>major. an. n. sp.</i>	0,30	" <i>Hippoliti</i> Blanc. . . .	1-1,20
" <i>Syriaca</i> Ehrenb.	0,20-30	" <i>Maltzani</i> Bttg. . . .	1,50-2,50
" <i>suspecta</i> Westerl. . . .	0,30-40	" <i>Moreletiana</i> Blanc. .	0,60
" <i>subvariegata</i> v. Maltz.	0,30-40	" " var. <i>minor</i>	0,50
" <i>Sphakiota</i> "	0,40-50	" <i>praeclara</i> Pfr. . . .	1—2
" <i>Siderensis</i> "	0,40-50	" " var. <i>major</i>	2,50
" <i>turbinata</i> Pfr.	0,10-20	" <i>striata</i> Pfr.	0,40
" <i>vermiculata</i> Müll. . . .	0,10-20	" " var. <i>major</i>	0,50
<i>Buliminus Cretensis</i> Pfr.	0,60-80	" <i>strigata</i> Pfr. typus . .	0,40
" var. <i>elongata</i>	0,80	" " v. <i>occidentalis</i> Bttg.	0,50
" <i>olivaceus</i> Pfr.	0,30-40	" " var. <i>occlusa</i> Bttg.	0,50
<i>Caecilianaella Maltzani</i> Cless.	0,30-40	" " var. <i>centralis</i> . .	0,50
" <i>tumulorum</i> Bourg. . .	0,30-40	" " var. <i>acuticosta</i> . .	0,50
" <i>aeicula</i> Müll. var. . . .	0,10-20	" <i>sublamellosa</i> Bttg. .	1,20
<i>Stenogyra decollata</i> L. . .	0,10-20	" " v. <i>intermedia</i> Bttg.	0,80
<i>Pupa granum</i> Drap. . . .	0,10	" " var. <i>oblitterata</i> "	1,50
<i>Clausilia amalthea</i> Westerl.	0,40	" <i>subvirginea</i> Bttg.	
" " var. <i>similis</i>		var. <i>farcimen</i> Bttg.	0,80
Böttg.	0,40	" <i>tenuicostata</i> Pfr. typus	0,60
" <i>Arthuriana</i> Blanc. . . .	1	" " v. <i>strictocostata</i> Bttg.	0,60
" " var. <i>major</i>	1,50	" " var. <i>omalica</i> "	0,80
" <i>bipalatalis</i> v. Mart. . .	0,30	" " var. <i>sulcicollis</i> "	0,60

	Mk.		Mk.
<i>Clausilia tenuicostata</i>		<i>Clausilia torticollis</i> Oliv. .	1,50-3
var. <i>mitis</i> Bttg.	0,60	" <i>venosa</i> Bttg. . . .	1-1,20
" <i>teres</i> Oliv. typus . .	0,60	" <i>virginea</i> Pfr. var. <i>leuco-</i>	
" " var. <i>phalanga</i> Bttg.	0,80	derma Bttg.	0,60-80
" " var. <i>f. minor</i> . .	0,50	" <i>xanthostoma</i> Bttg. .	1
" " var. <i>subcostata</i> Bttg.	0,60	" " var. <i>minor</i> . .	0,80
" " var. <i>f. minor</i> . .	0,50	<i>Planorbis spirorbis</i> L. var.	0,20
" " <i>v. hierapetrana</i> Btg.	0,40	" <i>glaber</i> Jeffr. . . .	0,10-20
" " <i>subsp. Vesti</i> Bttg.	0,80	<i>Hydrobia Maltzani</i> Cless. .	0,30-40
" " <i>f. gigantea</i> .	1	<i>Amnicola Cretica</i> Cless. .	0,20-30
" " <i>f. minor</i> . .	0,50	<i>Melanopsis buccinoidea</i> Oliv.	0,20
" " <i>v. orientalis</i> Btg.	0,60	<i>Neritina peloponesiaca</i> Recl.	0,20-30
" <i>troglydites</i> A. Schm.		<i>Carychium minimum</i> Müll.	
var. <i>vexans</i> Bttg.	0,50-60	var. <i>inflata</i> Bttg.	0,20
" var. <i>interpres</i> "	0,50-60		
b. Aus Griechenland und Kleinasien.			
<i>Hyalinia natolica</i> alb. Brussa	0,80-1	<i>Buliminus zebra</i> Oliv. Athen	0,10
<i>Holix aberrans</i> Mouss. "	0,30-40	<i>Pupa avenacea</i> Drap. Brussa	0,10
" <i>coreyrensis</i> Fér. typus		" <i>cylindracea</i> D. C. "	0,10
Graecia	0,20-30	" <i>doliolum</i> Brug.	
" " var. <i>canalifera</i> "	0,30-40	var. <i>scyplus</i> Dardan.	0,10-20
" <i>frequens</i> Mouss. Brussa	0,20-40	<i>Clausilia Agesilaos</i> v. Mart.	
" <i>lens</i> Fér. Magnesia	0,20	Taygetos	0,30
" <i>Olivieri</i> Fér. Graecia	0,10-20	" <i>Arcadica</i> Bttg. Arkad.	0,50-60
" " var. <i>parumeincta</i>		" <i>bicristata</i> Friv. typus	
Bosporus	0,10-20	Parnass	0,20
" <i>pyramidata</i> Drap.		" <i>bidens</i> L. Scutari	0,10-20
Dardanellen	0,10-20	" <i>circumdanta</i> Friv. Brussa	0,30-40
<i>Buliminus Bergeri</i> Roth		" <i>corpulenta</i> " "	0,20
Arkanania	0,50-60	" <i>Goldfussi</i> Bttg. Tayget.	0,80-1
" <i>carneolus</i> Mouss.		" <i>Hetaera</i> Friv.	
I. Prinkipos	0,60-80	I. Prinkipos	0,40-50
" <i>detritus</i> Müll. var.		" <i>munda</i> Zgl. Smyrna	0,30-40
<i>inflatus</i> Parr. Brussa	0,30	" <i>maritima</i> Klec.	
" <i>Frivaldszkyi</i> Pfr. "	0,60-80	v. <i>Thiessea</i> Bttg. Akarn.	0,30-40
" <i>graecus</i> Beck Morea	0,40-50	" <i>maculosa</i> Desh. Hym.	0,30-40
" " v. <i>elongata</i> Kob.	0,50-80	" <i>profuga</i> Charp. Argos	0,30-40
" <i>niso</i> Risso tödt ges.		" <i>Pikermiana</i> Roth var.	
Dardanellen	0,20	<i>Kephissiae</i> Marathon	0,20
" <i>Olympiens</i> Parr. Brussa	0,50-60	" <i>saxicola</i> Charp. Athen	0,20
" <i>orientalis</i> Friv.		" <i>spreti</i> Fér. I. Prinkipos	0,40-50
I. Prinkipos	1,20-1,50	" <i>semidenticulata</i> Pfr.	
" <i>ovularis</i> Oliv. Dardan.	0,20-30	defect Dardan.	0,60-80
" <i>pupa</i> Brug. Graecia	0,20	" <i>strumosa</i> Friv. "	0,20
" <i>Rossmassleri</i> Pfr.		" <i>Schwarzenbachi</i> Friv.	0,30-40
Brussa	0,80-1	" <i>Thiessea</i> Bttg. Graec.	0,40-50
" <i>Raynervallianus</i> Bourg.		" <i>venusta</i> A. Sch. Parn.	0,30-40
Dardanellen.	1-1,50	" <i>Voithi</i> Rossm. Tayget.	0,30
" <i>squalinus</i> Rossm.		<i>Cyclostoma elegans</i> Drap.	
Brussa	0,30	Brussa	0,10-20
" <i>Sturmi</i> Küst. "	1-1,50	<i>Pomatias hellenicus</i> Bourg.	
" <i>Tournefortianus</i> Fér.		Graecia	0,40
Brussa	0,30-50		

Bei sofortiger Barzahlung erhalten Mitglieder des Tauschvereins 10 % Rabatt.

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren.

Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

No. 47.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

Tausch-Catalog 1883 No. 6.
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

		Mk.			Mk.
Strombus					
auris Dianae L.	Ind. or.	0,40-1	multipes Desh.	M. ind.	4-5
australis Sow.	Austral.	2,00	scorpio L.	Molucc.	1-2
Campbelli Gray	"	1-1,20	Aporrhais		
canarium L.	Ceylon	0,30-60	occidentalis Beck.	N. Fundl.	5-8
columba Gm.	Philppn.	0,60-80	pes-carbonis Brown	Mittelm.	2-5
cylindricus Sws.	I. d. fr.	0,40-80	pes-pelecani L.	Europ.	0,20-80
dentatus L.	Ind. occ.	0,80-1	Struthiolaria		
elegans Sow.	M. rubr.	0,50-1	pes struthio cameli L.	N. Zeal.	2,50-3,00
epidromis L.	Philppn.	0,50-1	Terebellum		
fasciatus Born	Oc. ind.	0,40-60	subulatum Lm.	Oc. ind.	0,50-1,20
floridus Lm.	"	0,20-50	Priamus		
" " var. minor "	"	0,20-30	stercus-pulicem Ch.	Cadix	.20,-
fusiformis Sow.	M. rubr.	0,80-1	Cypraea		
gibberulus L.	Ind. or.	0,20-60	albuginosa Maw.	Californ.	2-3
gigas L. c. op.	Ind. occ.	4-5	angustata Gm.	N. Holl.	1,50-3
gracilior Wood	Californien	1-2	annulus L.	M. ind.	0,10-30
granulatus "	Amer. c.	1-1,50	arabica L.	Ind. or.	0,20-60
haemastomus L.	Mauritius.	0,30-50	arabica Lm.	Columb.	0,40-60
inermis Sow.	Ind. occ.	2-3	arenosa Gray	I. Anna	0,40-1
Isabella Lm.	Philppn.	0,40-60	argus L.	Oc. ind.	1-2
laciniatus Ch.	Amboina	10,-	asellus L.	Ind. or.	0,10-20
lentiginosus L.	Philippn.	0,40-80	aurantium Martyn.	Tahiti	0,30 40
lobatus Sw.	Ind. occ.	0,40 1,00	caput serpentis L.	Ind. or.	0,20-30
luhuanus L.	Philippn.	0,30-50	carneola L.	Austr.	0,20-60
maculatus Nutt.	I. Sandw.	0,60-80	caurica L.	Oc. ind.	0,10-40
marginatus L.	Ind. or.	1,50	cervinetta Kien	Peru	0,50-1
melanostomus Sw.	Philippn.	2-3	cernica Sow.	Mauritius	1-2
minimus L.	"	0,20-40	cervus L.	M. anst.	2-3
novae-zelandiae Ch.	N. Zeal.	3-5	cinerea Gm.	Ind. oc.	1-2
papilio Ch.	N. Guin.	5-7	clandestina L.	M. asiat.	0,10-20
peruvianus Sw.	Peru	3-5	Comptoni Gray	N. Holl.	2,-
plicatus Lm.	Ind. or.	0,20-40	cribaria L.	Oc. ind.	0,40-80
pugilis L. c. op.	Ind. occ.	0,80-1,50	cribellum Gask.	Maurit.	1-1,50
pyrulatus Lm.	Florida	1-2	cylindrica Barn.	Philippn.	1-2
rugosus Sow.	Ind. or.	1,50	eburnea Barn.	"	1-2
Ruppellii Rve.	M. rubr.	0,40-80	edentula Sow.	Afric. mer.	1-2,50
suocinctus L.	Ceylon	0,50-80	erosa L.	Oc. ind.	0,10-30
septimus Ducl.	China	2,-	errones L.	Ind. occ.	0,10-30
terebellatus Sow.	Philippn.	1-1,50	esontropia Ducl.	Austr.	1-2
tricornis Lm.	M. rubr.	1,00-1,50	exanthema L.	Ind. occ.	0,60-1
urceus L.	Ind. or.	0,20-40	felina Gm.	Oc. ind.	0,20-50
" var. chrysostomus "	"	0,30-50	fimbriata Gm.	Japan	0,20-30
variabilis Sw.	Philippn.	0,40-60	gangrenosa Dillw.	China	0,20-40
vittatus L.	"	0,60 1,20	helvola L.	Oc. ind.	0,10-20
Rostellaria			hirundo L.	"	0,10-20
curvirostris Lm.	M. rubr.	2-3	interrupta Gray	Philippn.	1-1,50
crispata Sow.	Philippn.	1-2	irrorata Sol.	Pacif.	0,50-60
Pterocera			Isabella L.	Mdgsr.	0,10-30
aurantia Lm.	Ind. or.	1-1,50	Lamarki Gray	"	0,50-80
chiragra L.	"	1-1,50	lurida L.	Oc. atl.	0,20-60
elongata Sws.	Philippn.	3-4	lynx L.	Oc. ind.	0,10-40
lambis L.	Ind. or.	0,50-1	mappa L.	"	1,50-3
			" var. rosea	"	3-5

		Mk.			Mk.
mauritiana L.	Oc. ind.	0,50-1,20	cicercula L.	Pacif.	0,20-40
Menkeana Dsh.	Maurit.	0,40-60	europaea Mft.	Europa	0,10-30
microdon Gray	Philippn.	0,40-50	globulus L.	Ind. or.	0,40-50
miliaris Gm.	Japan	0,50-80	insecta Migh.	I. Sandw.	0,30-50
moneta L.	Ind. or.	0,10-20	margarita Soland	Austr.	1-1,50
mus L.	Oc. atl.	0,40-1	nivea Gray	"	0,20-40
neglecta Sow.	Ind. or.	0,30-50	nucleus L.	Maur.	0,20-40
nivosa " (schön)	Siam.	80,—	oryza Lm.	M. ind.	0,20-30
obvallata Lm.	Tahiti	0,20-50	ovulata "	Cap.	1—2
ocellata L.	Ceylon	0,20-30	pacifica Gray	Gallop.	0,40-1
onyx L.	"	0,60-1,20	pediculus L.	Ind. occ.	0,20-30
" var. adusta Lm.	"	0,80-1	pulex Soland	M. med.	0,10-30
pallida Gray	Japan	2,—	pustulata "	Panama	0,50-1
pantherina Soland.	M. ind.	0,30-80	quadripunctata Gr.	Ind. occ.	0,20
picta Gray	Senegal	1-1,50	radians Lm.	Mexico	0,30-60
poraria L.	Austr.	0,10-30	sanguinea Gray	Columb.	0,20-40
pulchella Sw. (nicht schön)	China	2—4	scabriuscula Gray	I. Ticao	0,20-40
punctulata Gray.	Panama	0,30-50	staphylaea L.	Oc. ind.	0,10-30
physis Brocchi	M. Med.	10—20	V. limacina Lm.	Philippn.	0,10-20
punctata L.	Philippn.	0,40-60	subrostrata Gray.	Ind. occ.	0,30-50
pyrum Gm.	M. med.	0,50-1	suffusa "	Gallop.	0,20-30
reticulata Martyn	Austr.	0,40-1	tricornis Jouss.	Maur.	0,50-1
" var. minor "	"	0,20-30	vitrea Gask	Cap.	0,50-1
" " histrio "	"	0,50 1			
Scottii Brod.	N. Holl.	15—20			
scurra Ch.	Oc. ind.	0,50-1,20			
Sowerbyi Ant.	Calif.	1—2			
spurca L.	M. med.	0,20-50			
stercoraria L.	Afric.	0,50-1,50			
V. rattus "	"	0,50-1,20			
stolida "	Ceylon	1—2			
subcylindrica Sow.	Austral.	2,—			
subviridis Rve.	"	1,50-2,50			
tabescens Soland.	Oc. ind.	0,50-1,20			
talpa L.	M. ind.	0,30-1			
testudinaria L.	Oc. ind.	2—3			
tigris L.	Ind. or.	0,30-1			
turdus Lm.	M. ind.	0,20-40			
umbilicata Sow.	Austr.	8—12			
ursellus Gm.	Oc. ind.	0,20-40			
undata L.	"	0,20-40			
variolaria Lm.	"	0,20-40			
ventriculus "	Austral.	0,80-1,50			
vitellus L.	Oc. ind.	0,20-40			
ziczac L.	"	0,20-40			

Trivia

Adansoni Gray	Mauritius	3,—
annulata	I. Georg.	0,80-2
australis Lm.	N. Holl.	0,40-50
californica Gray.	Californ.	0,20-40
candida Gask.	Philippn.	0,20-40
Childreni Gray	Maurit.	0,30-80

Bei sofortiger Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschver. 10% Rabatt.
Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren

Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut

Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Verkrüzen T.A.

Artikel/Article: [Tausch-Catalog 1883 No. 1 207-222](#)