

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| Limopsis aurita Jeffr. | — aegeensis Forbes. |
| — tenella Jeffr. | Arca pectunculoïdes Scacchi. |
| — cristata Jeffr. | — glacialis Gray. |
| Sitacula fragilis Jeffr. | — Frielei Jeffr. |
| Glomus nitens Jeffr. | Idas argenteus Jeffr. |
| Malletia excisa Jeffr. | Dacrydium vitreum Möller. |
| — cuneata Jeffr. | Modiolaria discors L. |
| Leda tenuis Phil. | Crenella decussata Müll. |
| — messinensis Seg. | Modiola lutea Fischer. |
| — expansa Jeffr. | Lima gibba Jeffr. |
| — arctica Gray. | — subauriculata Mtg. |
| — pustulosa Jeffr. | — ovata S. Wood. |
| — lucida Lovèn. | — subovata Jeffr. |
| — frigida Torrell. | Amussium fenestratum Forbes. |
| — pusio Phil. | — Hoskynsi Forbes. |
| — intermedia M. Sars. | — lucidum Jeffr. |
| — micrometrica Seg. | Pecten fragilis Jeffr. |
| — insculpta Jeffr. | — Groenlandicus G. B. Sow. |
| — sericea Jeffr. | |
| — Jeffreysi Hid. | |
| — striolata Jeffr. | Waldheimia cranium Müller. |
| — minima Jeffr. | — tenera Jeffreys. |
| Nucula tumidula Lam. | Terebratula tuberata Jeffr. |
| — cancellata Jeffr. | — vitrea Born. |
| — striatissima Seg. | — caput serpentis L. |
| — corbuloides Seg. | Atretia gnomon Jeffr. |
| — sulcata Brown. | Discina atlantica King. |

L i t e r a t u r.

Tryon, George W., *Manual of Conchology*. Vol. V. Pt. 4.

Bringt den Schluss der Columbellen und das Register zum Band.

Procès-verbaux de la Société Royale Malacologique de Belgique.

(4 Août 1882 — 1 Juillet 1883.)

- p. CLXI. Delvaux, E., Contribution à l'étude de la Paléontologie des terrains tertiaires.
- p. CLXVI. Van den Broeck, E., Additions à la Faune Malacologique des Sables à Isocardia cor du Fort de Zwyndrecht près Anvers.
- p. CLXXXV. — —, Exposé sommaire des recherches géologiques et paléontologiques entreprises dans l'Oligocène des environs de

Louvain et dans les couches pliocènes et quaternaires de la Campine Anversoise.

- p. CCX. *Delvaux, E.*, Note sur la découverte d'ossements appartenant à des espèces éteintes dans le Quarternaire de Mons et de Renaix.

- p. CCXIII. *Velge*, Tongrien et Wemmelen (2. communication)

— 1883.

- p. VI. *de Guerne, Jules*, Note sur un cas de monstruosité scalaire du *Planorbis rotundatus* Poir.

- p. IX. *Dollfus, G. F.*, Nomenclature critique du Trophon antiquus.

- p. XXIII. *de Guerne, Jules*, Notes sur l'histoire des Regions arctiques de l'Europe. Le Varangerfjord.

- p. XXVI. *Craven, A.*, Note sur le genre Sinusigeron.

- p. XXVII. *Pelseuer, P.*, Note sur des coquilles terrestres et fluviales recueillies à Aeltre.

- p. LXXXVII. *Ubaghs, Casimir*, Mollusques terrestres et fluviatiles des environs de Maastricht.

Gundlach, Don Juan, *Apuntes para la Fauna Porto-Riqueña*. Quinta parte. B. Moluscos marinos. In *Anales Soc. Española Hist. Nat.* Tomo XII cuad. 3^o.

- p. 441—484. Die aufgezählten Arten sind von Gundlach in Mayagüez, Aquadilla, Quebradillas und Arecibo gesammelt, ein Theil auch von Krug und diese sind von Ed. von Martens revidirt. Als neu signalisirt wird *Polygona clathratula* von Mts. mss. von Quebradillas. Die Fauna ist ächt westindisch.

Tapparone-Canefri, C., *Intorno ad alcuni Molluschi terrestri delle Molucche e di Selebes*. — In *Annal. Mus. Civico Genov.* vol. XX. 1883 p. 143—175 tav. I.

Die betreffenden Conchylien wurden von den Herrn D. Beccari und d'Albertis gesammelt. Als neu beschrieben werden *Stenogyra aculeus* p. 144 von Amboina; — *Helix* (*Cristagibba*) *leptocheila* p. 150 t. 1 fig. 14—16; — *Hel. pyrostoma* var. *bucculenta* und var. *extincta* von Halmahera p. 161; — *Leptopoma bicolor* var. *dimidiatum* p. 165; — *Helicina derepta* p. 167 t. 1 fig. 7, 8, Amboina. — Von Selebes *Amphidromus Beccarii* p. 170 t. 1 fig. 10, 11; — *Clausilia Moluccensis* var. *majuscula* p. 171; — *Vertigo Selebensis* p. 171 t. 1 fig. 12—13; — *Nanina* (*Xesta*) *Sibylla* p. 172 t. 1 fig. 1—3; Anatomie fig. 9; — *Cyclophorus depictus* p. 174 t. 1 fig. 4—6; — *Calycia crystallina* Rve. (Bul.) wurde ohne nähere Fundortsangabe von den Molukken mitgebracht. —

Hel. coluber Beck wird als Varietät zu *zonaria* gezogen, *Phryne* P. und *Aspasia* Ad. zu *exceptiuncula*, *sororecula* Mts. erhält wegen der gleichnamigen, freilich verdächtigen und im besten Fall zur Gattung *Patula* gehörigen Benoit'schen Art den Namen *devincta*. — Für *Hel. lampas* Müll. ist durch Beccari endlich Halmahera als sicherer Fundort nachgewiesen.

Dall, W. H., on a collection of Shells, sent from Florida by Mr. Henry Hemphill. — In Proc. U. St. National Mus. vol. VI. p. 318—342 pl. 10.

Als neu beschrieben werden: *Leucoma Hemphillii* p. 323 t. 10 fig. 6; — *Phos intricatus* p. 325 t. 10 fig. 9; — *Mitra* (*Mitromorpha*) *floridana* p. 327 t. 10 fig. 12; — *Drillia thea* p. 328 t. 10 fig. 5; — *Drillia leucocyma* p. 328 t. 10 fig. 8; — *Drillia limonitella* p. 329 t. 10 fig. 10; — *Eulima Hemphillii* p. 330 t. 10 fig. 4; — *Pyramidella?* *vineta* p. 330 t. 10 fig. 7; — *Odostomia acutidens* p. 331; — *Parthenia cedrosa* p. 331 t. 10 fig. 11; — *Turbonella viridaria*, *virga* und *punicea* p. 332; — *Cytherea* (*Transennella* n. subg.) *conradina* p. 340; — *Lucapina fasciata* Pf. und *Parastarte triquetra* Pf. werden eingehend behandelt.

Studer, Dr. Theoph., die Mollusken der nächsten Umgebung von Bern, nach den im Museum für Naturgeschichte vorhandenen Sammlungen. — Sep. Abz. aus Mitth. naturf. Gesellsch. Bern 1884.

105 Arten, sämtlich der deutschen Fauna angehörig, mit Ausnahme von *Pupa variabilis* Drp., deren Vorkommen bei Deisswyl sehr auffallend ist und *Valvata alpestris* Bl. Die Studer'schen Synonyme sind nach der noch vorhandenen Sammlung angegeben.

Blochmann, Dr. F., die im Golfe von Neapel vorkommenden Aplysien. — In Mitth. Zoolog. Stat. Neapel vol. V Heft 1 p. 28—49 Taf. 3.

Der Autor erkennt drei Arten, *limacina* L. (= *fasciata* Bosc, *vulgaris* Blv., *depilans* Blv. nec L., *lepus* Risso, *camelus* Risso, *alba* Risso), *depilans* L. nec Blv. (= *leporina* delle Chiaje) und *punctata* Cuv. (= *depilans* Pennant, *Cuvieri* delle Chiaje) an und beschreibt Aeusseres und Inneres genau.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1882.

p. 94. *Heilprin, Angelo*, on the Occurrence of Ammonites in deposits of Tertiary Age.

- p. 105. *Arango, Rafaël*, Descriptions of new Species of Terrestrial Mollusca of Cuba. — Neu Chendropoma deceptor, Hamlini; — Cyllindrella triplicata, atro-purpurea, colorata, infortunata, prima, confusa, difficultosa, consanguinea, crassilabris, conferta, imparata, propinqua.
- p. 150. *Heilprin, Angelo*, on the relative Age and Classification of the Posteocone Tertiary Deposits of the Atlantic slope.
- p. 189. — —, on the Occurrence of Nummulitic Deposits in Florida and the Association of Nummulites with a Fresh water Fauna.
- p. 194. *Newberry, J. S.*, on Supposed Tertiary Ammonites.
- p. 196. *Heilprin, Angelo*, on the Age of the Tejon Rocks of California and the Occurrence of Ammonitic Remains in Tertiary Deposits. — Der Autor verfißt mit sehr gewichtigen Gründen das tertiäre Alter dieser Schichten trotz eines darin gefundenen Ammonitenrestes.
- p. 231. *Eastlake, T. W.*, Conchologia Hongkongensis. — 32 Arten, davon zwei noch unbeschrieben.
- p. 241. *Stearns, Robert*, Verification of the Habitat of Conrads Mytilus bifurcatus. — Findet sich wirklich an Californien und ist identisch mit Myt. multiformis Carp.

Annales de la Société Royale Malacologique de Belgique.

1882. Mémoires T. XVII.

- p. 3. *Van den Broeck, Ernest*, une Visite à la Station zoologique et à l'Aquarium de Naples.
 - p. 15. *Craven, Alfred E.*, Liste d'une collection malacologique provenant de Landana près de l'embouchure du Congo. — Neu Bullia fusca p. 16 t. 2 f. 1; — Nassa Wyersii p. 16 t. 2 f. 2; — Phasianella Petiti p. 17 t. 2 f. 3.
 - p. 20. *Piré, Louis*, La Rochelle, A propos du onzième congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences.
 - p. 27. *Foresti, Ludovico*, Note sur deux nouvelles variétés de l'Ostrea cochlear Poli.
 - p. 31. *Pelseneer, Paul*, Etudes sur la Faune litorale de la Belgique. Mollusques et autres animaux inférieurs recueillis sur la côte belge en 1882.
 - p. 44. *Delvaux, E.*, Compte Rendu de l'Excursion de la Société Royale Malacologique de Belgique à Maastricht les 13 et 14 Août 1882.
- Il Naturalista Siciliano.* Anno 3. No. 5. (Febr. 1884.)
- p. 133. *Gregorio, A. de*, Un nuovo Pecten (Amusium) vivente nella Nuova Caledonia. (Milne-Edwardsi de Greg.).

- p. 133. *Gregorio, A. de*, Intorno al Pecten pictus Sow. nec Goldf. e al P. corneus G. B. Sow. non J. Sow. — Für ersteren wird der Name P. Oweni, für letzteren P. Jeffreysi vorgeschlagen.
- p. 135. — —, una nuova Cypraea pliocenica (Epona Altavillensis).
- p. 137. *Monterosato, Marchese de*, Conchiglie littorali mediterranee. Neu Zippora paradoxa, Sabanea munda, Apicularia (n. sect.) lia Benoit mss.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1883. Pt. II.

- p. 171. *Stearns, Rob. E. C.*, Description of a new hydrobiinid Gastropod from the Mountain Lakes of the Sierra Nevada, with Remarks on allied Species and the physiographical features of said Region. — Mit Abbildung von Pyrgula Nevadensis, nach welcher die Art ganz gewiss keine Pyrgula ist.
- p. 213. *Heilprin, Angelo*, Note on a Collection of Fossils from the Hamilton (Devonian) Group of Pike Co., P. A.
- p. 214. *Sharp, Benjamin*, on the Anatomy of Ancyclus fluviatilis Müll. and Anc. lacustris Geoffr. — Auszug aus einer der Würzburger Fakultät eingereichten Inauguraldissertation.
- p. 248. — —, on visual organs in Solen. — Die Augen liegen an den Siphonen und sind von auffallend primitiver Bildung.

Drouët, Henri, Unionidae de l'Italie. Paris 1883. 8°. 125 pp.

Der Autor gibt zunächst eine Uebersicht über das hydrographische System Italiens und beschreibt dann folgende Arten als neu: *Unio* Veillanensis Blanc mss. p. 24, See von Avigliano bei Susa; — *U. Polii* p. 27, Garten der Villa Doria-Pamfili bei Rom; — *U. subcylindricus* Pini mss. Tessin; — *U. fluminalis* = *Requienii* var. Iconogr. fig. 1148, Lombardei; — *U. Idrinus* p. 42, Idro- und Iseo-See; — *U. etruscus* p. 48, Toskana; — *U. campanus* Blanc mss., Terra di Lavoro; — *U. meridionalis* Pini mss. p. 51, Sarno, Vultur; — *U. Langobardus* Pini mss. p. 54, Mincio; — *U. Brianteus* Pini mss. Brianza; — *U. nitidus* p. 57, Po und Umgebung von Modena; — *U. siliquatus* p. 66, Turin; — *U. Gredleri* p. 68 = *ovalis* var. *intercedens* Gredler, Gardasee; — *U. Benacinus* p. 74, Gardasee; — *U. minusculus* p. 77, Gardasee. — *Microcondylus truncatus* p. 85, Gardasee; — *Anodonta* Blauneri p. 91 = *atrovirens* Shuttfl. bei Stabile, See von Muzzano; — *An. Alseria* p. 93, See von Alserio; — *An. utriculosa* p. 94, Castelgoffredo, Udine; — *An. Auxurensis* Statuti mss. p. 95, Terracina und Lago Trasimeno; — *An. Stabilei* p. 96,

Castelgoffredo, Modena; — *An. Padana* p. 97, Po; — *An. Pinii* p. 98, Po, See von Candia; — *An. longirostris* p. 101, Po, Tanaro, Oglio; — *An. scapulosa* p. 104, See von Martignano; — *An. Romana* p. 106, Pontinische Sümpfe; — *An. Utinensis* p. 109, Udine; — *An. Villae* p. 120, Gardasee; — *An. paupercula* p. 121, Gardasee, Comersee; — *An. cristata* p. 121, Lago d'Oggiono. — Zusammen werden 80 Arten aufgeführt.

Journal de Conchyliologie 1883. No. 3 (ausgegeben im Februar 1884).

- p. 189. *Morelet, A.*, Malacologie des Comores. Recolte de M. E. Marie à l'île Mayotte 3. Article. — *Neu Helix homalospira* p. 191 t. 8 fig. 14; — *Hel. microsoma* p. 192 t. 8 fig. 13; — *Stenogyra glabella* p. 193 t. 8 fig. 11; — *St. pyramidalis* p. 194 t. 8 fig. 9; — *St. spinula* p. 194 t. 8 fig. 10; — *Geostilbia Comorensis* p. 196 t. 8 fig. 7; — *Ennea spreata* p. 197 t. 8 fig. 2; — *E. sesamum* p. 197 t. 8 fig. 6; — *E. dentiens* p. 198 t. 8 fig. 5; — *E. microdina* p. 199 t. 8 fig. 4; — *Melampus hyalinus* p. 200 t. 8 fig. 15. — *Cyclotopsis dubia* ist ein *Cyclophorus*, *Cyclophorus atomus* marin, wahrscheinlich ein *Adeorbis*.
- p. 216. *Mousson, Albert*, Trois nouvelles espèces au Nord-Ouest du Mexique. — *Neu Polygyra unguifera* p. 216 t. 9 fig. 1; — *Bulimulus Forreri* p. 217 t. 9 fig. 2; — *Helicina Durangoana* p. 218 t. 9 fig. 3.
- p. 219. *Crosse et Fischer*, Description d'une variété nouvelle d'*Anodonta*, recueillie par M. A. Forrer, dans l'Etat de Sinaloa (Mexique). — *Neu An. glauca* var. *Sinaloensis*.
- p. 221. *Crosse, H.*, Note complémentaire sur l'*Anodonta* Guillaumi Recluz (Mit Abbildung).
- p. 223. *Daniel, Dr. F.*, Faune malacologique terrestre, fluviatile et marine des environs de Brest (Finistère. Première Partie).

Locard, Arnould, *Malacologie des Lacs de Tibériade, d'Antioche, et d'Homs*. Lyon 1883. Roy. fol. 99 pp. mit 5 Tafeln, Separatabzug aus Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon, tome III.

Wir berichten über diese interessante Arbeit, deren Material die Herren Lortet, Chantre und Letourneux zusammengebracht haben, eingehender in den Jahrbüchern. Als neu beschrieben werden aus dem See von Tiberias: *Unio Luynesi* Bgt. p. 11; — *U. timius* Bgt. p. 13, t. 20, f. 13, 14; — *U. Raymondi* Bgt. p. 14; — *U. Tristrami* p. 15, t. 20, f. 15, 16; — *U. ellipsoideus*, p. 17, t. 21, f. 1—3; — *U. Genezarethanus* Letourn., p. 19, t. 21, f. 4—6; — *U. Tiberiadensis* Let., p. 22, t. 21, f. 13—15; — *U. prosacrus* Bgt., p. 25, t. 21, f. 16, 17;

— 87 —

— U. Zabulonicus Bgt., p. 26, t. 22, f. 11—13; — Corbicula syriaca, p. 29, t. 22, f. 23—24. — Aus dem See von Antiochia und dem Orontes: U. rhomboidopsis, p. 45, t. 20, f. 7—9; — U. axiacus Let., p. 48, t. 20, f. 22—23; — U. subtigridis, p. 51, t. 21, f. 18—20; — U. anemprosthus Bgt., p. 52, t. 21, f. 21—23; — U. Chantrei, p. 53, t. 22, f. 1—7; — U. Jauberti Bgt., p. 54, t. 22, f. 8—10; — U. Antiochianus, p. 55, t. 22, f. 14—16; — Leguminaia Chantrei, p. 58, t. 19b, f. 8—10; — L. Bourguignati, p. 58, t. 19b, f. 11—13; — Pseudodon Chantrei, p. 60, t. 19b, f. 4—7; — Anodonta pseudodopsis, p. 61, t. 19b, f. 1—3; — Corbicula Feliciani Bgt. = orientalis var. 2. Lam., p. 63, t. 22, f. 19—21; — C. hebraica Bgt., p. 65, t. 22, f. 27—29; — Dreissensia Bourguignati, p. 66, t. 23, f. 1, 2; — Dr. Chantrei, p. 67, t. 23, f. 3, 4; — Planorbis Antiochianus, p. 68, t. 23, f. 5, 6; — Limnaea axiaca, p. 69, t. 23, f. 26—28; — L. Antiochiana, p. 70, t. 23, f. 32—34; — Melanopsis prophetarum Bgt., p. 71, t. 23, f. 52—55; — Mel. Chantrei, p. 74, t. 23, f. 44—49; — Mel. Lortetiana, p. 77, t. 23, f. 50, 51. — Aus dem See von Homs: Limnaea callopleura, p. 84; — L. Reneana, p. 84, t. 23, f. 8—10; — L. Chantrei, p. 85, t. 23, f. 11—16; — L. Lagodeschina Bgt., p. 86, t. 23, f. 17—19; — L. Homsiana, p. 87, t. 23, f. 20—25; — L. lagotopsis, p. 89, t. 23, f. 29—31; — L. Tripolitana, p. 90, t. 23, f. 35—37; — L. subpersica, p. 91, t. 23, f. 38—40; — L. peregriformis, p. 92, t. 23, f. 41—43.

Rossmüssler's Iconographie der europäischen Land- und Süßwasserconchylien, fortgesetzt von W. Kobelt. — Neue Folge, Bd. I Heft 5 und 6.

Taf. 21—24 enthält Linnäen; — Taf. 25 Margaritana Bonellii; — Taf. 26 Marg. crassula, Unio brachyrhynchus und Komarowi; — Taf. 27 U. Larderehianus & Lawleyanus; — Taf. 28 U. Ravoisieri var. issericus, tafnanus und tetuanensis; — Taf. 29 U. crassus var. maximus; — Taf. 30 U. Molteni, Spinellii und Savensis.

Mittheilungen und Anfragen.

Das Vimont'sche Conchyliengeschäft ist in die Hände des Herrn E. Marie übergegangen und befindet sich vom 1. März ab
rue Christine No. 1, Paris.

Gesellschafts-Angelegenheiten.

Neue Mitglieder.

Herr *Ferdinand Schmidt*, stud. med. in Dorpat (Livland),
Mühlenstrasse 15, Haus: von Zeddelmann.

Herr *Richard Schröder*, Dr. phil., Halle a. S., Rannische
Strasse 10.

Berichtigung.

Herr *J. Schedel* (s. letzte Nummer) wohnt nicht Wien,
sondern **Hiel**.

Wohnorts-Veränderungen.

Herr *R. Jetschin* wohnt jetzt in **Patshkau**, Reg.-Bez. Oppeln.

Herr *Dr. C. Tapparone-Canefri* wohnt jetzt Via Sant
Ugo No. 8 (interno 4), **Genova**.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literatur 81-87](#)