

Mollusken aus der Rhön.

Von

S. Clessin.

Während einer kleinen Fusstour durch die Rhön habe ich an einigen Stellen Mollusken gesammelt, deren Mittheilung mir desshalb von Interesse erscheint, weil ich in der Lage bin, mehrere bisher nicht gefundene Arten aufzuzählen, wodurch die Publikationen Sandberger's (Malakol. Notizen aus dem Jahre 1876, Nachr. Bl. 1876 p. 150.) und Böttger's (zur Molluskenfauna des Gebietes der fränk. Saale Nachr. Bl. 1878 p. 106; zur Fauna von Unterfranken, l. c. p. 86; und Clausilien aus dem Rhöngebirge Nachr. Bl. 1876 p. 51) ergänzt werden.

1) Bad Brückenau.

1. *Arion empiricorum* L.
2. *Limax cinereo-niger* Wolf.
3. *Helix* (*Patula*) *rotundata* Müll.
4. *Clausilia* (*Clausiliastra*) *laminata* Mtg.
5. » (*Alinda*) *biplicata* Mtg.

2) Auf dem Kreuzberg; im Walde nahe am Kloster.

1. *Arion subfuscus* Drap. häufig.
2. » *brunneus* Lehm. var. — Rücken ganz gleichförmig tiefschwarz, so dass keine Seitenbinden hervortreten. —
3. *Limax cinereo-niger* Wolf.
4. » *tenellus* Nils. vereinzelt.
5. » *agrestis* L. — nur 1 Exemplar von gleichförmiger schmutzig weisser Farbe.
6. *Hyalina petronella* Charp.
7. » *crystallina* Müll. selten.

8. *Hyalina fulva* Müll. selten.
9. *Vitrina pellucida* Müll.
10. » *diaphana* Drap.
11. *Helix* (*Patula*) *rotundata* Müll. Häufig.
12. » (*Frutic.*) *incarnata* Müll. Selten.
13. » (*Tachea*) *hortensis* L. Beide Arten vereinzelt, klein und sehr dünnschalig.
14. » (*Chilotrema*) *lapicida* L., klein, dünnschalig; am Abstieg gegen Waldberg.
16. *Clausilia* (*Clausiliastra*) *laminata* Mont. — Häufig, aber wie alle Clausilien des Kreuzberges verkürzt, und deshalb bauchiger erscheinend, mit stark verwitterter, aber fester Schale; nur bis 15 mm Länge; öfter decollirt.
17. *Clausilia* (*Alinda*) *biplicata* Mont., sehr häufig. — Die dickschaligen Gehäuse haben 1—2 Umgänge weniger als die Normalform; diese nehmen anfangs langsamer, von 6 Umgänge an aber rascher zu, wodurch dieselben eine auffallend bauchige Gestalt annehmen. Sie überschreiten eine Länge von 15—16 mm äusserst selten. Der gabelästige Auslauf der Unterlamelle am Mundsaum fehlt durchaus.
18. *Clausilia* (*Pyrostoma*) *plicatula* Drap. seltener. Die Gehäuse erreichen nur 11 mm Länge.
19. *Clausilia* (*Pyrostoma*) *cruciata* Stud. häufig. Die Gehäuse bleiben klein und sind meist auffallend bauchig. Länge 9—11 mm.
20. *Cochlicopa lubrica* Müll. selten.

3) Ufer der Saale bei Waldaschach.

1. *Arion empiricorum* L.
2. *Helix pomatia* L.

3. *Buliminus montanus* Drap. Gehäuse von rothbrauner Farbe; ziemlich kurz; — häufig.
4. *Bulim. obscurus* Müll. selten.
5. *Pupa edentula* Drap. selten.
6. *Clausilia* (*Clausiliastra*) *laminata* Mont.;
7. » (*Alinda*) *biplicata* Mont.; häufig; beide von normaler Form und Grösse.

4) Bad Kissingen.

1. *Arion empiricorum* L.
2. *Limax cinereo-niger* Wolf. selten.
3. *Helix* (*Helicogena*) *pomatia* L.
4. » (*Tachea*) *nemoralis* L.
5. » (*Trigonostoma*) *obvoluta* Drap. selten.
6. » (*Chilotrema*) *lapicida* L.
7. » (*Patula*) *rotundata* Müll.
8. » (*Fruticicola*) *fruticum* L.
9. » (*Xerophila*) *ericetorum* Müll.
10. *Buliminus detritus* Müll.
11. *Clausilia* (*Clausiliastra*) *laminata* Mont.
12. » (*Alinda*) *biplicata* Mont.; beide in normalen Formen; häufig.

5) Ruine Trimberg.

1. *Helix* (*Tachea*) *nemoralis* L.
2. » (*Xerophila*) *ericetorum* L.
3. *Buliminus detritus* Müll.

Kleinere Mittheilungen.

Nach einer Mittheilung von **Choffet** im *Naturaliste* findet sich *Panopaea Aldrovandi* auch an der portugiesischen Küste südlich von der Tagomündung, *Cymbium papillatum* ebenda und mit *Argonauta Argo* zusammen auch noch 45 km nördlich von Lissabon.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Clessin Stephan [Stefan]

Artikel/Article: [Mollusken aus der Rhön. 186-188](#)