

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

TAUSCH-CATALOG 1884 No. 1

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Binnen-Conchylien

aus dem paläarktischen Faunengebiet.

(Fortsetzung.)

Die genaueren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.

	Mk.		Mk.
<i>Succinea</i>			
putris L.	0,10	ovata Drap.	0,10
" var. Clessiniana Haz.	0,20-30	" var. inflata Kob. . .	0,10-30
" " grandis "	0,30	" " Piniana Haz. . .	0,20-30
" " fontana "	0,20	" " fluminensis Cless.	0,10-20
" " olivula Baudon	0,20-30	" " intermedia Fér. .	0,20-30
" " angusta Haz. .	0,20	peregra Drap.	0,10
Pfeifferi Rossm. . . .	0,10-20	" var. callosa Ziegl. .	0,10-20
Hungarica Hazay . . .	0,20	" " frisia Friedel .	0,20
" var. hasta " . . .	0,20	" " marginata Mich.	0,20
elegans Risso	0,20	" " curta Cless. . .	0,10-20
" var. Baudoniana Haz.	0,20-30	" " rivularis Parr. .	0,20
" " Piniana Haz. .	0,20	" " thermalis Boubée	0,10-20
" " levantina Desh.	0,20-30	stagnalis L.	0,10-20
oblonga Drap.	0,10-20	" var. lacustris Stud. .	0,20-30
Kobelti Haz.	0,20-30	" " borealis Bourgt.	0,10-20
<i>Carychium</i>		palustris Müll.	0,10
minimum Müll.	0,10	" var. corvus Gmel. . .	0,10-20
" var. inflata Bttg.	0,20	" " distorta Rossm. . .	0,10-20
striolatum Bourg. . . .	0,20	" " septentrionalis Cls.	0,10-20
<i>Zospeum</i>		" " fusca C. Pfr. . .	0,10
Schmidt Frauent. . . .	0,50-60	" " Clessiniana Haz. .	0,20
obesum Schm.	0,50-60	" " Baudoniana " . .	0,10-20
reticulatum Hauffen . .	0,50-60	" subsp. turricula Held.	0,20-30
<i>Marinula</i>		syriaca Mouss.	0,30-40
aequalis Lowe	0,20-30	glabra Müll.	0,10-20
Vulkani Mor.	0,20-30	" var. Thiessea Cless. .	0,20-30
<i>Alexia</i>		parvula Haz.	0,10-20
Balearica Dobrn	0,20-30	taurica Cless.	0,20-30
myosotis Drap.	0,10-20	truncatula Müll.	0,10
" var. ringens	0,10-20	" var. conica Jeffr.	0,10-20
ciliata Mor.	0,20-30		
<i>Limnaea</i>		persica Parr.	0,30-40
auricularia L.	0,10-20	natalensis Krauss. . . .	0,30-40
" var. costellata . . .	0,10-20	alkaensis Dall. (defect) .	0,50-60
" " ventricosa Hartm.	0,10-20	Traski Tryon	0,40-50
subsp. ampla " . . .	0,20-30	Pingeli Beck	0,60-80
" " tumida Held . . .	0,20-30	<i>Amphipeplea</i>	
" Monardi Hartm. . .	0,20-30	glutinosa Müll.	0,20-30
lagotis Schrank	0,10	<i>Physa</i>	
" var. acutalis Mor. . .	0,10-30	hypnorum L.	0,10
mucronata Held	0,20	fontinalis L.	0,10-20
" var. rubella Cless.	0,20-30	acuta Drap.	0,20
" " rosea Gall. . . .	0,20	<i>Isidora</i>	
		contorta Mich.	0,20
		Forskali Ehrenb.	0,20-40

	Mk.		Mk.
<i>Leucosia</i>		<i>mamillare</i> Lm.	0,20-30
<i>Stiedae</i> Dyb. (Baikal-See)	2—3	<i>ferrugineum</i> Lm.	0,20
<i>Benedicta</i>		<i>Pomatias</i>	
<i>fragilis</i> Gerst.	8,—	<i>auritus</i> Ziegl.	0,20
<i>baicalensis</i> Gerstf.	2—3	<i>cinerascens</i> Rossm.	0,20-30
<i>Planorbis</i>		<i>gracilis</i> Küst.	0,20-30
<i>corneus</i> L.	0,10	<i>Gredleri</i> Westl.	0,20-30
„ var. <i>minor</i>	0,20	<i>Henricae</i> Strobel	0,10-20
„ „ <i>similis</i> Blz.	0,20-30	<i>Hidalgoi</i> Crosse	0,30-40
<i>Dufourei</i> Graells	0,30-40	<i>Lapurdensis</i> Folin	0,30-40
„ var. <i>medjidenensis</i> Fbs.	0,30-40	<i>Martensianus</i> v. Möll.	0,20-30
<i>albus</i> Müll.	0,10	<i>obscurus</i> Drap.	0,20
„ var. <i>lemniscatus</i> Hartm.	0,20	<i>patulus</i> „	0,10
<i>Gredleri</i> Bielz	0,20-30	<i>septemspiralis</i> Raz.	0,10
<i>Rossmassleri</i> Auerw.	0,20-30	<i>Heydenianus</i> Clessin	0,10-20
<i>limophilus</i> Westl.	0,20	<i>tesselatus</i> Rossm.	0,20-30
<i>glaber</i> Jeffr.	0,10-20	<i>Assimineae</i>	
<i>piscinarum</i> Bourg.	0,20-30	<i>Grayana</i> Leach	10—20
<i>hebraeus</i> „	0,30-40	<i>Hydrocena</i>	
<i>agraulus</i> „	0,20-30	<i>cattaraensis</i> Ziegl.	0,10-20
<i>nautilus</i> L.	0,10	<i>Paludina</i>	
<i>cristatus</i> Drap.	0,10	<i>contecta</i> Millet	0,10-20
<i>carinatus</i> Müll.	0,10-20	<i>fasciata</i> Müller	0,10-20
„ var. <i>dubius</i>	0,20	<i>atra</i> Christ et Jan.	0,30-40
<i>umbilicatus</i> Müll.	0,10	<i>hungarica</i> Haz.	0,40-50
„ var. <i>major</i>	0,20	<i>ussuriensis</i> Gerrtl. Amur.	3,—
„ „ <i>attica</i> Bourg.	0,20-30	<i>unicolor</i> Oliv.	0,20-40
„ „ <i>gracca</i> Cless.	0,20-30	„ var. <i>biangulata</i>	0,30-40
<i>vortex</i> L.	0,10	<i>Cleopatra</i>	
<i>verticulus</i> Troschel	0,20	<i>bulimoides</i> Oliv.	0,20
„ var. <i>acies</i> Villa	0,20-30	„ var. <i>trifasciata</i>	0,20-30
<i>rotundata</i> Poir.	0,10	<i>cyclostomoides</i> Küst.	0,40-50
<i>spirorbis</i> L.	0,10	<i>Bithynia</i>	
„ var. <i>Hazayanus</i> Cless.	0,20	<i>tentaculata</i> L.	0,10
<i>septemgyratus</i> Ziegl.	0,20-30	„ var. <i>bottnica</i> And.	0,20
<i>Villae</i> Adami	0,20-30	„ „ <i>thermalis</i> Haz.	0,20
<i>contortus</i> L.	0,10	„ „ <i>producta</i> Mke.	0,20
„ var. <i>dispar</i> Westerl.	0,20	<i>ventricosa</i> Gray	0,20
<i>complanatus</i> L.	0,10-20	„ var. <i>Troscheli</i> Paasch	0,20
<i>riparius</i> West.	0,20	<i>rubens</i> Mke.	0,20
<i>concinus</i> „	0,20-30	<i>Boissieri</i> Charp.	0,20
<i>nitidus</i> Müll.	0,10	<i>Orsini</i> „	0,10-20
<i>Clessini</i> Westerl.	0,10-20	<i>sennariensis</i> Küst.	0,40-50
<i>Ancylus</i>		<i>Hydrobia</i>	
<i>pileolus</i> Fér.	0,20	<i>stagnalis</i> Bast.	0,10
<i>Jani</i> Bourg.	0,20	„ var. <i>Girardoti</i> Pal.	0,10-20
<i>capuloides</i> Jan.	0,10-20	„ „ <i>pictonum</i> „	0,10-20
<i>fluviatilis</i> Drap.	0,10	<i>acuta</i> Drap.	0,10-20
„ var. <i>simplex</i> Bourgt.	0,10-20	„ var. <i>Brondeli</i>	0,10-20
<i>lacustris</i> L.	0,10	<i>achaja</i> Clessin	0,10-20
<i>abyssinicus</i> Jickeli	0,20-30	<i>Thiesseae</i> „	0,10 20
<i>Cyclostoma</i>		<i>balthica</i> Nils	0,10
<i>sulcatum</i> Drap.	0,20	<i>Kutschigi</i> Küst.	0,10-20
<i>elegans</i> Müll.	0,10	<i>consociella</i> Frauenf.	0,10-20
<i>costulatum</i> Ziegl.	0,20-30		

	Mk.		Mk.
<i>gagathinella</i> Parr.	0,10-20	<i>Lithoglyphus</i>	
<i>longiscata</i> Bourg.	0,30	<i>naticoides</i> Fér.	0,10
<i>oranensis</i> "	0,10-20	" var. <i>aperta</i> Küst	0,20
<i>Bithynella</i>		" " <i>prasina</i> Kok	0,20
<i>abbreviata</i> Mich.	0,10-20	<i>fluminensis</i> Sadl.	0,10
<i>austriaca</i> Frauenf.	0,10	<i>pygmaeus</i> Frauenf.	0,10-20
<i>Charpentieri</i> Roth.	0,10-20	<i>fuscus</i> Pfr.	0,20-30
<i>Dunkeri</i> Frauenf.	0,10	<i>Valvata</i>	
<i>Ferussina</i> Desm.	0,20	<i>piscinalis</i> Müll.	0,10
<i>hungarica</i> Haz.	0,10-20	" var. <i>alpestris</i> Blaun	0,10-20
<i>Heynemanni</i> "	0,10-20	" " <i>antiqua</i> Sow.	0,10-20
<i>lata</i> Frauenf.	0,10-20	" " <i>fluvialis</i> Col.	0,10-20
<i>opaca</i> Ziegl.	0,10	<i>macrostoma</i> Steenb.	0,10-20
<i>Schmidti</i> Charp.	0,10	<i>cristata</i> Müll.	0,10
" var. <i>prasina</i> Schm.	0,10	<i>tolosana</i> St. Simon	0,20-30
<i>turgidula</i> Pal.	0,10-20	<i>baicalensis</i> Gerstf.	1,-1,50
<i>tornensis</i> Haz.	0,10-20	<i>Choanomphalus</i>	
<i>viridis</i> Poir.	0,20-30	<i>Maacki</i> Gerstf. (Baical-See)	1,-1,50
<i>pannonica</i> Frauenf.	0,10-20	<i>Schrencki</i> Dyb.	1,-1,20
(<i>Lithoglyphus</i> .)		<i>valvatoides</i> "	1,-1,20
<i>Amnicola</i>		<i>Melania</i>	
<i>conovula</i> Parr.	0,10-20	<i>Hollandri</i> Fér.	0,10-20
<i>cretica</i> Cless.	0,20-30	" var. <i>elegans</i> Schm.	0,20-30
<i>Dupotetiana</i> Forb.	0,10	" " <i>afra</i> Ziegl.	0,20-30
<i>Gaillardoti</i> Bourg.	0,20	" " <i>dalmatina</i>	0,10-20
<i>globulus</i> Müll.	0,20-30	<i>parvula</i> Schm.	0,30-40
<i>insubrica</i> Charp.	0,10-20	<i>tuberculata</i> Müll.	0,10-20
<i>luccensis</i> Stab.	0,20-30	<i>Melanopsis</i>	
<i>macrostoma</i> Küst.	0,10-20	<i>acicularis</i> Fér.	0,10-20
<i>marginata</i> West.	0,20-30	" var. <i>Audebardi</i> Prev.	0,10-20
<i>negropontina</i> Cless.	0,10	<i>thermalis</i> Brot.	0,10-20
<i>Salinessii</i> Phil.	0,10-20	<i>Esperi</i> Fér.	0,20-30
<i>seminulum</i> Charp.	0,10-20	<i>buccinoides</i> Oliv.	0,10-20
<i>similis</i> Drap.	0,10-20	<i>praerosa</i> L.	0,10-20
<i>vestita</i> Ben.	0,20	<i>costata</i> Oliv.	0,20-30
<i>Frauenfeldtia</i>		" var. <i>jordanica</i> Roth	0,20-30
<i>Lachaineri</i> Charp.	0,10	<i>nodosa</i> Fér.	0,60-80
" var. <i>alpestris</i> Villa	0,10-20	<i>Dufourei</i> Fér.	0,10-20
<i>tergestana</i>	0,10-20	" var. <i>Graëllsi</i> Villa	0,20-30
<i>Reynesi</i> Dup.	0,20-30	<i>lorcana</i> Guirao	0,20-30
<i>Vitrella</i>		<i>cariosa</i> L.	0,20-30
<i>acicula</i> Held	1,—	<i>Pyrgula</i>	
<i>pellucida</i> Benz	1,—	<i>annulata</i> Mühlf.	0,20
<i>Robiciana</i> Cless.	1,—	<i>Neritina</i>	
<i>vitrea</i> Drap.	1,-1,50	<i>nilotica</i> Rve. (africana).	0,20-30
<i>Belgrandia</i>		<i>Jordani</i> Sow.	0,20
<i>gibba</i> Drap.	0,10-20	" var. <i>turris</i> Mouss.	0,20-30
<i>Bourguignati</i> Pal.	0,20-30	" " <i>interposita</i> Mouss.	0,20-30
<i>Delpretiana</i> Paul.	0,20-30	<i>Michoni</i> Bourg.	0,20
<i>varica</i> Pag.	0,20-30	<i>Danubialis</i> Mühlf.	0,10
<i>Emmericia</i>		" var. <i>stragulata</i> Mühlf.	0,10
<i>patula</i> Brum	0,10-20	" " <i>carinata</i> Kok	0,10-20
" var. <i>ventricosa</i> Kutsch.	0,10-20	" " <i>serratilinea</i> Ziegl.	0,10-20
<i>Klecaki</i> Bourg.	0,20-30		

	Mk.		Mk.
<i>fluviatilis</i> L.	0,10	<i>Mutela</i>	
„ var. <i>halophila</i> Klett.	0,10	<i>nilotica</i> Fér.	1-2,50
„ „ <i>littoralis</i> L.	0,10	<i>rostrata</i> Rang	1—2
„ „ <i>salonitana</i> L.	0,10	<i>Sphaerium</i>	
„ „ <i>thermalis</i> Boul.	0,10-20	<i>riviculum</i> Leach	0,10-20
„ „ <i>rhodocalpa</i> Jan.	0,20	<i>solidum</i> Norm.	0,20
„ „ <i>dalmatina</i> Ziegl.	0,10-20	<i>corneum</i> L.	0,10
<i>transversalis</i> Ziegl.	0,10	<i>nucleus</i> Stud.	0,10
<i>meridionalis</i> Phil.	0,10-20	<i>Scaldianum</i> Norm.	0,10-20
<i>Velascoi</i> Graëlls	0,10-20	<i>mamillanum</i> Westl.	0,10-20
<i>valentina</i> „	0,20-30	<i>Draparnaldi</i> Cless.	0,10-20
<i>praevoztiana</i> Partsch	0,10	<i>Wildi</i> Cless.	0,20-30
<i>baetica</i> Lm.	0,10-20	<i>pallidum</i> Gray	0,20-30
<i>peloponnesiaca</i> Recluz	0,10-20	<i>lacustris</i> Müll.	0,10
<i>Unio</i>		<i>Steinii</i> Ad. Schm.	0,10-20
<i>littoralis</i> Lm.	0,20-40	<i>hungarica</i> Haz.	0,20-30
„ var. <i>elongatus</i> Dup.	0,40-50	<i>Rykholti</i> Norm.	0,20-30
„ „ <i>umbonatus</i> Rossm.	1-1,20	<i>Pisidium</i>	
<i>ater</i> Nils	0,10-30	<i>amnicum</i> Müll.	0,10
„ var. <i>consentaneus</i> Ziegl.	0,20-40	„ var. <i>elongatum</i> Baud.	0,10-20
„ „ <i>reniformis</i> Schm.	0,20-40	<i>supinum</i> A. Schm.	0,10
<i>batavus</i> Lm.	0,20	<i>Henslaviannm</i> Shepp.	0,10
„ var. <i>rivularis</i> Rossm.	0,20-30	<i>milium</i> Held	0,10-20
„ „ <i>amnicus</i> Ziegl.	0,20-30	„ var. <i>Normandianum</i> Dup.	0,20
<i>atrovirens</i> Schm.	0,20-40	<i>subtruncatum</i> Malm.	0,10-20
<i>desectus</i> Drouët	0,80-1	<i>pulchellum</i> Jen.	0,20
<i>pictorum</i> L.	0,20-30	<i>globulare</i> Cless.	0,20
<i>longirostris</i> Ziegl.	0,30-40	<i>pallidum</i> Jeff.	0,10
<i>spinelli</i> Villa	0,40-50	<i>nitidum</i> Jen.	0,20
<i>cumanus</i> Kob.	0,80-1	<i>obtusale</i> C. Pfr.	0,10
<i>Moreleti</i> Desh.	0,50-60	„ var. <i>personatum</i> Malm.	0,20-30
<i>pallens</i> Parr.	0,50-60	<i>roseum</i> Scholz	0,20-30
<i>tumidus</i> Retz.	0,20-30	<i>intermedium</i> Gass.	0,10-20
„ var. <i>saccatus</i> Rossm.	0,40-50	<i>rivulare</i> Cless.	0,10-20
<i>aegyptiacus</i> Call.	0,20-30	<i>fossarinum</i> „	0,10
<i>Margaritana</i>		„ var. <i>acuminatum</i>	0,10
<i>margaritifera</i> Retz.	0,80-1,20	„ var. <i>curtum</i>	0,10-20
„ var. <i>minor</i> Rossm.	0,50-80	<i>Heldreichi</i> Cless.	0,10-20
<i>Anodonta</i>		<i>casertanum</i> Poli.	0,20
<i>cygnea</i> L.	1—3	<i>italicum</i> Cless.	0,10-20
<i>cellensis</i> Schrt.	0,20-1	<i>Corbicula</i>	
<i>rostrata</i> Kock	0,30-50	<i>fluminalis</i> Müll.	0,30-50
<i>piscinalis</i> Nils	0,20-30	<i>radiata</i> Parr.	0,40
„ var. <i>ponderosa</i> C. Pfr.	0,40-80	<i>pusilla</i> Phil.	0,50-1
„ <i>anatina</i> L.	0,20-30	<i>Dreissana</i>	
<i>idrina</i> Spinelli	0,30-40	<i>polymorpha</i> Pall.	0,10-20
<i>submacilenta</i> Serv.	0,40-50		

Bei sofortiger Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschvereins 10^o Rabatt.

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren.

Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

TAUSCH-CATALOG 1884 No. 2

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

	Mk.		Mk.
Vitrina			
hyalina Fér. Australien	0,40	bituberculata Pfr. Ecuador	1,50
limpida Gould N.-America	0,30	Bainbridgei Pfr. Jamaica	3,—
monticola Bens. Himalaya	1-1,20	bipartita Fér. Australien	2,—
Natalensis Krss. Natal	0,50-80	Brasiliana Desh. Brasilien	1,50-2
Welwitschi Mor. Angola	1,50-2	Brocheri Guitier Cuba	0,60-1
		Bourcierii Pfr. Ecuador	2,50
		badia Fér. I. Martnq.	0,30
Helicarion			
imperator Gould China	6,—	Bermudensis Pfr. Bermuda	0,30-40
præcellens v. Mrt. I. Salanga	6,—	Berlanderiana Moric. Arcans.	0,30-50
nucleata Stolic. "	1,50-2	Boivini Petit Salomon-Ins.	1,20
		Brumeriensis Forb. N.-Guin.	3,—
Hyalinia			
arborea Say N.-America	0,20-30	Cubensis Pfr. Cuba	0,30-50
Gundlachi Pfr. St. Thomas	0,10-20	cereolus Mühlf. Florida	0,20-40
gularis Say N.-America	0,30	Columbiana Lea N.-America	0,40
interna " "	0,30	caeca Gupp. Trinidad	0,20-30
lineata " "	0,20	capensis Pfr. Cap	0,50
ligera " "	0,30-50	californiensis Lea Californ.	0,40-60
labyrinthica Say Florida	0,10-20	cyclostomata Guill. Austral.	0,20-30
lasmodon Phil. Alabama	0,30	Caldwelli Bens. Mauritius	0,30-50
		clausa Say N.-America	0,50
Anostoma			
ringens L. Brasilien	8—10	Charpentieri Pfr. Ceylon	2-2,50
ringicula Fér. "	1,80-2,50	Coxi Cross. Australien	0,60-1,50
		caracolla L. Portorico	1-2,80
Patula			
alternata Say N.-America	0,20-40	connivens Pfr. China	1—2
acetabulum Pse. Raiatea	0,20-30	Cunninghami Gray Austral.	2,50-3,50
Calliope Cross. N.-Caledon.	0,40	cicatricosa Müll. China	0,50-1
fabrefacta Pse. I. Raiatea	0,30	Chancei Cox Australien	2—3
fratercula " I. Rorotonga	0,20	Darnandi Pfr. juv. Abessin.	0,30-50
perspectiva Say N.-America	0,20-30	Dupetitthouarsi Desh. Calif.	0,30-50
solitaria " "	0,40-50	discolor Fér. Cayen.	0,80-1
striatella Anth. "	0,20-30	Duvali Petit Madagascar	2,50-3
Heynemanni Pfr. Raiatea	0,20-30	dentiens Duvali Marting.	0,30-50
jugosa Migh. Sandw.-Insel	0,20	delitescens Shuttl. Bermuda	0,20-30
		dictyodes Pfr. N.-Caledon.	1,20-2
Helix			
aspera Fér. Jamaica	2—3	errones Alb. Ceylon	0,80-1
acutissima Desh. "	0,80-1,20	erinacea Pfr. Australien	1-1,20
appendiculata Pfr. Austral.	1-1,20	exoleta Binney N.-Amer.	0,30-40
appressa Say Pensylv.	0,30	elevata Say "	0,30-40
anomala Pfr. Jamaica	0,60	Eddystonensis Rv. Eddyst.-I.	1,—
auricoma Fér. Cuba	0,80-1	emoriens Grdlr. China	0,80-1
Ambrosia Ang. Salomon-Ins.	0,50	Farafanga Ads. Madagasc.	8—10
Ariadnae Pfr. N.-America	0,20-30	Falconari Rve. Australien	2—4
acmella Pfr. Salomon-Insel	2,—	funebri Crosse Madagascar	1,20
auriculata Say Florida	0,40	fibula Brod. Philippinen	1,—
achatina Gray Ceylon	2,—	fidelis Gray Californien	0,50-1
atrata Pfr. Ecuador	3,—	Feisthameli Hupé Brasilien	1—3
Aphrodite Pfr. Salomon-Ins.	2,50-3	fringilla Pfr. Salomon-Ins.	0,50-80
alauda Fér. Cuba	0,40-60	fimbriosa Mart. China	1-1,20
Buffoniana Pfr. Mexico	2—4	fallax Say N.-America	0,30
Bonplandi Lm. Cuba	1,—	Fraseri Gray Australien	0,80-1,50
bifasciata Burr. Brasilien	1,—	Gibboni Pfr. Brasilien	10,—
		Guestieriana Crosse Madag.	2,50-3,50
		Gerrardi Smith N.-Guinea	10—12
		globulus Müll. Cap	1,50

	Mk.		Mk.
Geali Smith Ecuador	10—12	profunda Say N.-America	0,40
Grayana Pfr. Australien	0,60-1	pomum Pfr. Australien	1—2
Guillaini Petit Madagascar	1,50	pachystyla Pfr. "	1,50-2
guatamensis Poey Cuba	1,20	pachystyloides Cox "	1,20-2
Gaberti Less. N.-Guinea	1,80	pellis serpentis Ch. Brasilien	3—4
hirsuta Say N.-America	0,20-30	Palavanica Pfr. Palavan-Ins.	1,50-2
Humboldtiana Val. Mexico	3—4	parvula Rang Sénégal	0,50-1
Hombroni Pfr. Australien	1-1,20	papilla Müll. Celebes	10,—
helicinoides Hombr. Salom. I.	0,80	plicata Born. Venezuela	2,—
haemastoma L. Ceylon	0,30-60	planulata Lm. Philippinen	0,80-1
Hunteri Cox Salomon-Ins.	0,80-1	palliata Say N.-America	0,40
imperator Mft. Cuba	8,—	pileus Müll. N.-Guinea	3,—
Jamaicensis Ch. Jamaica	1,50	pelionphala Pfr. Japan	1,20
Incei Pfr. Australien	0,60-1	pachygastra Gray Guadel.	0,50
Josephinae F. I. Guadeloupe	0,60-1	peracutissima Ad. Jamaica	2,—
intorta Sow. (Cochlostyla)		polygyrata Born. Brasilien	2,—
I. Bohol.	0,80-1	pyrrhizona Phil. China	0,30-40
inflecta Say N.-America	0,30	picturata Ad. Jamaica	0,80
incerta Fér. I. Tortola	0,60-80	Phoenix Pfr. Ceylon	1-1,50
Listeri Gray Philippinen	0,80-1,20	pulicepa v. Mart. Halmaheira	3,—
Luquillensis Sh. Portorico	2,50	paludosa " Cuba	0,30
Lambei Pfr. Admiral-Ins.	1-1,20	platyodon " China	2,—
loricata Gould Californien	0,20-30	Pensylvanica Green N.-Am.	0,40
loxotropis Pfr. Halmaheira	3—4	pyrostoma Fér. Ternate	10—18
leucophthalma Dhr. I. Sang.	8,—	rostrata Pfr. Cuba	1,20-1,50
labyrinthus Chem. Venezuela	7—8	Rugeli Sh. Teness.	0,30-40
lanx Fér. Madagascar	1,50-2	rota Brod. Philippinen	1,20
Lessoni Pfr. Australien	1-1,20	Rainbirdi Cox S. Denis	1,50
Launcestonensis Rv. Tasman.	2,50-3	stenotrema Fér. O.-Indien	0,40
lychnuchus Müll. I. Martinq.	0,80	sepulchralis " Madagasc.	0,80-1
lima Fér. Cuba	1,20	Sowerbyana Fischer "	3—4
microdonta Desh. I. Bermuda	0,20-30	similaris Fér. China	0,20
Mackensii Ad. et Rv. Japan	1,50	sinuata Müll. Jamaica	0,50-60
Mac. Gregori Cox N. Hebrid.	1-1,50	subaquilla Sh. Cuba	0,30
Mühlfeldtiana Pfr. Austral.	3,—	semirugata Beck. Bengalen	0,80
melanotragus Born. Ceylon	0,40-80	stenostoma Pfr. Cuba	0,30-40
meta Pfr. Admiral-Ins.	1-1,50	Touranensis Soul. Cochinch.	0,40
multilineata Say N.-America	0,40	Trailli Pfr. Palavan-Ins.	2,50
migratoria Pfr. Salom.-Ins.	0,60	Tuckeri Pfr. Australien	0,30
marginata Born Cuba	1,—	tenera Reinh. Japan	0,30-40
minuscula Binn. Amer. br.	0,10-20	thyroides Say N.-America	0,30-40
majuscula Pfr. Australien	2,50	Troscheli Pfr. I. Bahama	0,40
Maecki Gstf. Amur.	2-2,50	Texasiana Morl. Texas	0,30
magnifica Fér. Madagascar	2—3	tridentata Say N.-America	0,30
Maconelli Rve. Australien	3,—	tudiculata Binn. Californ.	1-1,20
Mac-Leayi Cox P. Denis	0,80	tricolor Pfr. Salamon-Ins.	1-1,20
monodon Racktt. N.-Amer.	0,30	triscalpta Mart. China	3—4
Mitchelliana Lea Ohio	0,40	unidentata Chm. Seychellen	1,50
muscarum Lea Cuba	0,40-50	uvulifera Sh. Florida	0,20-30
Mulgoae Cox Mulgoa	2,—	varians Mke. Cuba	0,20-30
Ortoni Crosse Ecuador	1,50	versicolor Müll. Florida	0,40
Oreas Koch Venezuela	3—4	vortex Pfr. Antillen	0,30
ovum reguli Lea Cuba	0,80	vittata Müll. Ceylon	0,50-60
orbiculata Fér. Guyana	0,80-1	Whartoni Cox Australien	1-1,50
oxystoma Smith Neu-Guinea	9—12	Waltoni Rve. Ceylon	2-3,50
pyxis Hinds Salom.-Ins.	1-1,20	xanthocheilus Pfr. Salam.-I.	2,50
pulvinaris Gould China	1-1,20		

Bei sofortiger Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschvereins 10% Rabatt.

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren.

Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut

Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

TAUSCH-CATALOG No. 3 1884

der deutschen malakozologischen Gesellschaft.

	Mk.		Mk.
Melampus.			
Adamsianus Pfr. N.-Caledon.	0,20	giganteus Gray Columbia	3,—
affinis Desh. Dahlak	0,20-30	Hunanus Grdl. Hunan	1-1,20
Australis Quoy Australien	0,30-40	Jamaicens Chem. Jamaica	0,50-60
caffer Krss. Sulu-Ins	0,10-20	Inca Orb. Brasilien	1,—
castaneus Mühlf. Sandw.-I.	0,20-30	latecostatus Kob. Philippin.	0,50-60
cingulatus Pfr. Cuba	0,20	Lowianus Pfr. Labuan	0,60
coffeus L. Antillen	0,20-30	Popayanus Lea N.-Granada	0,60-80
exesus Sossies N.-Caledon.	0,30	seminudus Ads. Jamaica	0,50-60
fasciatus Desh. Sulu-Insel	0,20-30	Cyclosurus.	
flavus Gmel. Antillen	0,30-40	Mariei Morl. I. Mayotte	5—8
fuscus Desh. Samoa-Ins.	0,20	Pterocyclos.	
luteus Quoy Gesellsch.-Ins.	0,20-30	brevi Mart. Philippinen	2,—
lividus Desh. Mauritius	0,20-30	Alycaeus.	
Massauensis Ehrbg. Massaua	0,10-30	pyramidalis Bens. Salanga	1,—
Montrouzieri Sow. N.-Caled.	0,20-30	strangulatus Hutton O.-Ind.	0,30
olivaceus Carp. Californien	0,20	Diplomatina.	
pusillus Gm. Antillen	0,20-30	Huttoni Pfr. var. occidentale	
Siamensis Mart. Siam	0,20-30	Trinidad	0,10-20
strictus Cass. N.-Caledon.	0,30-40	pachycheilus Born Dargeling	0,20-30
tabagensis Ads. Panama	0,20-30	Craspedopoma.	
variabilis Gass. N.-Caledon.	0,20-30	lucidum Lowe Madeira	0,20-30
zonatus Mühlf. Philippinen	0,20-30	Cyclophorus.	
Pedipes.			
afer Gm. Afric. occid.	0,20-30	aquila Sow. Singapore	1—2
affinis Fér. Mauritius	0,40	Apiæ Reclz. Samoa-Insel	0,40
Pythia.			
leopardus Rve. N.-Caledon.	0,50-60	aurantiacus Sch. Salanga	3,—
pantherina Ads. Philippin.	0,50-60	Borneensis Mtcl. Borneo	1,50-2,50
" var. minor "	0,40	canaliferus Sow. I. Luzon	0,80
plicata Fér. Bengalen	0,60-1	Cantori Bens. Salanga	0,60-80
pollex Hinds Viti-Insel	0,60-80	eximius, Mouss. Sumatra	7—10
trigona Troschel Philipp.	0,30-50	exaltatus Pfr. Honkong	0,80
Plecotrema.			
rapax Dohrn M. rubrum.	0,40	fulguratus " Pegu	1-1,20
Cassidula.			
angulifera Pet. Australien	1,—	Indicus " Ind. orient.	1—2
inflammata Bolten		patens Blfd. Pegu	2-2,50
(= felis Lm.) Ostindien	0,50-80	perdix Brod. et Sow. Sumatr.	1,20
Kraussi Küst Mauritius	0,30-40	planorbis Blfd. O.-Indien	0,60
labrella Desh. M. rubr.	0,20-30	punctatus Sow. Ceylon	0,80
mustellina " N.-Zealand	0,30-50	raripilus Morl. Mayotte	0,50
nucleus Martyn Otaheiti	0,20-40	semisulcatus Sow. Malacca	1,20
sulculosa Mss. Viti-Insel	0,20-30	trigrinus Sow. Samar.	1,50-2
Auriculus.			
auris-Judæ L. Java	1—2	Upolensis Mss. Upolu	0,30-50
auris-Malchi Müll. Moluccen	3,—	validus Sow. Philippinen	2,50
auris-Midæ L. Java	1—3	Wahlbergi Bens. Cap.	0,40-50
elongatus Parr. Sandw.-I.	0,30-40	Woodianus Lea I. Luzon	1,—
Gangeticus Bens. Calcutta	0,30-40	Leptopoma.	
semisculptus Ads. Viti-Insel	0,30-50	acutimarginatum Sow. Samar	1,20
Cyclotus.			
auriculatus Kob. Philippin.		Dohrni Ads. et Ang. N.-Irl.	0,50
campanulatus Mart. Hunan	1-1,50	distinguendum Dohrn Philip.	0,50
Caroli Kob. I. Bohol	0,50-60	sericatum Pfr. Borneo	0,40
Dysoni Pfr. Mexico	0,50-1	vitreum Less. Salanga	0,30-40
		Megalommastoma.	
		altum Sow. I. Negros	1,50-2
		alutaceum Mke. Cuba	1—2
		Antillarum Sow. I. Tortola	0,40-50
		auriculatum D'Orb. Cuba	1-1,50
		cylinidraceum Chem. Portor.	1—2
		funiculatum Bens. Dargeling	1,50-2

		Mk.			Mk.
Gundlachi Pfr.	Cuba	2,—	bicarinatus „	Madagasc.	1,20
leonium „	„	2,—	carinatus Born	Mauritius	1—2
Loweï Ads.	Borneo	1,—	Chevalieri Ads.	Jamaica	0,20-30
Mani Poey	Cuba	1,50	campanulatus Pfr.	Madagasc.	1-1,50
Orbigny Pfr.	Haiti	1,50-2	Cuvierianus Pet.	„	4—5
procer Poey	Cuba	1,50-2	filostratus Sow.	Madagasc.	0,80-1
seminudum Poey	„	1,50-2	Humphreysianus Pfr.	Jamaic.	0,20-30
sectilabrum Gould	Labuan	1-1,50	Jayanus Ads.	„	0,10-20
ungula Poey	Cuba	1,50-2	levis Pfr.	Salomon-Ins.	0,20-30
Tomocyclus.			Lachaineri Gdlch.	Cuba	0,40
simularum Mor.	Guatemala	2—3	Newcombianus Ads.	St. Jan	0,30-40
Catantus.			Rollei Weinl.	Haiti	0,30-40
Austenianus Bens.	Ceylon	2,—	solidulum Gdlch.	Cuba	0,30
decorus „	„	2,50-3	semilabre Lm.	Haiti	0,50-60
haemastomus Pfr.	„	4—5	tractum Gdlch.	Cuba	0,40-60
pyramidatus „	„	2,—	tricarinatus Müll.	Mauritius	0,80
Templemanni „	„	3,—	unicolor Pfr.	„	0,60-1
Thweitesi „	„	2,—	„ v. sulcatus „	„	0,50-1
Pupinella.			zonulatus Fér.	Madagascar	1,20
rufa Sow.	Japan	0,30-40	Tudora.		
Pupina.			Augustae Ads.	Jamaica	0,30
Ambigua Semp.	Luzon	0,30	columna Wood	„	0,40-60
bilinguis Pfr.	C. York	0,30-40	megachila Pot. et M.	Curacao	0,40-50
complanata Psl.	Marshall-I.	0,30	versicolor Pfr.	„	0,40-50
Cumingiana Pfr.	N.-Hebrid.	0,20-30	Cistula.		
ephippium Grdlr.	Hunan	0,50-60	ruflabris Beck.	S. Croix	0,10-20
fusca Gray	Luzon	0,30	Chondropoma.		
grandis „	Palaos-Insel	0,30	limbiferum Mke.	Haiti	0,40-60
meridionalis Pfr.	P. Dennison	0,30	marginalbum Gdlch.	Cuba	0,50-60
polita Ads.	Salomon-Ins.	0,30-40	Newcombianum Pfr.	St. Thom	0,20-30
pulchella Möll.	Hunan	0,40	obesum Mke.	Cuba	0,30-50
Pfeifferi Dohrn.	Lizard-Ins.	0,30-40	pictum Pfr.	„	0,60-80
puncticola Crosse	Austral.	0,30	pudicum Orb.	„	0,60
robusta Cox	„	0,30-40	revinctum Poey	„	0,50-60
Choanopoma.			sacrum „	„	0,80-1
fimbriatulum Sow.	Jamaica	0,30-50	Realia.		
hystrix Wright	Cuba	1—3	Cheneyi Dohrn	Peleliu-Ins.	0,20-30
scabriculum Sow.	Jamaica	0,60-80	manpiensis Grt.	Manpili-Ins.	0,20-30
Yaterascense Pfr.	Cuba	0,60	Blandiella.		
Ctenopoma.			reclusa Guppy	Trinidad	0,30
semicoronatum Gdlch.	Cuba	0,40-60	Trochatella.		
Adamsiella.			pulchella Gray	Jamaica	0,10-20
Grayana Pfr.	Jamaica	0,50-60	regina Mor.	Cuba	0,80-1,50
variabilis Ads.	„	0,30-40	Tankervillei Gray	„	0,80-1
Otopoma.			Lucidella.		
cuilini Pet.	Zanzibar	2,—	aureola Fér.	Jamaica	0,10-20
Listeri Cray	Mauritius	0,30-40	„ v. granulosa Ads.	„	0,10-20
Cyclostomus.			Alcadia.		
albus Sow.	Jamaica	0,40	Brownei Gray	Jamaica	0,40
articulatus Gray.	I. Rodrg.	1,—	„ v. alba „	„	0,30
balteatus Say	Madagascar	0,80-1,20	Hollandri Pfr.	„	0,30
Barelayanus Pfr.	Mauritius	0,80-1,20	major Gray	„	0,30-40
Banksianus Sow.	Jamaica	0,30-40	palliata Ads.	„	0,20-30

Bei sofortiger Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschvereins 10 % Rabatt.

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren.

Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut

Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

TAUSCH - CATALOG No. 4

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

	Mk.		Mk.
<i>Nanina.</i>		<i>Dattaensis</i> Semp.	Philipp. 2,—
<i>atrofusca</i> Alb.	Borneo 2,—	<i>Dryas</i> Brod.	" 1,—
<i>bistrialis</i> Bk.	Hymalaya 1-1,20	<i>electrina</i> Rve.	" 2,—
<i>Brookei</i> Ads. et Rve.	Borneo 7—9	<i>Faunus</i> Brod.	I. Zebu 2,—
<i>Cambojensis</i> Rve.	Siam 12—20	<i>fulgetrum</i> Brod.	Philipp. 2—3
<i>citrina</i> L.	Ceram 0,60-1	<i>Iloconensis</i> Sow.	" 0,60-80
<i>Decrespignyi</i> Higg.	I. Labuan 2—3	<i>Leai</i> Pfr.	" 1,—
<i>densa</i> Ads. et Rve.	Philipp. 2,—	<i>leucophaea</i> Sow.	I. Luzon 1,—
<i>distincta</i> Pfr.	Cochinchina 1,50-2	<i>var. concinna</i>	" 1,20
<i>glanca</i> Bens.	Himalaya 0,30-40	<i>lignaria</i> Pfr.	I. Mindoro 2,—
<i>Humphreysiana</i> Lea.	Philipp. 0,60-1	<i>luzonica</i> Sow.	Philippinen 2,—
<i>inversicolor</i> Fér.	Mauritius 0,40-1	<i>matruelis</i> Sow.	" 1,80
<i>leucostyla</i> Pfr.	" 0,50-60	<i>metaformis</i> Fér.	" 1,50-1,80
<i>Nouletii</i> Lequill.	Viti Ins. 0,50-60	<i>Mindoroensis</i> Brod.	I. Mind. 1,50-2
<i>ovum</i> Val.	Philippinen 2,50-3	<i>mirabilis</i> Fér	I. Luzon 1,50-2
<i>porphyrea</i> Pfr.	" 1,50-2	<i>monticola</i> Sow.	" 1,50-2
<i>rareguttata</i> Mss.	Timor 1,50	<i>Najas</i> Pfr.	Celebes 0,80-1
<i>regalis</i> Bens.	Borneo 1,50-2	<i>nimbosa</i> Brd.	Philippinen 2—3
<i>resplendens</i> Phil.	Salanga 0,60-1,20	<i>nympha</i> Pfr.	" 1,50-2
<i>semiglobosa</i> Pfr.	Philipp. 1,50	<i>opalina</i> Sow.	I. Luzon 2,—
<i>semigranosa</i> Rve.	Labuan 2,—	<i>Pfeifferiana</i> Brod.	Philipp. 2—3
<i>Sophiae</i> Gask.	Lord Howes I. 1—2	<i>Polillensis</i> Pfr.	I. Polillo 1,1-50
<i>Sowerbyana</i> Pfr.	Philipp. 2-2,50	<i>polychroa</i> Sow.	" 1,50
<i>striata</i> Gray	Salanga 0,40-50	<i>pulcherrima</i> Sow.	Philipp. 0,60
<i>trifasciata</i> Chm.	Bombay 1-1,20	<i>rufogaster</i> Less.	" 3—4
<i>Uranus</i> Pfr.	Polillo Ins. 5	<i>speciosa</i> Jay	" 1,50-2,50
<i>vitrinoides</i> Desh.	Bengalen 0,60-80	<i>stabilis</i> Sow.	" 1,—
<i>Weinkauffiana</i> Crosse		<i>Valenciennesii</i> Eyd.	" 1,20
	Cochinchina 0,40-50	(Helix)	
<i>Wilsoni</i> Semp.	Palaos Ins. 0,20-30	<i>virgo</i> Brod. (Helix)	" 1,20-1,50
<i>Trochonanina.</i>		<i>zonifera</i> Sow.	" 1,20-2
<i>Jenynsi</i> Pfr.	Zanzibar 0,10-20	<i>zebuensis</i> Brod. (Hel.)	" 2,—
<i>Mozambicensis</i> Pfr.	" 0,20-30	<i>Bulimus.</i>	
<i>Macrocyclus.</i>		<i>albizonatus</i> Rve.	Ceylon 1,50-2
<i>Vancouverensis</i> Lea	Calif. 0,50-60	<i>Alexander</i> Cross.	N. Caled. 2,50-3,50
<i>Trochomorpha.</i>		<i>auris-leporis</i> Brug.	Brasil. 0,60-80
<i>apia</i> Hombr.	Hebriden 0,40	<i>bilabiatus</i> Brod.	Bahia 3,50
<i>Belmorei</i> Cox	Salomon Ins. 0,60-80	<i>Blainvillaeus</i> Pfeiffer	
<i>castra</i> Bens.	Salanga 0,60-80		Venezuela 2,50
<i>entomostoma</i> Hombr.	Carol. 0,60-1	<i>Cantagallanus</i> Rang.	Brasil. 2,—
<i>Lomonti</i> Braz. n. sp.	Guinea 0,60-80	<i>Ceylonicus</i> Rve.	Ceylon 2,—
<i>Metcalfei</i> Pfr.	Philippinen 0,40-60	<i>Cleryi</i> Pet.	Salom. Ins. 4-4,50
<i>nigritella</i> Pfr.	Carolin. 0,20-40	<i>coloratus</i> Nyst.	Venezuela 2,—
<i>retangular</i> Pfr.	Ins. Marq. 0,30	<i>comes</i> Pfr.	Cambodja 2,—
<i>sculptularina</i> v. Mart.	Sal. 1-1,50	<i>contrarius</i> Müll.	I. Timor 0,80
<i>Swainsoni</i> Pfr.	Raiatea. 0,40	<i>var. furcillatus</i> Mss.	Borneo 1,50-2
<i>trochiformis</i> Fér.	Tahiti 0,30	<i>var. subconcolor</i>	I. Timor 0,50-60
<i>troilus</i> Gould	Samoa Ins. 0,40-50	<i>crenulatus</i> Pfr.	Chile 0,60
<i>Cochlostyla.</i>		<i>dentatus</i> Wood	Uruguay 0,60-80
<i>annulata</i> Sow.	Philippinen 0,60-80	<i>distortus</i> Brüg.	Venezuela 1,—
<i>aspera</i> Grt.	" 3,—	<i>exesus</i> Spix	Brasilien 1,50-2
<i>balteata</i> Sow.	" 0,50-80	<i>eximius</i> Alb.	N. Calodon. 4—6
<i>Boholensis</i> Brod.	" 1,20	<i>fibratus</i> Martyn	" 2-2,50
<i>calobapta</i> Jon.	I. Mindoro 1,20-2	<i>Founaki</i> Hombr.	Salom. I. 1,80
<i>chrysallidiformis</i> Sow.	Phil. 2,—	<i>fulguratus</i> Jay	Viti Ins. 1,—
<i>cinnus</i> Sow.	" 0,40-60	<i>fusiformis</i> Rang	Philippinen 1,20-1,80
		<i>Grayanus</i> Pfr.	Brasilien 3,50

	Mk.		Mk.
illheocala Moric. Bahia	2—3	pupiformis Brod. Chile	0,60
interruptus Müll. Moluccen	0,50-1	rhodostomus Gray Swan River	1,—
inversus Müll. Singapore	1-1,20	saccatus Pfr. Peru	0,50-1,20
luzonica Sow. Philippinen	1,50-2	Sachsei Alb. Columb.	1,—
Mac. Farlandi Cox Salom. I.	2,50-3	scalariformis Brod. Peru	0,40-50
maculiferus Sow. Mindan.	2-2,50	sepulchralis Poey Havan.	0,40
magnificus Grt. Brasilien	2,—	sporadicus Orb. S. America	1,—
malleatus Jay Viti Ins.	1,20	terebralis Pfr. Peru	0,60
melanostomus Sw. Brasilien	1-1,50	violaceus Mss. Bolivia	1,20
mittocheilus Rve. Salom. I.	1—2	virgulatus Fér. St. Thomas	0,30-40
navicula Wag. Bahia	2,—	var. caribaeorum Lm. Antill.	0,30-40
obliquus Pfr. „	0,50-80	var. Kammereri St. Croix	0,40
oblongus Müll. S. Amerika	0,50-1,50	vittatus Spix Brasilien	0,40-1
pachychilus Pfr. Chile	1,—	Porphyrobaphe.	
Pancheri Crosse N. Caled.	1,50	Fungainrinoi Hid. Ecuador	3-3,50
perversus L. Singapore	0,50-80	ioistomus Sow. Chile	1,50-2,50
piperitus Sow. var. Peru	0,60	Saturnus Pfr. Peru	4—5
planidens Müll. Brasilien	3,50	Orthalicus.	
porcellanus Rve. Java	0,60-80	fasciatus Müll. Cuba	0,80-1
pudicus Müll. Brasilien	1—2	gallina-Sultana Chm. Guyana	1—3
rosaceus King Chile	0,80-1,50	phlogerus D'Orb. Bolivia	1—2
Sanchristovalensis Cox		pulehellus Spix Brasilien	0,80-1
Salom. Ins.	2,—	zebra v. undatus Brug. Trinid.	0,20-40
Seemanni Dhrn. Viti Ins.	4,—	var. albus Venezuela	0,40
Shongii Less. N. Seeland	3,—	Liguus.	
signatus Spix Bahia	1,20	Blainianus Poey Cuba	1,—
sinistralis Rve. Java	1,—	virgineus L. „	0,50-1
Strangei Pfr. Eddyst. Ins.	0,80-1	Perideris.	
Wagneri Pfr. Brasilien	1-2,50	alabaster Rang. I. Princip.	0,80
Bulimulus.		Martense Smith defect!	
albus Sow. Chile	0,30	Tanganjka See	2,50
alternans Beck Panama	0,60	Limicolaria.	
Altoperuvianus Rve. Peru	1,50-2	Adansoni Pfr. Senegal	1,50-2,50
Anguillensis Pfr. Anguilla	0,60	flammea Müll. W. Afrika	1,20
apodemetes Orb. Bolivia	0,50	Pyrrrha Alb. Afric. occid.	2,—
Capueira Spix Brasilien	1,50	tenebrica Rve. W. Afrika	0,80
Catlowiae Pfr. Gallop.	1,—	turbinata „ Liberia	1-1,50
dealbatus Say Alabama	0,40	Achatina.	
derelictus Brod. Bolivia	0,40	balteata Rve. Gambia	1,20
exilis Gm. Westind.	0,10-20	cebra South Africa	0,60
var. Guadaloupensis Gdl.		fulica Fér. Mauritius	0,40-1
Guadeloupe	0,20-30	inornata Pfr. Ceylon	0,80
Farrisii Pfr. Peru	1,50-2	marginata Sw. Guinea	1,20-1,50
fraterculus Fér. Westind.	0,50	panthera Fér. Madagascar	0,40
Hartwegi Pfr. Ecuador	2,50	reticulata Pfr. Zanzibar	4,50
Jonasi Pfr. Br. Honduras	0,80-1	semisculpta Pfr. Bengalen	0,80-1
Knorri „ Venezuela	2,—	suturalis Gabon	1,20
Laurentii Sow. Peru	0,30-40	Pseudachatina.	
Lobbii Rve. „	0,30	Downesii Gray Fernando	5,—
Mariae Alb. Mexico	0,80	Wrighti Sow. Old. Calabar	4-4,50
nigrofasciatus Pfr. N. Granada	0,60	Carelia.	
nux Brod. Gallop.	0,80-1	Cumingiana Pfr. Sandw. I.	3,00
Nystianus Pfr. Quito	1,20	Columna.	
Onager Beck Brasilien	0,80-1	flammea Martyn I. Princip.	6,—
Peruvianus Brug. Peru	0,80-1	Eucalodium Blandianum	
Philippii Pfr. „	0,50	Cross. et F. Mexico	6,—
Proteus Brod. „	1,—		

Bei sofortiger Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschvereins 10 % Rabatt.

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren

Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut

Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

No. 54.

1884.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

TAUSCH-CATALOG No. 5

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Meeresconchylien

aus dem palæarktischen Faunengebiete.

Die genaueren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.

	Mk.		Mk.
Ovula.		Cassidaria.	
adriatica Sow.	0,30-50	echinophora L.	0,20-50
carnea Poir.	0,20-30	tyrrhena Kien.	3—5
" var. albida	0,40	Dolium.	
spelta L.	0,40-60	galea L.	0,50-1
Cypraea.		Cyclope.	
europaea Mtg.	0,10-20	nerita L.	0,10-20
lurida L.	0,30-1	" var. pellucida	0,10-20
pyrum Gm.	0,50-1	" " Kamiesch Dsh.	0,20-30
pulex Sol.	0,10-20	Nassa.	
spurca L.	0,30-50	Cuvieri Payr.	0,20
Erato.		cornicula Oliv.	0,10-20
laevis Don.	0,20-30	gibbosula L.	0,20-50
Marginella.		incrassata Müller.	0,10-20
clandestina Broc.	0,20-30	limata Chm.	0,30-60
miliaria L.	0,10	mutabilis L.	0,20-40
minuta Pfr.	0,20-30	obsoleta Say	0,20-30
Cymbium.		reticulata L.	0,20-30
papillatum Schum.	2,—	trivittata Say	0,10-30
Mitra.		varicosa Turt.	0,20-30
cornicula L.	0,20-40	variabilis Phil.	0,10-20
ebenus Lm.	0,30-50	Buccinum.	
tricolor Gm.	0,10-20	Amaliae Verkr.	2—4
Columbella.		elegans " defect!	2—3
avara Say	0,30-40	fragile "	1—3
Hollbölli Möller	0,80-1,20	finmarchianum Verkr.	0,50-1,50
lunata Sow.	0,20	glaciale L.	2—4
minor Scac.	0,20-40	groenlandicum Chm.	0,50
rustica L.	0,10-20	Humphreysianum	
scripta L.	0,10-20	Ben.	2—4
" v. Gervillei Payr.	0,10-20	undatum L.	0,30-1
Cassis.		" var. pelagicum	
saburon Brug.	0,30-60	Sars	0,50-1
sulcosa Brug.	0,20-1	" var. zetlandic.	
		Jeffr.	1—2
		undulatum Möll.	2—3

	Mk.		Mk.
Totteni Stimps	3—4	var. Gunneri Lov.	1,50-1,50
tenuis Gray	3—4	cinereus Say	0,40-80
Purpura.		Geversianus Pall.	2—5
canaliculata Ducl.	0,30-50	muricatus Mtg.	0,40-80
emarginata Desh.	0,60-80	truncatus Ström.	0,20-50
haemastoma L.	0,20-50	Polia.	
lapillus L.	0,10-20	D'Orbygni Payr.	0,10-20
var. imbricata Lm.	0,20-30	leucozona Phil.	0,20-40
lactuca Esch.	0,80-2	picta Scacchi.	0,60-80
Coralliophila.		Pisania.	
scalaris Broc. =		maculosa Lm.	0,10-20
Meyendorfi Calc.	1-1,50	Entria.	
Ocenebra.		cornea L.	0,20-50
aciculata Lm.	0,20-40	var. minor.	0,30
Edwardsi Parr.	0,10-30	Neptunea.	
erinacea L.	0,30-2	antiqua L.	0,50-1
var. Tarentina Lm.	0,50-1	Beringii Midd. defect!	6,—
gibbosa Lm.	1—3	despecta L.	1—3
Murex.		var. carinata	1—3
brandaris L.	0,20-1	var. varicosa-carinata	2—4
var. coronatus	1—2	decemcostata Say	3—8
cristatus Broc.	0,20-40	tornata Gould	3-4,50
trunculus L.	0,20-1	Turtoni Bean.	4—10
Tiphys.		Sipho.	
tetrapterus Bronn	0,50-1	curtus Jeffr.	3—10
Tritonium.		gracilis F. et H.	1—2
corrugatum Lm.	0,50-2	glaber Verkr.	2—5
cutaceum L.	0,50-1	islandicus Chm.	10—20
nodiferum Lm.	1—3	Jeffreysianus Fischer	3—5
parthenopeum v. Salis	1—3	Kroyeri Möller defect!	6—10
Epidromis.		propinguis Alder	2—5
reticulatum Blainv.	0,20-30	pygmaeus Gould	1—2
Bufonaria.		striatus Rve.	2—3
scrobiculator L.	2—3	Fusus.	
Ranella.		craticulatus Broc.	0,20-60
gigantea Lm.	1,50-4	pulchellus Phil.	0,20-60
Fasciolaria.		rostratus Olivi	0,40-2
lignaria L.	0,20-50	Sitchensis Midd.	0,50-1,20
Trophon.		syracusanus L.	0,30-80
barvicensis Johnst.	0,50-1	Lachesis.	
craticulatus Fabr.	1—2	candidissima Phil.	1,—
var. grandis	5—6	minima Mtg.	0,10-20
clathratus L.	0,50-1	var. mamillata Risso	0,20-30
		Pleurotoma.	
		nivalis Lovén	1—3

	Mk.		Mk.
Bela.		Triforis.	
mitrula Lovén	0,30-50	preversa L.	0,10-20
Mörchi Malm	1—2	Cerithiopsis.	
pyramidalis Ström.	0,30-60	costulaia Möller	0,50-1
septangularis Mtg.	0,30-50	minima Brus.	0,20-30
simplex Midd.	0,50-2	tubercularis Mtg.	0,20-30
turricula Mtg.	0,20-30	Cancellaria.	
var. excarata Möller	0,20-30	cancellata L.	1—2
„ nobilis „	0,50-1	Trichotropis.	
„ rosea Sars	0,30-40	canaliculatus Leach.	1—3
Trevelyana Turt.	0,50-1	var. acuminata Jeffr.	0,50-1,50
violacea Migh. et Ads.	0,20-40	insignis Midd.	2—4
		St. Johnensis Verkr.	2—4
Raphitoma.		Natica.	
attenuata Mtg.	0,20-60	affinis Gm.	0,20-80
brachystoma Phil.	0,50-80	Guillemini Payr.	0,20-40
Bertrandi Payr.	0,20-40	Groenlandica Beck.	0,40-80
clathrata Serr.	0,30-50	hebraea Mart.	0,40-60
costata Don.	0,50-80	helicina Broc.	0,20-40
gracilis Mtg.	0,40-60	heros Say	0,50-3
Leufroyi Mich.	0,30-80	islandica Bean.	0,40-80
linearis Mtg.	0,20-50	immaculata Tott.	0,20-40
multilineata Desh.	0,20-40	Josephinia Risso	0,20-40
nebula Mtg.	0,20-40	intricata Don.	0,20-30
paciniana Calcara	0,20-30	macilenta Phil.	0,20-40
purpurea Mtg.	0,20-50	millepunctata Lm.	0,40-60
var. Philberti Mich.	0,20-40	pallida Brod. et Sow.	3—4
rugulosa Phil.	0,30-50	pulchella Risso	0,20-40
reticulata Ren.	0,30-60	trifasciata Say	0,30-50
taeniata Desh.	0,30-50	Sigaretus.	
Vauquelini Payr.	0,50-60	striatus M. de Perr.	0,50-1,20
Conus.		Velutina.	
mediterraneus Brug.	0,20-1	laevigata Penn.	0,20-50
Chenopus.		zonata Gould.	1,—
occidentalis Beck.	2—6	Lamellaria.	
pespelicani L.	0,20-50	perspicua L.	0,20-40
Serreseanus Mich.	2—3	Adeorbis.	
Cerithium.		subcarinatus Mtg.	0,20-30
conicum Blainv.	0,20-40	Skenea.	
elegans Blainv. u.	0,20-40	planorbis Fabr.	0,10
Desh.	0,20-40	Homalogyra.	
metaxa Sow.	0,30-50	atomus Phil.	0,20-30
metula Lov.	0,50-1,20		
mediterraneum Desh.	0,20-30		
pusillum Jeffr.	0,20-40		
scabrum Olivi	0,10-20		
var. lima Brug.	0,10-20		
vulgatum „	0,20-50		

	Mk.		Mk.
Littorina.		<i>inconspicua</i> Alder	0,10-80
<i>curila</i> Midd.	0,20-30	<i>Jeffreysii</i> Waller	0,30-40
<i>grandis</i> Midd.	0,50-1,20	<i>labiosa</i> Mtg.	0,20
<i>littorea</i> L.	0,10-20	<i>lactea</i> Michaud	0,50
<i>neritoides</i> L.	0,10-20	<i>Lanciae</i> Calc.	0,30-40
<i>obtusata</i> L.	0,10-20	<i>lilacina</i> Reclz.	0,20
var. <i>groenlandica</i>		<i>lineolata</i> Mich.	0,20
Mörch	0,10-20	<i>Mariae</i> Hörnes	0,30
" <i>limata</i> Lovén	0,10-20	<i>membranacea</i> Ads.	0,20
<i>punctata</i> Gmel.	0,20-30	<i>monodonta</i> Phil.	0,20
<i>rudis</i> L.	0,10-20	<i>Montacuti</i> Payr.	0,10-20
var. <i>sexatilis</i> Johnst.	0,10-20	<i>oblonga</i> Desm.	0,20
" <i>tenebrosa</i> Mtg.	0,10 20	<i>parva</i> (Da C.) F. et H.	0,10
<i>sitchana</i> Phil.	0,30-40	var. <i>interrupta</i> Ads.	0,10
<i>vestita</i> Say	0,10-20	<i>punctura</i> Mtg.	0,10
		<i>pusilla</i> Phil.	0,20-30
Lacuna.		<i>radiata</i> "	0,20
<i>crassior</i> Mtg.	0,30-40	<i>reticulata</i> Mtg.	0,10
<i>divaricata</i> Fabr.	0,20-30	<i>robusta</i> Dall.	0,30-40
var. <i>quadrifasciata</i>		<i>rudis</i> Phil.	0,30-40
Mtg.	0,20-30	<i>seminulum</i> Montr.	0,20-30
" <i>solidula</i> Lovén	0,20-40	<i>semistriata</i> Mtg.	0,10-20
<i>puteolus</i> Turt.	0,20-40	<i>similis</i> Scacchi	0,50
<i>pallidula</i> (Da Costa)		var. <i>laevis</i> Montr.	0,30-40
F. et H.	0,20-30	<i>solida</i> Phil.	0,10-20
Fossarus.		<i>subcostulata</i> Schw.	0,10-20
<i>ambiguus</i> L.	0,30-50	<i>striata</i> Mtg.	0,10
Rissoina.		var. <i>saxatilis</i> Möller	0,20
Bruguieri Payr.	0,10-20	<i>striatula</i> Mtg.	0,30-40
Rissoa.		<i>tesselata</i> Schw.	0,20
<i>auriscalpium</i> L.	0,10	<i>variabilis</i> v. Mühlf.	0,10
<i>algeriana</i> Montr.	0,10-20	v. <i>splendida</i> Eichw.	0,20
<i>arenaria</i> Ads.	0,10-20	<i>venusta</i> Phil.	0,10
<i>caribaea</i> D'Orb.	0,20	<i>ventricosa</i> Desm.	0,10
<i>castanea</i> Möller	0,70	<i>violacea</i> Desm.	0,10-20
<i>calathus</i> F. et H.	0,20-30	v. <i>ruflabrum</i> Leach.	0,10
<i>costulata</i> Alder	0,20	<i>vitrea</i> Mtg.	0,20
<i>cimex</i> L.	0,10	Weinkauffi Schw.	0,20
<i>cingillus</i> Mtg.	0,10	<i>zetlandica</i> Mtg.	0,30-40
<i>crenulata</i> Mich.	0,10	Barleia.	
<i>costata</i> Ads.	0,10	<i>rubra</i> Ads.	0,10
<i>dictyophora</i> Phil.	0,20-30	var. <i>pallida</i> Jeffer.	0,10
<i>decorata</i> Phil.	0,20	var. <i>unifasciata</i> Mtg.	0,10
<i>fulgida</i> Ads.	0,10	Jeffreysia.	
<i>fulva</i> Mtg.	0,10	<i>diaphana</i> Alder	0,20-30
Jan Meyeni Friele	0,20-40	<i>globularis</i> Jeffer.	0,20-30
		<i>opalina</i> "	0,20-30

	Mk.		Mk.
Hydrobya.		Scillae Scacchi	0,30-50
ulvae Penn.	0,10	Odontostoma.	
var. octona L.	0,10	albella Lovén	0,20-40
Truncatella.		acuta Jeffr.	0,20-40
truncatula Drap.	0,10	conoidea Broc.	0,20-40
Caccum.		var. Australis Jeffr.	0,50
auriculatum Folin	0,20-30	insculpta Mtg.	0,20-40
glabrum Mtg.	0,10-20	nivosa Mtg.	0,30-50
subangulatum	0,20-30	pallida Mtg.	0,20
trachea Mtg.	0,10-20	var. angusta Jeffr.	0,20-30
Siliquaria.		„ novogradensis	Bruss. 0,20-30
anguina L.	6—10	plicata Mtg.	0,30-50
Vermetus.		rissoides Hanl.	0,30-50
intortus Lm.	0,40-50	turrita Hanl.	0,40-40
lumbricalis Gm.	0,50-1,20	truncatula Jeffr.	0,30-40
triqueter Biv.	0,20-60	unidentata Mtg.	0,20-40
Turritella.		Auriculina.	
acicula Stimp.	0,30-50	Erjaveciana Bruss.	0,20-30
communis Risso	0,10-30	Turbonilla.	
polaris Beck.	0,50-1	decussata Mtg.	0,30-50
triplicata Broc.	0,40-1	delicata Montr.	0,20-30
Mesalia.		excavata Phil.	0,30-50
brevialis Lm.	1-2,50	eximia Jeffr.	0,10-20
lactea Möller	0,50-1	fenestrata Forb.	0,20-30
Scalaria.		indistincta Mtg.	0,10-20
communis Lm.	0,20-50	interstincta Mtg.	0,10-20
clathratula Mtg.	0,50-80	var. monozoa Bruss.	0,20-30
pseudoscalaris Broc.	0,20-60	interrupta Totten	0,40-50
tenuicostata Mich.	1,50-1,20	lactea L.	0,10-30
Trevelyana Leach.	1—2	pusilla Phil.	0,30-50
Eulima.		scalaris Phil.	0,30-40
polita Risso	0,50-1,50	var. rufescens Forb.	0,30-50
„ v. brevis Reg.	0,20-30	spirialis Mtg.	0,20-40
Philippii Wkff.	0,20	striolata L.	0,20-30
stenostoma Jeffr.	0,30-45	Actaeon.	
sinuata Sc. var. inter-		tornatilis L.	0,20-40
media Cantr.	0,20-50	Cylichna.	
subulata Don.	0,40-80	alba Lovén	0,10-30
Eulimella.		cuneata Tib.	0,20-30
acicula Phil.	0,20-30	cylindracea Mtg.	0,20-40
var. obeliscus Jeffr.	0,30-40	Jeffreysi Wkff.	0,20-40
„ ventricosa Forb.	0,30-40	nitidula L.	0,20-40
bilineata Ald.	0,30-60	Reinhardti Hölb.	0,40-60
		striatula Forb.	0,20-30
		umbilicata Mtg.	0,10-20

	Mk.		Mk.
Utriculus.		Gadinia.	
canaliculatus Say	0,30-40	Garnoti Payr.	0,20-50
Gouldi Couth	0,20-30	Calyptraea.	
hyalinus Turt.	0,50-1	chinensis L.	0,20-40
minutissima Mart.	0,10-20	Capulus.	
mamillatus Phil.	0,10-20	hungaricus L.	0,50-1
obtusus Mtg.	0,10-20	Crepidula.	
truncatus Mtg.	0,19-20	fornicata Gray.	0,30-50
Amphisphyræ.		glauca Say.	0,30-40
debilis Gould.	0,30-60	lingulata Gould	0,20-30
Bulla.		Moulini Mich.	0,20-50
hydatis L.	0,10-50	plana Lm.	0,30-40
var. cornea Lm.	0,10-30	unguiformis L.	0,20-30
" elegans Leach.	0,10-30	Crucibulum.	
striata Brug.	0,20-50	striatum Say.	0,30-40
Scaphander.		Neritina.	
lignarius L.	0,20-1	viridis L.	0,10-20
punctostriatus Migh.	1—5	Xenophora.	
Akera.		mediterranea Per.	4—6
bullata Müller	0,20-50	Phasianella.	
Philine.		pullus L.	0,10-80
aperta L.	0,20-50	speciosa v. Mühlf.	0,10-20
catena Mtg.	0,20-40	tenuis Mich.	0,10-20
Finnmarchiana Sars	0,50-80	Turbo.	
punctata Clark.	0,30-50	rugosus L.	0,50-1
quadrata S.W.	0,50-80	sangarensis Schrenk	0,50-60
scabra Müller	0,30-50	Cyclostrema.	
Lobiger.		Cutlereanum Cl.	0,20-40
Philippi Krotm.	0,20-60	serpuloides Mtg.	0,20-30
Aplysia.		Mölleria.	
depilans L.	0,30-50	costulata Möller	0,25-50
Pattisoni Sow.	0,60	Clanculus.	
punctata Cuv.	0,20-40	corallinus Gm.	0,20-40
Umbrella.		cruciatus L.	0,10-20
mediterranea Lm.	1—2	Jussieni Payr.	0,10-20
Assiminea.		Trochus.	
Grayana Leach.	0,10-20	articulatus Lm.	0,20-30
Melampus.		Adansonii Payr.	0,10-20
bidentatus Mtg.	0,20-30	albidus Gm.	0,20-50
myosotis Drap.	0,20-30	conulus L.	0,20-50
Otina.		crassus Pelt.	0,10-20
otis Turt.	0,20-40	cinerarius L.	0,10-20
Siphonaria.		divaricatus L.	0,10-20
algesiræ Quoy	0,30-60		
thersites Carp.	0,60-80		

	Mk.		Mk.
depictus Desh.	0,20-30	Puneturella.	
dubius Phil.	0,20-30	Noachina L.	0,20-50
exiguus Pult.	0,10-20	Emarginula.	
Fermonii Payr.	0,10-30	cancellata Phil.	0,20-50
fanulum Gm.	0,20-50	conica Schum.	0,30-60
granulatus Born.	0,20-60	crassa Sow.	1,50-6
iridescens Midd.	0,30-40	elongata Costa	0,20-30
Languieri Payr.	0,10-30	fissura L.	0,29-50
lineatus Lm.	0,20-30	Huzardi Payr.	0,20-40
millegranus Phil.	0,20-50	tenera Montr.	0,30-40
magus L.	0,20-1	Lepeta.	
occidentalis Migh.	2—4	caeca Müller	0,30-60
obliquatus Gmel.	0,10-20	Pilidium.	
Raketi Payr.	0,20-30	fulvum Müller	0,30-50
rarelineatus Mich.	0,20-30	rubellum Fabr.	0,20-30
Richardi Payr.	0,20-40	Tectura.	
striatus L.	0,10-20	cassis Esch.	0,29-40
turbinatus Born.	0,20-30	digitalis Esch.	0,10-40
tumidus Mtg.	0,30-50	patina Esch.	0,20-50
turbinoides Desh.	0,20-40	pellucida L.	0,20-50
umbilicaris L.	0,10-20	spectrum Nutt.	0,20-40
villicus Phil.	0,10-30	testudinalis Müll.	0,20-30
varius L.	0,10-30	virginea Müll.	0,20-40
zizyphinus L.	0,20-60	Patella.	
var. Lyonsii	1-1,50	ferruginea Gm.	0,80-1,20
Margarita.		lusitanica "	0,30-50
bella Verkr.	1—2	magellanica "	0,40-1,20
cinerea (Gld.) Couth.	0,20-50	vulgata L.	0,10-20
groenlandica Chm.	0,20-30	var. caerulea L.	0,10-30
helicina Fabr.	0,20-30	Chiton.	
obscura Couth.	0,20-50	albus L.	0,20-40
olivacea Braun	0,30-56	atratus Sow.	1,—
striata Brod. et Sow.	0,50-1,50	cancellatus Wood	0,20-50
umbilicalis Brod. et Sow.	0,60-2	discrepans Brown.	0,30-40
Vahli Möll.	0,30-40	fulvus Wood.	0,20-1
varicosa Migh.	0,50-80	fascicularis L.	0,30-50
Scissurella.		laevis Penn.	0,20-40
crispata Flem.	0,20-50	lineata Wood.	1,20
costata D'Orb.	0,30-50	marmoreus Fabr.	0,20-30
Haliotis.		magellanicus Chem.	1,50
tuberculata L.	0,20-50	marginatus Penn.	0,20-40
Fissurella.		Polii Phil.	0,30-40
costaria Defr.	0,30-60	ruber L.	0,20-40
graeca L.	0,20-40	Rissoi Payr.	0,40-50
gibba Phil.	0,20-30	Siculus Gray.	0,30-50
		submarmoreus.	0,30-60
		tunicatus Wood	0,60-80

	Mk.		Mk.
Dentalium.		Hyalaea.	
agile Sars	0,30-50	inflexa Les.	0,20
abyssorum Sars	0,20-30	longirostris Les.	0,30
dentalis Lm.	0,20-30	tridentata Forsk.	0,20-30
entalis L.	0,20	Clio.	
novemcostatum Lm.	0,20-30	pyramidata Lm.	0,20-40
rufescens Phil.	0,30-50	subulata Quoy et G.	0,30-40
tarentinum Lm.	0,20-30	Creseis.	
Siphonodentalium.		vitrea Dkr.	0,20-30
affine Sars	0,30-50	Carinaria.	
Lefotense Sars	0,40-50	mediterranea Per. et L.	2,50-4
quinquangulare Forb.	0,20	Argonauta.	
vitreum Sars	0,50-1	argo L.	3—10
Dischides.		Spirula.	
bifissus Wood	0,20-30	Peroni Lm.	0,30-1

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren
 Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut
 Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

TAUSCH-CATALOG No. 6

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Meeresconchylien

aus dem palaearctischen Faunengebiete.

Zweite Abtheilung.

Die genaueren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.

	Mk.		Mk.
Clavagella		Corbula	
melitensis Brod.	10,—	gibba Olivi	0,10-30
Gastrochaena		var. rosea Brown.	0,20-30
dubia Penn.	0,40-80	Neacra	
Teredo		costellata Desh.	1,50-1
malleolus Turt.	0,50-1	cuspidata Olivi	0,50-2
megotara F. et H.	0,50-1,20	lamellosa Sars	0,80-1,20
navalis L.	0,50-1	obesa Lovén	0,50-1
norwegica Spengl.	0,50-1	rostrata Spengl.	0,50-1,50
Xylophaga		Poromya	
dorsalis Turt.	0,50-3	granulata Nyst.	1—2
Pholas		Pandora	
candida L.	0,50-80	inaequivalvis L.	0,20-40
crispata L.	0,50-1,50	var. obtusa	0,30-50
dactylus L.	0,50-1	trilineata Say	0,40-60
parva Penn.	0,50-80	Lyonsia	
Solen		arenosa Möll.	0,50-1,50
americanus Gld.	0,50-1,50	corruscans Sc.	1-1,20
ensis L.	0,20-40	nitida Gould	0,60-80
siliqua L.	0,20-50	Thracia	
vagina L.	0,20-50	corbuloides Desh.	0,50-1,50
Cultellus		distorta Mtg.	0,50-1,20
pellucidus Penn.	0,30-50	papyracea Poli	0,50-1
Machaera		var. villosiuscula	0,50-80
costata Gould	0,40-1	praetenuis Pult.	0,30-60
media Gray	0,50-1	truncata Bean.	0,50-2
patula Dixon	1,50	Lutraria	
Ceratisolen		elliptica Lm.	0,50-1,50
legumen L.	0,20-50	oblonga Chm.	0,50-1,50
Solecurtus		Mactra	
candidus Reen.	0,30-60	helvacea Chm.	1—2
coarctatus Gm.	0,40-60	lateralis Say	0,30-50
strigillatus L.	0,30-80	ovalis Gould	1,20
Saxicava		stultorum L.	0,20-40
arctica L.	0,20-40	var. lactea Gm.	0,20-1
Panopaea		subtruncata Mtg.	0,20-30
arctica Lm. (norveg.)	8—20	var. triangula Ren.	0,20-30
Glycimeris		solida L.	0,20-60
siliqua Spengl.	1-2,50	var. elliptica Brown.	0,20-40
Mya		Mesodesma	
arenaria L.	0,20-1	cornea Poli	0,20-30
truncata L.	0,30-1	Ceronia	
Platydodon		arctata Conr.	0,30-60
cancellata Conr.	1,80-1,20	deaurata Turton	0,40-60
Corbulomya		Syndosmya	
mediterranea Phil.	0,20-30	alba Wood.	0,20-30
ovata Forb.	0,80-1,20	intermedia Thomps.	0,20-30
		ovata Phil.	0,40-50

	Mk.		Mk.
prismatica Mtg.	0,20-40	decussata L.	0,10-30
tenuis Mtg.	0,20-30	edulis Chm.	0,10-30
Scrobicularia		geographica Gm.	0,10-30
Cottardi Payr.	0,40-60	laeta Poli	0,10-30
plana D. C.	0,20-50	var. bicolor	0,10-30
Capsa		pullastra Mtg.	0,20-50
fragilis L.	0,20-30	straminea Conr.	0,80-2
Donax		Venus	
politus Poli	0,30-40	casina L.	0,30-1
semistriatus Poli	0,30-40	cygnea Ben.	2,—
trunculus L.	0,10-20	fasciata Don.	0,10-40
var. anatinus Lam.	0,20	fluctuosa Gld.	0,50-1
vittatus Jeffr.	0,20-40	gallina L.	0,10-20
Psammobia		var. striatula D. C.	0,10-30
costulata Turt.	0,40-60	ovata Penn.	0,10-30
faroënsis Chm.	0,40-60	verrucosa L.	0,30-60
tellinella Lm.	0,30-40	Cytherea	
var. purpurea	0,50-60	chione L.	0,60-1,20
var. pura	0,50-60	convexa Say	0,50-1
vespertina Chm.	0,30-1	mercenaria L.	0,50-1
var. florida Lam.	0,50,60	rudis Poli	0,40-1
Tellina		Artemis	
alternidentata B. & S.	2,—	exoleta L.	0,20-40
balaustina L.	0,20-40	lincta Pult.	0,50-1
baltica L.	0,10-20	lupinus Poli	0,20-30
var. attenuata Jeffr.	0,10-20	Circe	
calcareea Chm.	0,20-60	minima Mtg.	0,20-30
crassa Penn.	0,20-40	Astarte	
cumana Costa	0,20-30	borealis Chm.	0,50-1,50
donacina L.	0,20-30	var. placenta Mörch.	1,50
distorta Poli	0,40-60	compressa Mtg.	0,20-40
exigua Poli	0,10-20	castanea Say	0,50-1,50
fabula Gm.	0,10-20	crebricostata Forb.	0,50-1,50
fusca Gould.	0,20-40	fusca Poli	0,30-40
incarnata L.	0,10-30	globosa Möll.	0,50-80
iridescens Sow.	0,80	pulchella Jonas	1—2
nitida Poli	0,10-20	sulcata D. C.	0,40-60
planata L.	0,20-30	var. elliptica (species)	1,—
pusilla Phil.	0,30-40	triangularis Mtg.	0,30-40
pulchella Lm.	0,20-40	undata Gld.	1—2
serrata Ren.	0,50-1,20	Woodia	
tenera Say	0,30-40	digitaria L.	0,50-1,50
Petricola		Cyprina	
lithophaga Reclz.	0,20-50	islandica L.	0,40-1
pholadiformis Lm.	1—2	Isocardia	
Venerupis		cor L.	1—2
irus L.	0,10	Kelliella	
Lajonkairi Payr.	0,30-40	abyssicola Forb.	0,10-20
Lucinopsis		Cardium	
undata Penn.	0,20-60	aculeatum L.	0,50-1
Cypricardia		Deshayesi Payr.	0,50-1,50
lithophagella Lm.	0,40-80	erinaceum Lm.	1—2
Cyanium		echinatum Lm.	0,30-80
antarecticum Phil.	0,60	exiguum Gm.	0,20-30
minutum Fabr.	0,10-20	edule L.	0,10-20
occidentalis Dall.	0,30-50	var. maxima	0,50
Tapes		elegantulum Möller	1,—
aureas Gm.	0,20-30		

	Mk.		Mk.
fasciatum Mtg.	0,20-30	Limopsis	
groenlandicum Chm.	1—3	minuta Phil.	1,50-3
hians Brochi	4—8	Pectunculus	
islandicum Chm.	1—3	bimaculatus Poli	0,50-1,50
minimum Phil.	0,10-20	glycimeris L.	0,20-80
nodosum Turt.	0,20-30	insubricus Broc.	0,20-50
norwegicum Spengl.	0,20-80	Area	
oblongum Chm.	0,40-80	barbata L.	0,20-80
paucicostatum Sow.	0,30-1	clathrata Lm.	0,40-60
papillosum Poli	0,20-30	imbricata Poli	0,40-50
parvum Phil.	0,20-30	lactea L.	0,10-20
pinnulatum Conr.	0,40-60	Noae L.	0,20-1
tuberculatum L.	0,20-60	nodulosa Müller	0,40-1
Liocardium		scabra Poli	0,50-80
Mortoni Conr.	0,40-60	tetragona Poli	0,40-80
Chama		transversa Say	0,30-80
gryphoides L.	0,20-50	Cucullaea	
sinistrorsa Brug.	0,40-80	pectunculoides Sc.	0,30-1
Cardita		Nucula	
antiquata Poli	0,20-60	delphinodonta Migh.	0,20-40
aculeata „	0,20-40	lenticula Möller	0,80-1
borealis Conr.	0,50-1,50	nucleus L.	0,20-30
calyculata L.	0,20-30	var. radiata Hanl.	0,30-40
corbis Phil.	0,50	nitida Sow.	0,20-40
trapezia L.	0,30-60	proxima Say	0,20-30
Diplodonta		sulcata Bronn.	0,20-40
rotundata Mtg.	0,20-80	tenuis Mtg.	0,20-40
Lucina		var. expansa Tor.	0,40-80
borealis L.	0,30-1,50	tumidula Malm.	0,20-40
divaricatus L.	0,20-50	Yoldia	
lacteus L.	0,20-30	hyerborea Lov.	1—2
reticulata Poli	0,10-30	intermedia Sars	3,—
spinifera Mtg.	0,20-60	lucida Lov.	0,30-60
tenuisculpta Carp.	0,40-80	nana Sars = L. frigida Torr.	0,50-80
Axinus		Leda	
croulinensis Jeffr.	0,20-30	caudata Don.	0,20-50
eumyrius Sars	0,60-80	var. brevirostris Jeffr.	0,40-60
ferruginosus Forb.	10—30	obtusa Sars	2—5
flexuosus Mtg.	0,10-50	PELLA L.	0,20-40
Gouldi Phil.	0,40-60	rostrata Chm.	0,20-50
Sarsi Phil.	0,20-50	var. buccata Möller	0,30-60
Bornia		tenuis Ph. = pygm. aut.	0,20-50
corbuloides Phil.	0,20-30	Crenella	
Kellia		decussata Mtg.	0,10-20
suborbicularis Mtg.	0,30-50	fabia Fabr.	0,20-50
Poronia		Modiolaria	
rubra Mtg.	0,20-30	corrugata Steenst.	0,30-80
Montacuta		costulata Risso	0,20-50
bidentata Mtg.	0,20-50	discors L.	0,30-80
Dawsoni Jeffr.	0,20-30	laevigata Gray	0,20-30
ferruginosa Mtg.	0,20-50	marmorata Forb.	0,20-40
Maltzani Verkr.	0,60-80	nigra Gray	0,30-1,20
Möller Holb.	0,30-1	Petagnae Scacchi	0,20-30
substriata Mtg.	0,40-60	Dacrydium	
Galeoma		vitreum Möller	1,50
Turtoni Sow.	0,80-1,20	Modiola	
Solenomya		adriatica Lm.	0,20-30
togata Poli	0,80-1,50	var. ovalis Sow.	0,10-30

	Mk.		Mk.
barbata L.	0,20-40	opercularis L.	0,20-1
var. angustata Phil.	0,30-40	pusio L. (Hinnites)	0,30-2
modiolus L.	0,30-1	Philippi Recl.	2,—
phaseolina Phil.	0,10-30	striatus Müller	0,40-80
plicatula Lm.	0,50-2	Testae Biv.	0,30-40
Mytilus		tenuicostatus Mgh. u. Ads.	1—5
edulis L.	0,10-30	tigrinus Müller	0,30-60
v. galloprovincialis L.	0,20-50	varius L.	0,20-1
var. incurvatus Penn.	0,30	vitreus Chm.	0,30-60
var. pellucidus Pen.	0,20-40	Spondylus	
minimus Poli	0,10-20	gaederopus L.	1—4
Lithodomus		Gussonae Costa	2—4
aristatus Dillw.	0,40-1	Ostrea	
lithophagus L.	0,40-60	borealis Lm.	0,40-60
Avicula		cristata Born.	0,50-1
tarentina Lm.	0,80-1	edulis L.	0,20-1
Pinna		plicata Chm.	0,30-80
nobilis L.	0,50-2,50	Anomia	
pectinata L.	1—2	ephippium L.	0,20-50
Lima		var. aculeata Müller	0,40-80
excavata Chem.	3—5	var. electrina Lam.	0,40-60
hians Gm.	0,30-60	var. squamula L.	0,20-40
inflata Chm.	0,30-50	patelliformis L.	1—2
Sarsi Lovén	1,2,50	Terebratula	
Loscambi Sow.	0,50-1	minor Phil.	0,50-60
squamosa Lm.	0,30-50	septemtrional. Couth.	0,50-1
subauriculata Mtg.	0,40-1	vitrea Gm.	1—2
Pecten		Terebratulina	
flexuosus Poli	0,30-80	caput serpentis L.	0,50-1
glaber L.	0,20-1	Megerlea	
hyalinus Poli	0,30-60	truncata L.	0,20-50
irradians Lm.	0,80-1,80	Rhynchonella	
Jacobaeus L.	0,50-2	psittacea Gm.	1—3
islandicus Müller	0,50-5	Crania	
inflexus Poli		anomala Müller	0,20-1
maximus L.	0,50-1		

Sammlungen von Seeconchylien

aus dem palaearctischen Faunengebiet werden zu nachstehenden Preisen geliefert:

100 Species	Mark 25.—
200 „	„ 60.—
etc. etc.	

Speziell für

Palaeontologische Vergleichsstudien

zusammengestellte Sammlungen geben wir ab in

100 Species	Mark 60.—
200 „	„ 120.—

Ferner führen wir grosses Lager

fossiler Conchylien des Mainzer Beckens.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Tausch-Catalog 197-218](#)