

Naturhistorisches Institut, Berlin N. 4.

Invalidenstrasse 38.

Catalog für die deutsche malakozoologische Gesellschaft 1885,
No. 6.

	Mk.		Mk.
Murex.			
acicularis Lam. W. Indien	0,80-1	radix Gmel. Panama	1—10
adunco-spinosus Beck. Phil.	1-2,50	ramosus L. Ind. or.	0,50-1,50
adustus Lam. Ceylon	0,50-1,50	rectirostris Sow. Mexico	1-2,50
affinis Reeve Philippinen	2,—	regius Wood Panama	1—3
alveatus Kien. Panama	0,80-1	rota Sow. M. rubr.	3—6
anguliferus Lam. Oc. ind.	1—3	rubiginosus Reeve Philipp.	3—4
axicornis Lam. Ceylon	0,50-1,50	salebrosus King Panama	1—3
Banksi Sow. Moluccen	3—4	Salleanus Ads. Ind. occ.	1,50-2
bicolor Val. Californien	0,50-1,50	saxatilis L. Oc. ind.	1—3
Bourgeoisi Tourn. Senegamb.	1,50-2	scolopax, Dillw. "	2—5
brandaris L. M. med.	0,50-2	scorpio L. Philippinen	5—6
brassica Lam. Californien	2—6	senegalensis Gmel. Brasilien	1—3
brevispina Lam. Ceylon	0,50-1,20	Steeriae Reeve Australien	20—30
calcitrapa Lam. Ind. occ.	1-2,50	Talienwahensis Cross N. Cal.	1—2
v. elongatus Lam. "	1—2	tenuispina Lam. Philipp.	2—10
capucinus Chm. Philippinen	0,40-1,20	ternispina Lam. "	1—3
corallinus Scach. M. med.	0,30-40	tetragonus Brod. Mauritius	0,30-80
cornutus L. Senegambien	2—5	torrefactus Sow. Philippinen	2—3
corrugatus Sow. Australien	1-1,20	tribulus L. Oc. ind.	1-2,50
crassilabrum Gray, Chile	0,50-1	triformis Reeve Australien	2—3
cristatus Broch. M. med.	0,30-40	triqueter Born Philippinen	0,80-2
Cumingi Ads. Philippinen	1—3	trunculus L. M. med.	0,30-1
Dunkeri Krss. Cap.	0,20-50	uncinarius Lam. Cap.	0,50-1
Edwardsi Payr. M. med.	0,20-30	unicornis Reeve Peru	0,50-1,20
endivia Lam. Ind. occ.	1—4	vibex Brod. Panama	1-1,50
erinaceus L. M. med.	0,40-1,50	Triton.	
v. tarentinus Lam. "	0,40-80	aquatilis Reeve Mauritius	0,50-1,50
fasciatus Sow. Senegamb.	0,80-1,20	agrotus Reeve China	1-1,50
fiscellum Chm. Philippinen	0,40-1	Australis Lam. Australien	1,50-4
foliatus Gmel. China	1—3	canaliferus Lam. Oc. ind.	0,80-1,20
gibbosus Lam. Senegamb.	1—3	chlorostomus Lam. Philipp.	0,30-1
haustellum L. Philippinen	0,80-1,50	clavator Chm. "	2
hexagonus Lam. St. Thomas	0,40-1	commutatus Dkr. W. Ind.	2-2,50
imperialis Swains Californ.	3—5	corrugatus Lam. M. med.	1—2
lyratus Ads. Senegambien	1—3	cutaceus L. "	0,50-1,20
Martinianus Reeve Austral.	1—2	cynocephalus Lam. Philipp.	0,50-1,50
maurus Brod. Australien	1-2,50	femorale L. Oc. ind.	1—3
microphyllus Lam. Oc. ind.	2—3	ficoides Reeve Senegamb.	1-2,50
motacilla Chm. "	2—3	fusiformis Kien. Mauritius	0,50-1,50
nigrispinosus Reeve "	3—4	gallinago Reeve Philipp.	1-1,50
nigritus Phil. Californien	2—4	labiosus Wood Australien	0,50-1
oxyacantha Brod. Panama	3—6	lampas Lam. Mauritius	1—4
palmarosae Lam. Philipp.	4—6	lutorium L. "	0,50-1,50
palmiferus Swains. Austral.	1-1,50	moritinctus Reeve "	0,50-1,50
pinnatus Wood China	1—3	mundus Gould "	0,30-60
plicatus Sow. Californien	1—2	nodiferus Kien. M. med.	1—3
pomum Gmel. Ind. occ.	0,50-1,50	olearium L. Brasilien	1—2
princeps Brod. Californien	2—4	Pfeifferianus Reeve China	1,50-2,50
		pilearis L. Mauritius	0,20-1

		Mk.			Mk.
pyrum Lam.	Mauritius	0,80-1,50	Oliva.		
Quoyi Reeve	Australien	0,40-50	angulata Lam. W. America		2—5
retusus L.	Philippinen	0,60-1,20	araneosa Lam. Californien		0,30-60
rubecula L.	"	0,30-60	carneola Gmel. Philippinen		0,20-30
sinensis Reeve	China	1—2	erythrostoma Lam. Oc. ind.		0,30-1
Spengleri Chm.	Australien	1-3,50	episcopalis Lam. Mauritius.		0,30-50
subdistortus Lam.	"	3—4	elegans Lam. Philippinen		0,30-50
tripus Lam.	China	1-1,20	flammulata Lam. Senegal		0,20-60
tritonis L.	Mauritius	1-2,50	fusiformis Lam. Oc. ind.		0,50-1
tuberosus Lam.	Oc. ind.	0,20-50	guttata Lam. Philippinen		0,30-60
Persona.			inflata Lam.	Sansibar	0,20-30
anus L.	Philippinen	1—2	irisans Lam. Philippinen		0,60-1,20
cancellina Desh.	"	0,50-2	ispidula L.	"	0,10-30
ridens Reeve	Ind. occ.	2—3	Julieta Ducl.	Amer. c.	1-1,50
Lagena.			litterata Kien.	Ind. occ.	0,20-50
Chemnitzii Gray	Australien	1—2	maura Lam. Philippinen		0,50-1
cingulata Lam.	"	1—2	mustellina Lam. Ceylon		0,40-80
clandestina Chm.	Philippin.	1-1,50	olympiadina Ducl. Mauritius		1—2
doliaria L.	C. b. sp.	0,50-1,20	ponderosa Ducl.	"	0,40-50
Argobuccinum.			Peruviana Lam.	Peru	0,50-1
cancellatum Lam.	Magell.		v. coniformis Phil.	"	0,40-80
	Str.	3—5	porphyrea Lam. Panama		1—4
Oregonense Lam.	Sitka	1—5	reticularis Lam. Ind. occ.		0,30-60
rudde Brod.	Chile	0,50-1,20	sanguinolenta Lam. Molucc.		0,20-40
scaber King	"	0,50-1	tesselata Lam. Philippinen		0,20-40
Ranella.			tigrina Lam. Madagascar		0,40-60
affinis Brod.	Philippinen	0,50-1,20	tremulina Lam. Philippinen		0,40-1
albivariosa Reeve	"	0,30-1	v. nobilis Reeve	"	1—2
anceps Lam.	Panama	0,60-1	tricolor Lam. Mauritius		0,20-40
argus Gmel.	Australien	2—3	venulata Lam. Mazatlan		0,30-1
Bergeri Ads.	Mauritius	0,50-1,50	Olivancillaria.		
bitubercularis Lam.	Philipp.	0,50-1	acuminata Lam. Senegal		0,80-1,50
crassa Dillw.	"	0,50-80	Brasiliensis Chm. Brasilien		0,50-1,20
crumena Lam.	Oc. ind.	0,40-1,20	gibbosa Born.	Oc. ind.	0,30-80
elegans Beck.	Nicobaren	1,50	nebulosa Lam.	Siam	0,50-80
foliata Brod.	Mauritius	1—3	subulata Lam. Oc. ind.		0,40-1
granifera Lam.	"	0,30-50	Aragonia.		
gigantea Lam.	M. med.	1,50-4	aquatilis Reeve Brasilien		0,80-1
gyrina L.	Philippinen	0,20-40	auricularia Lam.	"	1-1,50
leucostoma Lam.	Australien	0,60-1,50	contortuplicata Reeve	"	0,80-1,20
margaritula Desh.	Ceylon	0,50-80	hiatula Gmel. Senegambien		0,40-80
perca Percy	China	8—12	Steeriae Reeve	"	0,40-60
pusilla Brod.	Australien	0,50-1	testacea Lam. Panama		0,40-80
siphonata Reeve	Philipp.	0,50-1	Olivella.		
spinosa Lam.	"	0,80-2	jaspidea Gmel.	Ind. occ.	0,20-30
subgranosa Beck	"	0,50-80	lanceolata Reeve Philipp.		0,30-40
triqueter Reeve	Californien	1—2	lineolata Gray Californien		0,20-40
tuberculata	Mauritius	0,30-80	mutica Say S. Carolina		0,10-20
tuberosissima Reeve	Philipp.	1,50-2	myriadina Ducl. Seychellen		0,20-30
ventricosa Brod.	Peru	1—3	nivea Gmel.	Ind. occ.	0,10-20
vexillum Sow.	Australien	2—3	oryza Lam.	"	0,10
Aspa.			tergina Ducl.	Panama	0,30-40
laevigata Lam. Senegamb.		2—3	undatella Lam. Acapulco		0,10-30
			Verrauxi Ducros Guadeloupe		0,20-30
			volutella Lam. Panama		0,10-20

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren
 Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut
 Berlin N. 4. Invalidenstrasse 38.

LINNÆA,

Naturhistorisches Institut,

Frankfurt am Main,

Elsheimerstrasse 7

macht sowohl **Museen**, als auch **Lehrinstitute** und **Private**, auf ihre Doublettenvorräthe naturhistorischer Gegenstände aufmerksam. Da das Institut mit auswärtigen Sammlern sowie wissenschaftlichen Reisenden eine stete Correspondenz unterhält, ist es auch im Stande, auf besondere Wünsche Rücksicht zu nehmen und eventuelle Desideraten direkt besorgen zu können.

Specialitäten: **Mollusken** (Conchylien), **Vogelbälge** und **Vogeleier**, worüber Special-Cataloge bereits ausgegeben sind. Ueber die respectiven Vorräthe an **Säugethierfellen**, **Amphibien**, **Fischen**, **Arachniden**, **Myriopoden**, **Crustaceen** und **niederen Seethieren** werden — sofern gedruckte Cataloge nicht vorhanden — auf Wunsch handschriftliche Listen angefertigt.

Auch **Insekten** aus allen Ordnungen, besonders **Macro-** und **Micro-Lepidopteren** sowie **Coleopteren** sind reichlich vertreten.

Grosses Lager in **Fossilien**, besonders des Mainzer Tertiär-Beckens.

Cataloge stehen franco und gratis zu Diensten.

Der **Lehrmittel-Catalog**, Repräsentanten aus dem Gesamtgebiete der Zoologie enthaltend, ist speciell für **Lehranstalten**, **Schulen** etc. bestimmt.

Tauschverbindungen erwünscht.

L'INSTITUT D'HISTOIRE NATURELLE

LINNÆA

à FRANCFORT s. MEIN,

Elsheimerstrasse 7

appelle l'attention des administrations de Musées, ainsi que des établissements d'enseignement et des amateurs, sur ses collections de duplicatas d'objets d'histoire naturelle. En correspondance suivie avec les collectionneurs étrangers et les voyageurs scientifiques, il est à même de répondre aux demandes spéciales et de pourvoir directement aux *desiderata* les plus variés.

Spécialités: **Mollusques** (coquilles); **peaux et œufs d'oiseaux**; des catalogues spéciaux en ont déjà été publiés.

Quant aux collections de **peaux de mammifères d'Amphibies, poissons, arachnides, myriopodes, crustacés et specimens d'invertébrés maritimes**, des listes manuscrites sont envoyées sur demande lorsque les catalogues imprimés font défaut.

Les insectes de tout ordre, spécialement **les macro- et micro-lépidoptères et coléoptères**, sont aussi abondamment représentés.

Grand magasin en **Fossiles**, spécialement du bassin tertiaire de Mayence.

Catalogues franco et gratis sur demande.

Catalogue d'objets d'enseignement, contenant des specimens de tout le domaine de la zoologie, destinés spécialement aux établissements d'instruction, écoles etc.

On demande à établir des relations d'échanges.

LINNÆA,

NATURAL HISTORY INSTITUTION,

FRANKFORT o. MAIN,

Elsheimerstrasse 7.

Calls the attention of museums, educational establishments and private gentlemen to its stock of duplicates of natural historical objects; and being in constant correspondence with foreign collectors, as well as scientific travellers, it is in a position to have regard to any special requirement, or if necessary, to obtain any particular object direct.

Specialities: **Mollusca** (shells), **birds skins and eggs**, of which special catalogues have already been published. As regards the stock of **mammals, amphibia, fishes, arachnidae, myriopoda, crustaceae and marine animals** of a lower order, in cases where printed catalogues are not on hand, written lists will be furnished on application.

Insects of all genera, especially **macro- and micro-lepidoptera and coleoptera**, are largely kept.

Larges stocks in **Fossils**, specially from the tertiary basin of Mayence.

Catalogues furnished gratis and postpaid on application.

Educational catalogues containing representative animals, belonging to every class in zoology; specially adapted for the use of **schools &c.**

Arrangements for exchanges gladly entered into.

LINNÆA,

Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

7 Elsheimerstrasse 7.

TAUSCH-CATALOG No. 2, 1885
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Land-Conchylien

aus dem palaearetischen Faunengebiet.

Die näheren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.

		Mk.			Mk.
Testacella.			Balmei Pot. et Mich.	Sardinia	0,30-50
bisulcata Risso	Gallia	0,40-60	Botterii Pfr.	Kreta	0,20-30
haliotidea Drap. (testa)	"	0,40-50	camelina Bourg.	Syria	0,30-40
animal in Alkohol	"	1-1,50	cellaria Müll.	Germ.	0,10-20
Maugei Fér.	Lusitan	0,40-50	v. Villae Mort.	Carn.	0,20-30
Daubebardia.			contracta Westl.	Germ.	0,20-30
brevipes Drap.	Germ.	2,—	crystallina Müll.	"	0,10
Langi Pfr. (animal)	Hungar.	2—3	v. subterranea Bourg.	"	0,10-20
rufa Drap.	Germ.	2,—	Cydoniensis Blanc.	Kreta	1-1,50
Saulcyi Bourg. (testa)	Kreta	1—2	Cypria Pfr.	Cypern	1,—
" " (animal)	"	2—3	deila Bourg.	Krim	0,40-50
Glandina.			Draparnaldi Beck.	Germ.	0,20-30
Algira L. Europ. merid.		0,20-40	Erjavecici Brus.	Carn.	0,40-60
Parmacella.			excavata Bean	Anglia	0,40 50
Deshayesi Moq. Tand	Algeria	0,60	frondosula Mouss.	Graecia	0,20-40
Limax.			fulva Drap.	Germ.	0,10
cinereus List. (testa interior)			glabra Stud.	Transsylv.	0,20-30
	Gallia	0,20-30	hyalina Fér.	"	0,20-30
Vitrina.			hydatina Rossm.	Kreta	0,20-30
alpestris Cless.	Tirol	0,30-40	Natolica Alb.	Brussa	0,50-1
brevis Fér.	Germ.	0,20-30	nitens Mich.	Germ.	0,10-20
Carniolica Bttg.	Carn.	0,30-40	v. Helmi Gilb.	"	0,20
diaphana Drap.	Germ.	0,20	v. Szepi Hazay	Hungar.	0,20
f. Heynemanni Koch	"	0,20	nitida Müll.	Germ.	0,10
elongata Drap.	"	0,20	nitidula Drap.	"	0,10
major Fér.	"	0,10-30	petronella Charp.	"	0,10-20
nivalis Charp.	Helvetia	0,30-40	protensa Fér.	Kreta	0,40-80
pellucida Müll.	Germ.	0,10-20	v. aequata Mouss.	Graecia	0,50-60
v. aff. annularis	Tirol	0,20	pura Alder	Germ.	0,10
truncata Bttg.	Carn.	0,30-40	radiatula Gray	Tirol	0,10
Hyalinia.			subrimata Reinhardt	"	0,10-20
aegopinoides v. Maltz.	Kreta	1—3	superflua Rossm.	Kreta	1—2
Alhambrae Kob.	Hispan.	0,30-40	Taurica Cless.	Krim	0,30-40
alliaria Mill.	Anglia	0,20-40	Zonites.		
			acies Partsch	Dalm.	0,20-40
			albanicus Ziegl.	"	0,30-50
			Algirus L.	Gallia	0,30-50

		Mk.			Mk.
chloroticus Pfr.	Magnia	0,80-1,50	aspersa Müll.	Gallia	0,10
compressus Ziegl.	Carn.	0,30-50	f. sinistrossa	"	2,—
Croaticus Partsch	Croatia	0,20-40	f. scalaris	"	2—4
pergrannulatus Godel.	Graec.	0,50-1	atrolabiata Kryn.	Kauk.	0,80-1,20
Smyrnensis Roth	Smyrna	0,40-80	attrita Lowe	Madeira	0,30
verticillus Fér.	Croatia	0,10-30	Balearica Zgl.	Balear.	0,30-50
Leucochroa.			barbata Fér.	Kreta	0,40-50
argia Bourg.	Algier	0,50-60	barbula Charp.	Lusitan.	0,30-40
Baetica Rossm.	Hispan.	0,50	bathyomphala Charp.	Italia	0,20
Boissieri Charp.	Palaestina	0,30-40	bathytera Westl.	Kreta	0,30-40
candidissima Drap.	Algeria	0,10-20	bidens Ch.	Germ.	0,10
cariosa Oliv.	Syria	0,20-30	v. dibothrion Friv.	Trans.	0,40-50
v. crassicarina Mouss.	"	0,30-40	Boettgeri Kob.	Marocco	1—2
cariosula Mich.	Algeria	0,20	Boissyi Terv.	Balearen	0,30-40
Debeauxiana Kob.	"	0,30-40	Bowdichiana Fér. subf.	Mad.	0,50-60
fimbriata Bourg.	Syria	1-1,20	Bulwerii Wood.	"	0,30-40
Kobeltiana Deb.	Algeria	0,30-40	caerulans Mühlf.	Dalm.	0,20
Mayrani Gass.	"	0,30-40	Caesareana Parr.		
Othiana Forb.	"	0,30-40	(spiri plana aut.)	Syria	0,60-1
Patula.			calva Lowe	Madeira	0,30
Hierosolymitana Bgt.	Syria	0,20	candicans Zgl.	Germ.	0,10
pygmaea Drap.	Germ.	0,10	candidula Stud.	"	0,10
runderata Stud.	Tirol	0,10	Cantiana Mft.	"	0,20
rupestris Drap.	Germ.	0,10	caperata Mtg.	Anglia	0,10-20
v. chorismenostoma Blanc			Caroni Dsh.	Sicil.	0,20-30
	Graecia	0,20-30	Castanea Oliv. (radiosa Zgl.)		
rotundata Müll.	Germ.	0,10		Brussa	0,50-1
semiplicata Pfr.	Madeira	0,30-50	Carthusiana Müll.	Gallia	0,10-20
solaria Mke.	Austria	0,10-20	cespitem Drap.	"	0,20-30
Janulus.			cheiranthicula Lowe	Mad.	0,30-40
stephanophora Desh.	Madeira	0,20-30	cincta Müll.	Italia	0,20-30
Helix.			v. Pollini Camp.	"	0,30-40
abjecta Lowe	Madeira	0,30	cinctella Drap.	"	0,10-20
aculeata Müller	Germ.	0,10	cingulata Stud.	"	0,10-30
acuta Müller	Europ. mer.	0,10	v. Anauniensis Betta	"	0,20-30
advena Webb. et B. Capv.		0,40	v. carrarensis	"	0,20-30
alabastrites Mich.	Algeria	0,20-30	v. colubrina Jan.	"	0,20-30
Alonensis Fér.	Hisp.	0,20-30	cingulella Zgl.	Hungaria	0,20-30
alpina Faure-Big	Chartreuse	0,20-40	cobresiana Alt.	Tirol	0,10
angigyra Zgl.	Italia	0,20	codia Bourg.	Lusitan.	1-1,50
Apennina Porro	"	0,20-30	coelata Stud.	Germ.	0,20
aperta Born	Kreta	0,20	Colomesiana Bourg.	Algeria	0,20-30
apicina Lm.	Gallia	0,10	compacta Lowe	Madeira	0,30
arbustorum L.	Germ.	0,10	Companyoni Aler	Balear.	0,30-40
arcta Lowe	Madeira	0,30	conoidea Drap.	Gallia	0,10-20
Argentellei Kob.	Graecia	1-1,50	consors Lowe	Madeira	0,30
Arigonis Rssm.	Hisp.	0,20-40	conspurcata Drap.	Lusitan.	0,10-20
armillata Lowe	Madeira	0,20	Constantinae Forb.	Algeria	0,30-40
Ascherae Kob.	Italia	0,30-40	Coquandi Morl.	Hisp.	0,30-50
			cornea Drap.	Gallia	0,20-30

		Mk.			Mk.
corrugata Gm.	Sicil.	0,20-40	Hellenica Bourg.	Graeca.	0,20
costata Müller	Germ.	0,10	hieroglyphicula Müll.	Algeria	0,20-30
v. pulchella Müller	"	0,10	hispida L.	Germ.	0,10
costulata Zgl.	"	0,10	v. concinna Jeffr.	Anglia	0,10-20
Cretica Fér.	Kreta	0,10-30	Hoffmanni Partsch.	Dalm.	0,50-1
v. alba	"	0,20	holosericea Stud.	Helvetia	0,10-20
v. cauta Wl.	Graecia	0,10-20	homoleuca Stab.	Dalm.	0,20
crinita Sandri	Dalm.	1—2	hortensis Müll.	Germ.	0,10
cyclolabris Desh.	Graecia	0,20-40	Heynemanni Kob.	Marocco	0,30-40
v. Heldreichi Sh.	"	0,20-30	ichthyomma Held	Bavaria	0,20-30
v. sphaeristoma Bourg.	"	0,30-50	v. achates Zgl.	Tirol	0,20
Dautezi Kob.	Algeria	0,20-40	improbata Mouss.	Syria	0,30-40
dealbata Lowe	Madeira	0,30	incarnata Müller	Germ.	0,10
degenerans Mss.	Marocco	1-1,20	intermedia Fér.	Carn.	0,20
Dehnei Rm.	"	0,30-40	Jolii Bourg.	Algeria	0,30-50
delphinula Lowe subf. Mad.	"	0,30-60	Jourdaniana Bourg.	"	0,40-60
depauperata Lowe	"	0,20-30	Juilleti Terv.	"	0,30-40
depressula Parr.	Algeria	0,20-40	lactea Müller	Hisp.	0,10-20
derogata Rm.	Hispan.	0,20-30	v. alybensis Kob.	"	0,30-40
desertella Jick.	Abyss.	0,50-80	Lacostean Mor.	Algeria	0,80-1,20
desertorum Forsk.	Aegypt.	0,20-30	lamellata Jeffr.	Germ.	0,20-30
v. inflata	"	0,30	Langloisiana Bourg.	Syria	0,30
destituta Charp.	Italia	0,20	lanuginosa Boissy.	Balear.	0,30-40
Diensis v. Maltz.	Kreta	0,40-50	v. roseotincta Forb.	Algeria	0,20-30
Dupotetiana Terv.	Algeria	0,30-40	lapidica L.	Germ.	0,10
elata Faur. Big.	Sicil.	0,20-30	Ledereri Pfr.	Syria	0,20-40
elegans Gm.	Eur. mer.	0,10	Lefeburiana Fér.	Carn.	0,20-30
v. alba	Hispan.	0,10	lens Fér.	Graecia	0,10-20
ericetorum Müller	Germ.	0,10	v. lentiformis Zgl.	"	0,10-20
Eugenia Pfr. v. Huetiana	Sicil.	0,30-50	lenticula Fér.	Hisp.	0,10
euphorca Bourg.	Algeria	0,20-30	lenticularis Morl.	Maracco	0,50-80
euxina Cless.	Krim	0,20-30	lentiginosa Lowe	Madeira	0,20-30
explanata Müller	Hispan.	0,20-30	leptosticta Lowe	capverd	0,40-50
faustina Zgl.	Transsylv.	0,20-30	limbata Drap.	Gallia	0,20-30
figulina Parr.	Graecia	0,30-40	Loxana Rm.	Hisp.	0,30-50
filimargo Kryn.	Krim	0,20-30	Lucasii Desh.	Algeria	0,30-40
frequens Mouss.	Brussa	0,30-40	lucorum Müll.	Italia	0,30-50
Freytagi v. Maltz.	Kreta	0,80-1	luteata Parr.	Lusitan.	0,30-40
frigida Jan.	Italia	0,20-30	lutescens Ziegl.	Transsylv.	0,30-40
fruticola Kryn.	Krim	0,30-40	macrostoma Mühlf.	Sicil.	0,30-40
fruticum Müller	Germ.	0,10	Maderensis Wood.	Madeira	0,20-30
fusca Mtg.	Anglia	0,30-40	Majoricensis Dhrn.	Balearen	0,30-40
Galloprovincialis Dup.	"	"	maritima Drap.	Lusitan.	0,10-20
(cantiana pars)	Gallia	0,10-20	marmorata Fér.	Hisp.	0,30-40
glacialis Thomas	Mt. Cenis	0,30-40	Maroccana Morl.	Marocco	1—2
Glasiana Sh.	Teneriffa	0,40-50	Martensiana Tib.	Italia	0,20-30
globularis Zgl.	Sicil.	0,20-30	Massylaea Morl.	Algeria	1,50-2
Gobanzi Frauenf.	Carn.	0,20-30	mauritanica Bourg.	"	0,20-30
Grateloupi Grälls	Baleria	1—2	Mazzullii Jan.	Sicil.	0,20-40
Gualteriana L.	Hispan.	0,80-1,50	melanostoma Drap.	Gallia	0,20-30
			mesostoma Westl.	Kreta	0,30-40

		Mk.			Mk.
Michaudi Desh.	Madeira	0,20	v. Pulskyana Haz.	Hungar.	0,20-30
Milasehewitzsch Ret.	Krim	0,20-30	v. sabulosa	"	0,10-20
Minoricensis Mitre	Balear.	0,30-40	v. solitaria	"	0,20
muralis Müll.	Italia	0,10-20	pomacella Parr.	Brussa	1-1,50
v. undulata	Sicil.	0,20-30	Ponsi Hid.	Balearen	0-30,40
Naxiana Fér.	Kreta	1-2,50	Portosanctana Sow.	Madeira	0,30-50
v. Westerlundi Blanc	"	1—2	Pouzolzi Payr.	Dalm.	0,40-60
Nebrodenis Mandr.	Italia	0,20-40	Preslii F. Schm.	Carn.	0,20-30
neglecta Drap.	Gallia	0,20-30	Prietori Hid.	Balearen	0,30-40
memoralis L.	Germ.	0,10	Pringi Pfr.	Lusitan	0,20-30
v. albolabiata L.	"	0,20	profuga A. Schm.	Kreta	0,10-20
Newka Dhrn.	Balearen	0,30-40	v. major	"	0,30
Niciensis Fér.	Gallia	0,20-30	Psiloritana v. Maltz.	"	0,40-50
nitidiuscula Sow.	Madeira	0,30-40	punctata Müll.	Hisp.	0,20-30
Nordmanni Parr.	Kauk.	1,—	punctulata Sow.	Madeira	0,30-40
noverca Westl.	Kreta	0,40-80	" subfossil	"	0,20
nummus Ehrbg.	Syria	0,20-30	pyramidata Drap.	Italia	0,10
Nyeli Mitre	Balearen	0,20-30	Pyrenaica Drap.	Gallia	0,30-40
Oberndorfi Kob.	"	0,30-40	Quimperiana Fér.	"	0,40-60
obserata Lowe	Madeira	0,20-30	Raspaili Pfr.	Corsica	0,50-80
obstructa Fér.	Syria	0,20-30	Rothi Pfr.	Kreta	0,20-40
oblecta Lowe	Madeira	0,30	rotula Lowe	Madeira	0,40
obtusata Zgl.	Krim	0,30-40	Rozeti Mich.	Algeria	0,30
obvoluta Müll.	Germ.	0,10	rubiginosa Schm.	Germ.	0,10
Olivieri Fér.	Graecia	0,20	rufescens Penn.	Anglia	0,10-20
v. parumcincta Parr.	"	0,10-20	v. clandestina Born	Helvetia	0,10-20
Oranensis Morl.	Algeria	0,20-30	v. danubialis Cless.	Germ.	0,10-20
orduliensis Kob.	Hisp.	0,20-30	v. montana Stud.	"	0,10-20
oxytropis Lowe	Madeira	0,30-40	scabriuscula Desh.	Sicil.	0,20-40
Paciniana Phil.	Sicil.	0,20-30	Scherzeri Zeleb.	Hisp.	0,40-50
Parnasia Roth	Graecia	0,40-60	Schmidti Ziegl.	Krain	0,20-30
= Codringtoni var.			sicanoides Kob.	Marokko	1,50-2
paupercula Lowe	Madeira	0,20	Siderensis v. Maltz.	Kreta	0,40-50
pellita Fér.	Graecia	0,20-30	secernenda Rm.	Dalm.	0,30-40
f. major	Kreta	0,40-50	Seetzeni Koch	Syria	0,20-30
personata Lmk.	Germ.	0,10	sericea Drap.	Germ.	0,10-20
phalerata Zgl.	Carn.	0,10-30	serpentina Fér.	Italia	0,20
phleobophora Lowe	Madeira	0,40-50	serta Alb.	Capverd.	0,30-40
" subfossil	"	0,20	setipila Zgl.	Dalm.	0,30-40
piratarum Kob.	Algeria	0,30-50	setosa Zgl.	"	0,30-40
pisana Müller	Gallia	0,10	sicana Fér.	Sicil.	0,20-30
f. sinistrorsa	"	1—2	soluta Mich.	Algeria	0,20-30
f. scalaris	"	2—3	sphaerita Hartm.	"	0,20-30
platychela Mke.	Sicil.	0,20-40	Sphakiota v. Maltz.	Kreta	0,40-60
polymorpha Lowe	Madeira	0,20-30	spirorbis Lowe	Madeira	0,20
v. pulvinata Lowe	"	0,20-30	splendida Drap.	Gallia	0,10-20
pomatia L.	Germ.	0,10-20	strigata Müller	Italia	0,20-30
v. compacta Haz.	Hungar.	0,20-30	strigella Drap.	Germ.	0,10
v. Hajnaldyana Haz.	"	0,30-40	sublecta v. Maltz. (lecta aut.)		
v. pannonica	"	0,20-30		Kreta	0,50-60

		Mk.			Mk.
f. minor	Kreta	0,30-40	Cretensis Pfr.	Kreta	0,50-80
subvariegata v. Maltz	"	0,30-50	v. elongata	"	0,80
suspecta Westl.	"	0,30-40	detritus Müll.	Germ.	0,10
submeridionalis Bourg.			v. radiatus	"	0,10
	Algeria	0,20-30	v. inflatus Parr.	Brussa	0,30
subplicata Sow.	Madeira	1—2	dirphicus Blanc.	Graecia	0,30-40
" subfossil	"	0,80	eburneus Pfr.	Asiaminor	0,30-40
Sultana Morl.	Marokko	1,50-2,50	eremita Bens.	Turkest.	0,80-1
Surrentina A. Schm.	Italia	0,20	etuberculatus Frfld.	Graecia	0,50-60
sylvatica Drap.	Helvetia	0,20	Forbesi Morl. et Desh.	Azor.	0,30
v. rhenana Kob.	Germ.	0,20	Frivaldskyi Pfr.	Brussa	0,60-80
Syriaca Ehrbg.	Kreta	0,20-30	gibber Ziegl.	Krim	0,30
tectiformis Sow.	Madeira	0,30-40	Graecus Beck	Graecia	0,40-50
testudinalis Lowe	"	0,50	Hohenackeri Kryn.	Caucas.	0,40-50
thiarella Webb. (subf)	"	0,20	intumescens v. Mart.	Turkest.	0,40-50
Thiesseana Mouss.	Graecia	0,20	labrosus Oliv.	Syria	1,—
tigrina Jan.	Italia	0,20-30	v. diminutus Mouss.	"	0,60
triarica Friv.	Transsylv.	0,20-30	lamelliferus Rossm.	Dardan.	0,20-30
trizona Zgl.	Hungar.	0,50-60	Merduenianus Kryn.	Krim.	0,30-50
trochoides Poir.	Italia	0,10-20	microtragus Rossm.	Tbessal.	0,20-40
tuberculosa Conr.	Syria	0,30-40	montanus Drap.	Germ.	0,10
turbinata Jan. (Candiota)			niso Risso	Dardan.	0,20-30
	Kreta	0,20-30	obscurus Müll.	Germ.	0,10
turricula Lowe	Madeira	0,50-60	obtusus Drap.	Austria	0,40-50
turriplanata Morl.	Lusitan.	0,30-40	olivaceus Pfr.	Kreta	0,30-40
umbilicaris Brum.	Carn.	0,20-30	Olympicus Parr.	Brussa	0,40-50
v. albina Gredl.	Tirol	0,30-40	orientalis Friv.	Constant.	1,20-1,50
umbrosa Partsch	Germ.	0,10	Ossicus Bttg.	Thessalia	0,60-80
undata Lowe	Madeira	0,40-50	ovularis Oliv.	Syria	0,20-30
" subfossil	"	0,30	v. sulcidens Mouss.	"	0,20-30
variabilis Drap.	Europ. mer.	0,10-20	pupa Brug.	Graecia	0,20
v. virgata Mtg.	"	0,10-20	pusio Brod.	"	0,30-40
variegata Friv.	Graecia	0,10-20	quinquedentatus v. Mühlf.		
ventricosa Drap.	Europ. mer.	0,10-20		Dalm.	0,20-30
vermiculata Müll.	"	0,10-20	Raynevalianus Bourg.	Dard.	1-1,50
v. minor	Kreta	0,20	reversalis Bielz.	Transsylv.	
v. pachychila	"	0,30-50	v. alpestris Bielz.	"	0,30-40
vicina Rm.	Transsylv.	0,30-40	v. brevis Bielz.	"	0,30-40
Vindobonensis Pfr.	Hungar.	0,10-20	v. venerabilis Parr.	"	0,30-40
Zafferina Fér.	Algeria	0,20-40	Rossmassleri Pfr.	Brussa	0,60-80
v. Zelleri Kob.	"	0,20-40	Saulcyi Bourg.	Syria	0,30-40
Zelebori Pfr.	Serbia	0,20-40	scapus Friv.	Syria	0,40-60
Buliminus.			septemdentatus Roth.	"	0,20-30
albiplicatus v. Mart.	Turkst.	0,60-80	sidoniensis Charp.	"	0,50-80
Bergeri Roth	Graecia	0,20-30	sogdianus v. Mart.	Turkest.	0,60-80
bidens Kryn.	Krim.	0,20-40	squalinus Rossm.	Brussa	0,20-30
v. costatus Retow.	"	0,20-30	Sturni Küst.	"	0,50-1
carneolus Mouss.	Constant.	0,50-60	subulatus Rossm.	Krim	0,30-40
chondriformis Mouss.	Syria	0,30	tauricus Lang.	"	0,20-40
			v. Retowskianus Cless.	"	0,20-30

		Mk.			Mk.
v. zebriola Cless.	Krim	0,20-30	angustior Jeffr.	Germ.	0,10
Thiesseanus Mouss.	Graecia	0,20-30	antivertigo Drap.	"	0,10
todillus Morl.	Algeria	0,30-40	arctica v. Wll.	"	0,20
Tournefortianus Fér.	Brussa	0,30	avenacea Brug.	Brussa	0,10
tridens Müll.	Germ.	0,10-20	Bergamensis Charp.	Italia	0,10-20
v. eximius Rossm.	Trans.	0,20	biplicata Mich.	Gallia	0,20-30
zebra Oliv.	Graecia	0,10	v. excessiva Gredl.	Tirol	0,30
v. boeticus Bourg.	"	0,20	Brauni Charp.	Hispan.	0,20-30
Cionella.			Brondeli Bourg.	Algeria	0,20-30
acicula Müll.	Germ.	0,10	calathiscus Lowe.	Madeira	0,20
v. Liesvillei Bourg.	Syria	0,20	calpica Westl.	Hispan.	0,30
agraecia Bourg.	Algeria	0,30	cassida Lowe	Madeira	0,30-40
amblya Bourg.	"	0,20-30	cheilogenæ Lowe.	"	0,20-30
folliculus Gronov.	Hispan.	0,10-20	claustralis Gredl.	Tirol	0,20-30
f. Vescoi Bourg.	"	0,10-20	concinna Lowe	Madeira	0,20-30
gracilenta Morl.	Algeria	0,20-30	conica Rossm.	Carn.	0,20-30
gracilis Lowe.	Madeira	0,20-30	costulata Nilss.	Germ.	0,10-20
Hierosolymarum Roth	Syria	0,20-30	cylindracea D. C.	Brussa	0,10
Jani de Betta(veneta Charp.)	Tirol	0,30-40	doliolum Brug.	Germ.	0,10
Hohenwarti Rossm.	Italia	0,30-50	v. scyphus Friv.	Constant.	0,10-20
Letourneuxi Bourg.	Algeria	0,30-40	dolium Mich.	Germ.	0,10-20
lubrica Müll.	Germ.	0,10	edentula Drap.	"	0,10-20
v. nitens Kok	"	0,20	v. Gredleri v. Mart.	"	0,20
mabilliana Fagot.	Gallia	0,20-30	Farinessii Desm.	Gallia	0,20
Maderensis Lowe.	Madeira	0,20	Ferrari Porro.	Italia	0,10-20
Maltzani Cless.	Kreta.	0,30-40	ferraria Lowe.	Madeira	0,20
melampoides Lowe.	Madeira	0,30-40	frumentum Drap.	Germ.	0,10
mitraeformis Lowe.	"	0,20-30	v. apennina Charp.	Italia	0,10-20
Moussoniana Bourg.	Syria	0,20-30	v. cylindracea	Dalm.	0,10-20
nanodea Bourg.	Algeria	0,20-30	v. curta Küst.	Tirol	0,10-20
oryza Lowe.	Madeira	0,20	v. elongata Rossm.	"	0,10-20
ovuliformis Lowe	"	0,20-30	v. Illyrica Rossm.	"	0,10-20
procerula Morl.	Algeria	0,30-40	fusca Lowe.	Madeira	0,20
pupaeformis Cantr.	Dalm.	0,20-30	Genesi Gredl.	Tirol	3,—
tornatellina Lowe.	Madeira	0,20	granum Drap.	Kreta	0,10
tridens Pult	Germ.	0,20-30	gularis Rossm.	Carinth.	0,20
v. Nouletiana Dup.	Gallia	0,30	v. spoliata Rossm.	Tirol	0,20
triticea Lowe.	Madeira	0,20-30	irrigua Lowe.	Madeira	0,20-30
tumulorum Bourg.	Graecia	0,20-30	jumillensis Guir.	Hispan.	0,30-40
vitrea Webb.	Madeira	0,10-20	Kobelti Hid.	"	0,30
Stenogyra.			Kokeili Rossm.	Carn.	0,20-30
decollata L.	Europ. mer.	0,10-20	Lilljeborgi Westl.	Suetia	0,20-30
v. cylindrica	Kreta	0,20	Lusitanica Rossm.	Lusitan.	0,30-40
Pupa.			manotiana Bourg.	Hispan.	0,30-40
affinis Rossm.	Gallia	0,30-40	megachilos Jan.	Italia	0,10-20
Algesirae Kob.	Hispan.	0,30-40	v. bigorriensis	Gallia	0,20
alpestris Alder	Danemark	0,20	Michaudi Terv.	Algeria	0,30
			millegrana Lowe.	Madeira	0,20
			minutissima Hartm.	Germ.	0,10-20
			monticola Lowe.	Madeira	0,20

		Mk.			Mk.
Moulinsiana Dup.	Germ.	0,20	anaphiensis Bttg.	Graecia	0,50
Mühlfeldtii Küst.	Dalm.	0,10	angustata Bielz	Transsylv.	0,30
muscorum L.	Germ.	0,10	approximans Ziegl.	Carn.	0,50-60
oblitterata Charp.]	Hispan.	0,20-30	aquila Parr.	Dalm.	0,30
occulta Parr.	Sicil.	0,20-30	Arcadica Bttg.	Arcad.	0,50-60
opisthodon Reinh.	Hungar.	0,20	archilabris Küst.	Dalm.	0,20-40
pagodula Desm.	Germ.	0,10	armata Kutsch.	"	0,20-40
v. gracilis Bttg.	Croatia	0,20	Arthuriana Blanc.	Kreta	0,80-1
pallida Pfr.	Italia	0,20	asphaltina Ziegl.	Carn.	0,20
v. amyceta Parr.	"	0,10-20	baeotica Küst.	Graecia	0,40-50
Philippii Cantr.	Graecia	0,10	Bergeri Mayer	Germ.	0,10-20
polyodon Mich.	Gallia	0,20	bicristata Friv.	Graecia	0,20
pusilla Müll.	Germ.	0,10-20	v. major	"	0,30
pygmaea Drap.	"	0,10	v. canaliculata Pfr.	"	0,20
Pyrenaearia Mich.	Hispan.	0,30	v. tetragonostoma Pfr.	"	0,20-30
v. saxicola Moq. Tand.	"	0,30	bidens L.	Italia	0,10
recta Lowe.	Madeira	0,20-30	hidentata Ström.	Germ.	0,10
Rhodia Roth.	Graecia	0,10-20	v. meridionalis Fagot	Gallia	0,20
ringens Mich.	Hispan.	0,20	v. septentrionalis Sch.	Norw.	0,20
Rossmassleri Schm.	"	0,30-40	Bielzi Parr.	Transsylv.	0,20
saxicola Lowe. (seminulum Lowe.)	Madeira	0,20	v. clathrata Friv.	"	0,30
secale Drap.	Germ.	0,10	v. Madensis Fuss	"	0,20-30
v. Boileausiana Charp.	Gallia	0,20-30	bilabiata Wagn.	Dalm.	0,20-30
Semproni Charp.	"	0,10-20	binodata Ziegl.	"	0,20
v. dilucida Ziegl.	Tirol	0,10-20	v. consentanea Zigl.	"	0,30
sphinctostoma Lowe.	Mad.	0,20-30	bipalatalis v. Mart.	Kreta	0,30
striata Gredl.	Tirol	0,20-30	v. gracilior Bttg.	"	0,20-30
Strobili Gredl.	"	0,20	biplicata Mtg.	Germ.	0,10
substriata Jeffr.	Germ.	0,20	subsp. bohemica Cless.	"	0,20-30
superstructa Mouss.	Caucas.	0,20	Blanci v. Mart.	Graecia	0,20
Tingitana Kob.	Marocco	0,30	blanda Ziegl.	Dalm.	0,40-50
triplicata Stud.	Helvet.	0,10-20	Bogatensis Bielz	Transsylv.	0,30
truncatella Ziegl.	Transylv.	0,20-30	Boissieri Charp.	Syria	0,20-30
variabilis Drap.	Gallia	0,10-20	Brusinae Kutsch.	Dalm.	0,50
			byzantina Charp.	Kreta	0,30-40
			v. intermedia A. Schm.	"	0,30
			v. solidula Pfr.	"	0,20
			f. minor	"	0,20
			caerulea Fér.	Syria	0,10-20
			v. amorgia Bttg.	Graecia	0,10-20
			v. Antiparia Bttg.	"	0,10-20
			v. birugosa Parr.	"	0,10-20
			v. Naxia Bttg.	"	0,10-20
			v. Nia Bttg.	"	0,10-20
			v. Tinorensis Mouss.	"	0,10-20
			Calcarae Phil.	Sicil.	1,—
			callifera Küst.	Dalm.	0,20-30
			cana Held	Germ.	0,10-20
			v. iostoma A. Schm.	Transsylv.	0,30
			v. Transsylvanica Bielz	"	0,20-30

		Mk.			Mk.
Candida Pfr.	Kreta	0,40	denticulata Oliv.	Graecia	0,40-50
candidescens Ziegl.	Italia	0,10	detersa Ziegl.	Krim	0,30
v. cinerea Phil.	"	0,10-20	discolor Pfr.	Graecia	0,30
canescens Parr.	Transsylv.	0,10-20	v. inaequata Blanc	"	0,20-30
Carinthiaca A. Schm.	Carinth.	0,30	dissipata Bttg.	"	0,30-40
Carniolica Ziegl.	Carn.	0,30	divergens Klec.	Dalm.	0,30-40
Cattaroensis Ziegl.	Dalm.	0,10-20	Drakakisi v. Maltz.	Kreta	0,80-1
Chia Bttg.	Graecia	0,20-30	(= extensa Bttg. non Pfr.)		
v. Samia Bttg.	"	0,20-30	v. centralis Bttg.	Kreta	0,60-80
v. submarginata Bttg.	"	0,20-30	dubia Drap.	Germ.	0,10
cincta Rossm.	Carn.	0,10-20	v. gracilis Pfr.	Hungar.	0,20
v. Rossmassleri Pfr.	"	0,10-20	v. Grimmeri Parr.	Germ.	0,20
circumdata Friv.	Brussa	0,30-40	v. major	Helvet.	0,20
clandestina Rossm.	Graecia	0,30	v. speciosa A. Schm.	Hungar.	0,20-30
v. Thiesseae Bttg.	"	0,30-40	v. Transsylvanica A. Schm.		
clara Bttg.	Kreta	1-2		Transsylv.	0,20
v. paucicostata Bttg.	"	1-1,50	v. Vindobonensis A. Schm.		
coarctata Mouss.	Graecia	0,20-30		Hungar.	0,20
comensis Schuttl.	Tirol	0,20-30	Duboisii Charp.	Caucas.	0,20
commutata Rossm.	Carn.	0,10-20	elata Ziegl.	Transsylv.	0,20
v. fusca de Belta	Italia	0,10-20	elegans Bielz	"	0,20
v. unguolata Ziegl.	Carn.	0,10-20	exarata Ziegl.	Dalm.	0,10-20
compressa Pfr.	Graecia	0,20-30	exigua Lowe.	Madeira	0,40-50
concilians A. Schm.	Transsylv.	0,20	extensa Pfr. (Vesti Böttg.)		
Conemenosi Bttg.	Graecia	0,30-40		Kreta	0,50-60
confusa Bttg.	"	0,40	v. orientalis Bttg.	"	0,40-50
conspurecata Jan.	Dalm.	0,10	v. maxima	"	1,—
v. subcrenata Parr.	"	0,30	fallax Rossm.	Transsylv.	0,20
corpulenta Friv.	Brussa	0,20	filograna Ziegl.	Germ.	0,10-20
corrugata Drap.	Kreta	0,40-50	fimbriata Mühlf.	Illyr.	0,10-20
v. almyrosana Bttg.	"	0,30	v. pallida Jan.	"	0,10-20
v. homaloraphe Bttg.	"	0,40	formosa Ziegl.	Dalm.	0,20-30
subsp. inflata Oliv.	"	0,20	foveicollis Parr.	Caucas.	0,20-30
" v. gracilior Bttg.	"	0,30	fulcrata Ziegl.	Dalm.	0,60
" Draparnaldi Beck	"	0,50	Fussiana Bielz	Transsylv.	0,20
corynodes Held	Germ.	0,10-20	v. pruinosa Bielz	"	0,40
costulata Jan.	Italia	0,20-30	gastrolepta Ziegl.	Dalm.	0,20
crassilabris Küst.	Dalm.	0,30	v. Freyeri Küst.	"	0,20
v. callida Parr.	"	0,30	gibbula Ziegl.	"	0,10
Cretensis Rossm.	Kreta	0,80-1	v. peucetana Kob.	"	0,20
cruciata Stud.	Helvet.	0,10	glabella Pfr.	Kreta	0,60-80
v. minima A. Schm.	Germ.	0,20	glauca Bielz	Transsylv.	0,20
Dacica Friv.	Bosnia	0,30	v. minor Bielz	"	0,20
Dalmatina Partsch	Dalm.	0,20	glorifica Rossm.	"	0,30
v. minor Parr.	"	0,20	Goldfussi Bttg.	Graecia	0,60-80
decipiens Rossm.	"	0,20-30	Goldi Kutsch.	Dalm.	0,30-40
deltostoma Lowe	Madeira	0,20	Grabusana Bttg.	Kreta	1,—
v. obesuscula Lowe	"	0,40	v. humillima Bttg.	"	0,60-80
v. undulata	"	0,20	gracilicosta Ziegl.	Krim	0,30
densestriata Ziegl.	Carn.	0,10-20	graciliformis Kutsch.	Dalm.	0,30

		Mk.			Mk.
Grayana Pfr.	Dalm.	0,30	Macarana Ziegl.	Dalm.	0,20-30
grisea Desh.	Graecia	0,10-20	v. stenostoma Rossm.	"	0,30
Grohmanniana Partsch Pal.		0,20-30	maculosa Desh.	Graecia	0,20-30
grossa Ziegl.	Carn.	0,20-30	Maderensis Parr.	Madeira	0,30-40
gulo Rossm.	Transsylv.	0,30-40	maesta Fér.	Syria	0,20-30
Haueri Bielz	"	0,30-40	magniventris Küst.	Dalm.	0,20-30
Helena Klec.	Dalm.	0,40-50	Maltzani Bttg.	Kreta	1—2
hetaera Friv.	Bospor.	0,40-50	marginata Ziegl.	Transsylv.	0,20
hians Bttg.	Alban.	0,30-40	Marisi A. Schm.	"	0,30
Hippoliti Blanc	Kreta	1,—	maritima Klec.	Dalm.	0,30-40
Huebneri Rossm.	Natolia	0,40-60	v. Thiesseana Bttg.	Graecia	0,30-40
humilis Küst.	Transsylv.	0,40-50	Meschendoerferi Bielz.	Trans.	0,40-50
incisa Küst.	Italia	0,20	Messenica v. Mart.	Graecia	0,20
incommoda Bttg.	Zante	0,20-30	modesta Ziegl.	v. interpicta	
interrupta Ziegl.	Carn.	0,10-20		Cephalon.	0,20-30
f. albina Carn.	"	0,10-20	montana Stentz	Transsylv.	0,20-30
Josephinae Bttg.	Graecia	0,30-50	v. viridana Ziegl.	"	0,30
isabellina Pfr.	"	0,20	Montenegrina Küst.	Dalm.	0,30-40
Itala v. Mart.	Italia	0,10-20	Moreletiana Blanc	Kreta	0,60
v. Braunii Charp.	Germ.	0,20	v. minor	"	0,50
v. ornata Bttg.	Italia	0,10-20	mucida Ziegl.	Carn.	0,10-20
v. punctulata Mich.	"	0,20	v. badia Rossm.	"	0,10-20
v. rubiginea Ziegl.	"	0,20	v. fontana F. Schm.	"	0,30
Kephissiae Roth.	Graecia	0,20	munda Ziegl.	Smyrna	0,30-40
Krueperi Zel. v. furcilla			muralis Küst.	Dalm.	0,50-60
Westl.	Graecia	0,30-40	naevosa Fér. v. corcyensis		
v. holostoma Bttg.	"	0,30-40	Mouss.	Graecia	0,20-30
Kutschigi Küst.	Dalm.	0,30-40	v. epirotica Mouss.	"	0,20-30
v. contracta Ziegl.	"	0,30	v. senilis Rossm.	"	0,20-30
laevissima Ziegl.	"	0,10-20	negropontina Pfr.	"	0,20-30
v. pachygastris Partsch	"	0,20	v. costulata Thiesse	"	0,20-30
v. superstructa	"	0,20	nobilis Pfr.	Sicil.	1—2
lamellata Ziegl.	"	0,40	notabilis Küst.	Dalm.	0,50-60
lamellosa Wagn.	"	0,20	ornata Ziegl.	Tirol	0,10-20
laminata Mtg.	Germ.	0,10	v. gracilis Bttg.	"	0,20
v. alpestris Bielz	Transsylv.	0,20-30	orthostoma Mke.	Germ.	0,10
v. dubiosa Cless.	Carn.	0,10-20	v. filiformis A. Schm.	Trans.	0,10-20
latestriata Bielz	Transsylv.	0,20	Oscari Thiesse	Graecia	0,60-80
Letochana Gredl.	Tirol	0,30	osculans v. Mart.	"	0,20-30
v. Funki Küst.	"	0,30	pachychila Ziegl.	Dalm.	0,20
leucoraphe Blanc	Graecia	0,30-40	pachystoma Küst.	"	0,20
leucostigma Ziegl.	Italia	0,10	v. minor	"	0,20
v. candidilabris Porro	"	0,10	Pagana Ziegl.	Transsylv.	0,20-30
v. opalina Ziegl.	"	0,20	Parreyssi Ziegl.	"	0,30
lineolata Held.	Germ.	0,10	parvula Stud.	Germ.	0,10
v. modulata Parr.	Italia	0,20	Pauli Mab.	Gallia	0,30-40
Lischkeana Parr.	Transsylv.	0,10-20	Pfeifferi Küst.	Dalm.	0,20
v. cornea A. Schm.	Germ.	0,10-20	piceata Ziegl.	Italia	0,20
Lowe Alb.	Madeira	0,80	v. gracilior Charp.	"	0,20
lunellaris Pfr.	Graecia	0,20	Pikermiana Roth	Graecia	0,20

		Mk.			Mk.
plicata Drap.	Germ.	0,10	Strobili Porro	Italia	0,20
forma implicata	"	0,20	strumosa Friv.	Brussa	0,20
plicatula Drap.	"	0,10	Stussineri Bttg.	Thessal.	0,60-80
v. nana Schm.	"	0,20	sublamellosa Bttg.	Kreta	0,60-80
plumbea Rossm. Transsylv.		0,10-20	v. oblitterata Bttg.	"	1,—
v. cornea Ziegl.	"	0,10	subvirginea Bttg. v. farcimen		
praeclara Pfr.	Kreta	1—2	Bttg.	Kreta	0,80
profuga Charp.	Graecia	0,30-40	succineata Ziegl.	Dalm.	0,10-20
pumila Ziegl.	Carn.	0,10-20	sulcosa Wagn.	"	0,20
v. sejuncta A. Schm. Germ.		0,20	v. diminuta Parr.	"	0,20
v. succosa A. Schm. Trans.		0,20	Syracusana Phil.	Sicil.	0,20-30
punctulata Küst.	Italia	0,10	tennicostata Pfr.	Kreta	0,50-60
regalis Parr.	Transsylv.	0,20	v. mitis Bttg.	"	0,40-50
regina Küst.	Dalm.	0,30-40	v. strictecostata Bttg.	"	0,40-50
regularis Parr.	"	0,30-40	teres Oliv.	"	0,50
robusta Küst.	"	0,30	v. hierapetrana Bttg.	"	0,40
v. minor	"	0,20	v. phalanga Bttg.	"	0,60
Rolphi Leach	Anglia	0,20-30	v. f. minor	"	0,40
rugicollis Ziegl.	Hungar.	0,20-30	v. subcostata Bttg.	"	0,50
v. carissima Rossm.	"	0,30	v. f. minor.	"	0,30-40
v. maxima A. Schm.	"	0,20-30	Thermopylarum Pfr. Graecia		0,40-50
v. oleata Rossm.	"	0,30	Thessalonica Friv. v. crassi-		
rugosa Drap.	Gallia	0,10-20	labris Bttg.	Thessal.	0,40-50
rupestris Friv.	Brussa	1,—	v. spreta Friv.	Constant.	0,40-50
rupestris Friv.	Olymp.	1—2	Tiesseae Bttg.	Graecia	0,40-50
satura Ziegl.	Dalm.	0,20-30	tichobates Parr.	Dalm.	0,40-60
saxicola Parr.	Graecia	0,10-20	torticollis Oliv.	Kreta	1,50-2
Schmidt Pfr.	Carn.	0,20-30	troglydites A. Schm.		
Schwerzenbach Charp. Brus.		0,20-30	v. vexans Bttg.	"	0,40-50
semilamellata Mouss. Cauc.		0,40-50	Tschetschenica Bayer Cauc.		0,30-40
semirugata Ziegl.	Dalm.	0,20	tumida Ziegl.	Transsylv.	0,20-30
v. pygmaea Ziegl.	"	0,20	turgida Ziegl.	"	0,20-30
v. vibex Rossm.	"	0,20	v. elongata Rossm. Hungar.		0,30
septemplicata Phil.	Sicil.	0,20-30	turrita Pfr.	Graecia	0,20
serrulata Midd.	Caucas.	0,50-60	umbilicata Bttg.	Dalm.	0,50-60
Sirki Parr.	Dalm.	0,50-60	vallata Mouss.	Janina	0,30-50
solida Drap.	Gallia	0,10-20	varians Ziegl.	Germ.	0,10-20
soricata Pfr. v. biflosa			v. diaphana Ziegl.	Carn.	0,10-20
Blanc	Graecia	0,20	venosa Bttg.	Kreta	1.—
Spratti Pfr.	Kreta	1-1,50	ventricosa Drap.	Germ.	0,10-20
spreta Friv.	Constant	0,40-50	venusta A. Schm.	Graecia	0,30-40
Stentzi Rossm.	Carn.	0,10-20	vetusta Ziegl.	Carn.	0,20
v. cineta Brum.	"	0,10-20	v. festiva Küst.	Germ.	0,10-20
straminicollis Parr.	Trans.	0,10-20	v. striolata Parr. Transsylv.		0,20-30
v. occidentalis	"	0,20	Villae Mühlf.	Italia	0,40-50
striata Pfr.	Kreta	0,40-50	virgata Jan.	"	0,20
strigata Pfr.	"	0,40	v. affinis Phil.	Sicil.	0,20
v. acuticosta Bttg.	"	0,50	virginea Pfr. v. leucoderma		
v. centralis	"	0,50	Bttg.	Kreta	0,50-60
strigillata Mühlf.	Dalm.	0,20	Voithi Rossm.	Graecia	0,30
			xanthostoma Bttg.	Kreta	0,60-80

		Mk.			Mk.
Succinea.			Aeme.		
elegans Risso	Germ.	0,20	Banatica Desh.	Transsylv.	0,60-80
v. Bandoniana Haz.	Hungar.	0,20-30	cryptomena Folin	Gallia	0,50-60
v. levantina Desh.	"	0,20-30	gracilis Cless.	Carn	0,60-80
v. Piniana Haz.	"	0,20	lineata Hartm.	Germ.	0,30-40
Hungarica Haz.	"	0,20	polita Hartm.	"	0,40-50
v. hasta Haz.	"	0,20	spectabilis Rossm.	Carn.	1.-1.50
Kobelti Haz.	"	0,20-30	Cyclostoma.		
laponica Cless.	Suetia	0,30-40	costulatum Ziegl.	Hungaria	0,20-30
lenta West.	"	0,20-30	elegans Müll.	Europ. mer.	0,10
longiscata Morl.	Gallia	0,20-30	ferrugineum Lam.	Balear.	0,20
oblonga Drap.	"	0,10-20	mamillare Lam.	Algeria	0,20-30
v. arenaria Bouch.	Germ.	0,20-30	Olivieri Roth	Syria	0,50-60
v. elongata Cless.	Suetia	0,20-30	sulcatum Drap.	Sicil.	0,20
Pfeifferi Rossm.	Germ.	0,10-20	v. multisulcatum Pott	"	0,30
v. debilis Morl.	Carn.	0,20-30	Pomatias.		
v. recta Baud.	Germ.	0,20-30	apricus Mouss.	Gallia	0,20-30
putris L.	Hungar.	0,10	auritus Ziegl.	Dalm.	0,20
v. acuta Haz.	"	0,20	Canestrinii Adami	Italia	0,30-40
v. angusta Haz.	"	0,20	cinerascens Rossm.	Dalm.	0,20-30
v. Clessiniana Haz.	"	0,20-30	Croaticus Zeleb.	Croatia	0,20
v. fontana Haz.	"	0,20	gracilis Küst.	Dalm.	0,20-30
v. grandis Haz.	"	0,30	Hellenicus Bourg.	Graecia	0,40-50
v. Westerlundiana Haz.	"	0,20	Henricae Strobel	Tirol	0,10-20
Succica Cless.	Anglia	0,20-30	Hidalgoi Crosse	Hispan.	0,30
Valcourtiana Bourg.	Gallia	0,20-30	Hirzi Stoss.	Croatia	0,20-30
Carychium.			Hispanicus Bourg.	"	0,40
minimum Müll.	Germ.	0,10	Lapurdensis Folin.	Gallia	0,30-40
v. inflata	Kreta	0,20	nanus Westl.	Croatien	0,20-30
striolatum Bourg.	Tirol	0,20	obscurus Drap.	Gallia	0,20
tridentatum Bourg.	Gallia	0,20	patulus Drap.	Carn.	0,10
Zospeum.			Philippianus Gredl.	Italia	0,30-40
alpestre Freyer	Carn.	0,50-60	Pinianus Bourg.	"	0,20-30
costulatum Freyer	"	0,50-60	plumbeus Westl.	Carn.	0,20
Freyeri Schm.	"	0,50-60	scalarinus Villa	Dalm.	0,20-30
obesum Schm.	"	0,50-60	septemspiralis Raz.	Carn.	0,10
pulchellum Frauenf.	"	0,50-60	v. Heydenianus Cless.	"	0,10-20
reticulatum Hauffen	"	0,50-60	tesselatus Rossm.	Graecia	0,20-30
Schmidti Frauenf.	"	0,40-50	Vallae Stoss.	Italia	0,20
spelaeum Rossm.	"	0,60-80			

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren
 Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut
 Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Tausch-Catalog 1883 No. 6.

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

		Mk.			Mk.
Strombus					
auris Dianae L.	Ind. or.	0,40-1	multipes Desh.	M. ind.	4—5
australis Sow.	Austral.	2,00	scorpio L.	Molucc.	1—2
Campbelli Gray	"	1-1,20	Aporrhais		
canarium L.	Ceylon	0,30-60	occidentalis Beck.	N. Fundl.	5—8
columba Gm.	Philppn.	0,60-80	pes-carbonis Bronn	Mittelm.	2—5
cylindricus Sws.	I. d. fr.	0,40-80	pes-pelecani L.	Europ.	0,20-80
dentatus L.	Ind. ope.	0,80-1	Struthiolaria		
elegans Sow.	M. rubr.	0,50-1	pes struthio cameli L.	N. Zeal.	2,50-3,00
epidromis L.	Philppn.	0,50-1	Terebellum		
fasciatus Born	Oc. ind.	0,40-60	subulatum Lm.	Oc. ind.	0,50-1,20
floridus Lm.	"	0,20-50	Priamus		
" " var. minor "	"	0,20-30	stercus-pulicum Ch.	Cadix	20,—
fusiformis Sow.	M. rubr.	0,80-1	Cypraea		
gibberulus L.	Ind. or.	0,20-60	albuginosa Maw.	Californ.	2—3
gigas L. c. op.	Ind. occ.	4—5	angustata Gm.	N. Holl.	1,50-3
gracilior Wood	Californien	1—2	annulus L.	M. ind.	0,10-30
granulatus "	Amer. c.	1-1,50	arabica L.	Ind. or.	0,20-60
haemastomus L.	Mauritius.	0,30-50	arabica Lm.	Columb.	0,40-60
inermis Sow.	Ind. occ.	2—3	arenosa Gray	I. Anna	0,40-1
Isabella Lm.	Philippn.	0,40-60	argus L.	Oc. ind.	1—2
laciniatus Ch.	Amboina	10,—	asellus L.	Ind. or.	0,10-20
lentiginosus L.	Philippn.	0,40-80	aurantium Martyn.	Tahiti	0,30 40
lobatus Sw.	Ind. occ.	0,40-1,00	caput serpentis L.	Ind. or.	0,20-30
lunatus L.	Philippn.	0,30-50	carneola L.	Austr.	0,20-60
maculatus Nutt.	I. Sandw.	0,60-80	caurica L.	Oc. ind.	0,10-40
marginatus L.	Ind. or.	1,50	cervinetta Kien	Peru	0,50-1
melanostomus Sw.	Philippn.	2—3	cernica Sow.	Mauritius	1—2
minimus L.	"	0,20-40	cervus L.	M. anst.	2—3
novae-zelandiae Ch.	N. Zeal.	3—5	cinerea Gm.	Ind. oc.	1—2
papilio Ch.	N. Guin.	5—7	clandestina L.	M. asiat.	0,10-20
peruvianus Sw.	Peru	3—5	Comptoni Gray	N. Holl.	2,—
plicatus Lm.	Ind. or.	0,20-40	cribaria L.	Oc. ind.	0,40-80
pugilis L. c. op.	Ind. occ.	0,80-1,50	cribellum Gask.	Maurit.	1-1,50
pyrulatus Lm.	Florida	1—2	cylindrica Barn.	Philippn.	1—2
rugosus Sow.	Ind. or.	1,50	eburnea Barn.	"	1—2
Ruppellii Rve.	M. rubr.	0,40-80	edentula Sow.	Afric. mer.	1-2,50
succinctus L.	Ceylon	0,50-80	erosa L.	Oc. ind.	0,10-30
septimus Ducl.	China	2,—	errones L.	Ind. occ.	0,10-30
terebellatus Sow.	Philippn.	1-1,50	esontropia Ducl.	Austr.	1—2
tricornis Lm.	M. rubr.	1,00-1,50	exantherna L.	Ind. occ.	0,60-1
urceus L.	Ind. or.	0,20-40	felina Gm.	Oc. ind.	0,20-50
" var. chrysostomus "	"	0,30-50	fimbriata Gm.	Japan	0,20-30
variabilis Sw.	Philippn.	0,40-60	gaugrenosa Dillw.	China	0,20-40
vittatus L.	"	0,60-1,20	helvola L.	Oc. ind.	0,10-20
Rostellaria			hirundo L.	"	0,10-20
curvirostris Lm.	M. rubr.	2—3	interrupta Gray	Philippn.	1-1,50
crispata Sow.	Philippn.	1—2	irrorata Sol.	Pacif.	0,50-60
Pterocera			Isabella L.	Mdgsr.	0,10-30
aurantia Lm.	Ind. or.	1-1,50	Lamarki Gray	"	0,50-80
chiragra L.	"	1-1,50	lurida L.	Oc. atl.	0,20-60
elongata Sws.	Philippn.	3—4	lynx L.	Oc. ind.	0,10-40
lambis L.	Ind. or.	0,50-1	mappa L.	"	1,50-3
			" var. rosea	"	3—5

		Mk.			Mk.
mauritiana L.	Oc. ind.	0,50-1,20	cicercula L.	Pacif.	0,20-40
Menkeana Dsh.	Maurit.	0,40-60	europaea Mft.	Europa	0,10-30
microdon Gray	Philippn.	0,40-50	globulus L.	Ind. or.	0,40-50
miliaris Gm.	Japan	0,50-80	insecta Migh.	I. Sandw.	0,30-50
moneta L.	Ind. or.	0,10-20	margarita Soland	Austr.	1-1,50
mus L.	Oc. atl.	0,40-1	nivea Gray	"	0,20-40
neglecta Sow.	Ind. or.	0,30-50	nucleus L.	Maur.	0,20-40
nivosa " (schön)	Siam.	80,—	oryza Lm.	M. ind.	0,20-30
obvallata Lm.	Tahiti	0,20-50	ovulata "	Cap.	1—2
ocellata L.	Ceylon	0,20-30	pacifica Gray	Gallop.	0,40-1
onyx L.	"	0,60-1,20	pediculus L.	Ind. occ.	0,20-30
var. adusta Lm.	"	0,80-1	pulex Soland	M. med.	0,10-30
pallida Gray	Japan	2,—	pustulata "	Panama	0,50-1
pantherina Soland.	M. ind.	0,30-80	quadripunctata Gr.	Ind. occ.	0,20
picta Gray	Senegal	1-1,50	radians Lm.	Mexico	0,30-60
poraria L.	Austr.	0,10-30	sanguinea Gray	Columb.	0,20-40
pulchella Sw. (nicht schön)	China	2—4	scabriuscula Gray	I. Ticao	0,20-40
punctulata Gray.	Panama	0,30-50	staphylaea L.	Oc. ind.	0,10-30
physis Broecchi	M. Med.	10—20	V. limacina Lm.	Philippn.	0,10-20
punctata L.	Philippn.	0,40-60	subrostrata Gray.	Ind. occ.	0,30-50
pyrum Gm.	M. med.	0,50-1	suffusa "	Gallop.	0,20-30
reticulata Martyn	Austr.	0,40-1	tricornis Jouss.	Maur.	0,50-1
var. minor	"	0,20-30	vitrea Gask	Cap.	0,50-1
" " histrio	"	0,50 1	Ovula		
Scottii Brod.	N. Holl.	15—20	Adriatica Sow.	M. med.	0,30-60
scurra Ch.	Oc. ind.	0,50-1,20	carnea Poir.	"	0,20-30
Sowerbyi Ant.	Calif.	1—2	ovum L.	Oc. ind.	0,30-1
spurea L.	M. med.	0,20-50	Calpurnus		
stercoraria L.	Afric.	0,50-1,50	verrucosus L.	Philipp.	0,40-80
V. rattus "	"	0,50-1,20	Cyphoma		
stolida "	Ceylon	1—2	gibbosa L.	Oc. ind.	0,20-30
subcylindrica Sow.	Austral.	2,—	Birostra		
subviridis Rve.	"	1,50-2,50	formicaria Sow.	Cochinch.	0,40-60
tabescens Soland.	Oc. ind.	0,50-1,20	spelta L.	M. med.	0,50-60
talpa L.	M. ind.	0,30-1	Pedicularia		
testudinaria L.	Oc. ind.	2—3	pacifica Pease	Pacific.	1-1,50
tigris L.	Ind. or.	0,30-1	Cancellaria		
turdus Lm.	M. ind.	0,20-40	asperella Lam.	Philipp.	3—5
umbilicata Sow.	Austr.	8—12	buccinoides Sow.	Callao.	2-3,50
ursellus Gm.	Oc. ind.	0,20-40	cancellata L.	M. med.	1—2
undata L.	"	0,20-40	costifera Sow.	Philipp.	1—3
variolaria Lm.	"	0,20-40	littorinaeformis Sow.	Ceylon	3—4
ventriculus "	Austral.	0,80-1,50	lamellosa Hind.	Cap.	2,50
vitellus L.	Oc. ind.	0,20-40	obliquata Lam.	Jansibas	2-2,50
ziczac L.	"	0,20-40	piscatoria Desh.	Sénégal	1,50-2,00
Trivia			rugosa Lam.	Ind. occ.	1—2
Adansoni Gray	Mauritius	3,—	scalata Sow.	Maur.	1-1,50
annulata "	I. Georg.	0,80-2	scalarina Lam.	"	2—3
australis Lm.	N. Holl.	0,40-50	spirata Lam.	Oc. ind.	3—4
californica Gray.	Californ.	0,20-40	semidisjuncta Sow.	Philipp.	3—4
candida Gask.	Philippn.	0,20-40	similis Sow.	Sénégal	1-2,50
Childreni Gray	Maurit.	0,30-80			

Bei sofortiger Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschver. 10% Rabatt.
 Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren.
 Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut
 Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

Binnen - Conchylien

aus dem paläaretischen Faunengebiet.

(Fortsetzung.)

Die genaueren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.

	Mk.		Mk.
<i>Succinea</i>		ovata Drap.	0,10
putris L.	0,10	" var. inflata Kob. . . .	0,10-30
" var. Clessiniana Haz.	0,20-30	" " Piniana Haz. . . .	0,20-30
" " grandis "	0,30	" " fluminensis Cless.	0,10-20
" " fontana "	0,20	" " intermedia Fér. . .	0,20-30
" " olivula Baudon	0,20-30	peregra Drap.	0,10
" " angusta Haz. . . .	0,20	" var. callosa Ziegl. . .	0,10-20
Pfeifferi Rossm.	0,10-20	" " frisia Friedel . . .	0,20
Hungarica Hazay	0,20	" " marginata Mich. . .	0,20
" var. hasta "	0,20	" " curta Cless. . . .	0,10-20
elegans Risso	0,20	" " rivularis Parr. . . .	0,20
" var. Baudoniana Haz.	0,20-30	" " thermalis Boubée . .	0,10-20
" " Piniana Haz. . . .	0,20	stagnalis L.	0,10-20
" " levantina Desh. . .	0,20-30	" var. lacustris Stud. . .	0,20-30
oblonga Drap.	0,10-20	" " borealis Bourgt. . .	0,10-20
Kobelti Haz.	0,20-30	palustris Müll.	0,10
<i>Carychium</i>		" var. corvus Gmel. . . .	0,10-20
minimum Müll.	0,10	" " distorta Rossm. . . .	0,10-20
" var. inflata Bttg. . .	0,20	" " septentrionalis Cls. .	0,10-20
striolatum Bourg.	0,20	" " fusca C. Pfr.	0,10
<i>Zospeum</i>		" " Clessiniana Haz. . .	0,20
Schmidt Frauent.	0,50-60	" " Baudoniana " . . .	0,10-20
obesum Schm.	0,50-60	" subsp. turricula Held .	0,20-30
reticulatum Hauffen . . .	0,50-60	syriaca Mouss.	0,30-40
<i>Marinula</i>		glabra Müll.	0,10-20
aequalis Lowe	0,20-30	" var. Thiessea Cless. . .	0,20-30
Vulkani Mor.	0,20-30	parvula Haz.	0,10-20
<i>Alexia</i>		taurica Cless.	0,20-30
Balearica Dohrn	0,20-30	truncatula Müll.	0,10
myosotis Drap.	0,10-20	" var. conica Jeffr. . .	0,10-20
" var. ringens	0,10-20		
ciliata Mor.	0,20-30	persica Parr.	0,30-40
<i>Limnaea</i>		natalensis Krauss. . . .	0,30-40
auricularia L.	0,10-20	alkaensis Dall. (defect) .	0,50-60
" var. costellata	0,10-20	Traski Tryon	0,40-50
" " ventricosa Hartm. . .	0,10-20	Pingeli Beck	0,60-80
subsp. ampla "	0,20-30	<i>Amphipeplea</i>	
" tumida Held	0,20-30	glutinosa Müll.	0,20-30
" Monardi Hartm. . . .	0,20-30	<i>Physa</i>	
lagotis Schrank	0,10	hypnorum L.	0,10
" var. acutalis Mor. . .	0,10-30	fontinalis L.	0,10-20
mucronata Held	0,20	acuta Drap.	0,20
" var. rubella Cless. . .	0,20-30	<i>Isidora</i>	
" " rosea Gall.	0,20	contorta Mich.	0,20
		Forskali Ehrenb.	0,20-40

	Mk.		Mk.
Leucosia			
Stiedae Dyb. (Baikal-See)	2—3	mamillare Lm.	0,20-30
Benedicta		ferrugineum Lm.	0,20
fragilis Gerst.	8,—	Pomatias	
baicalensis Gerstf.	2—3	auritus Ziegl.	0,20
Planorbis		cinerascens Rossm.	0,20-30
corneus L.	0,10	gracilis Küst.	0,20-30
„ var. minor	0,20	Gredleri Westl.	0,20-30
„ „ similis Blz.	0,20-30	Henricae Strobel	0,10-20
Dufourei Graells	0,30-40	Hidalgoi Crosse	0,30-40
„ var. medjidjensis Fbs.	0,30-40	Lapurdensis Folin	0,30-40
albus Müll.	0,10	Martensianus v. Möll.	0,20-30
„ var. lemniscatus Hartm.	0,20	obscurus Drap.	0,20
Gredleri Bielz	0,20-30	patulus „	0,10
Rossmassleri Auersw.	0,20-30	septemspiralis Raz.	0,10
limophilus Westl.	0,20	Heydenianus Clessin	0,10-20
glaber Jeffr.	0,10-20	tesselatus Rossm.	0,20-30
piscinarum Bourg.	0,20-30	Assimineae	
hebraeus „	0,30-40	Grayana Leach	10—20
agraulus „	0,20-30	Hydrocena	
nautileus L.	0,10	cattaraensis Ziegl.	0,10-20
cristatus Drap.	0,10	Paludina	
carinatus Müll.	0,10-20	contacta Millet	0,10-20
„ var. dubius	0,20	fasciata Müller	0,10-20
umbilicatus Müll.	0,10	atra Christ et Jan.	0,30-40
„ var. major	0,20	hungarica Haz.	0,40-50
„ „ attica Bourg.	0,20-30	ussuriensis Gerrtl. Amur.	3,—
„ „ graeca Cless.	0,20-30	unicolor Oliv.	0,20-40
vortex L.	0,10	„ var. biangulata	0,30-40
verticulus Troschel	0,20	Cleopatra	
„ var. acies Villa	0,20-30	bulimoides Oliv.	0,20
rotundata Poir.	0,10	„ var. trifasciata	0,20-30
spirorbis L.	0,10	cyclostomoides Küst.	0,40-50
„ var. Hazayanus Cless.	0,20	Bithynia	
septemgyratus Ziegl.	0,20-30	tentaculata L.	0,10
Villae Adami	0,20-30	„ var. bottnica And.	0,20
contortus L.	0,10	„ „ thermalis Haz.	0,20
„ var. dispar. Westerl.	0,20	„ „ producta Mke.	0,20
complanatus L.	0,10-20	ventricosa Gray	0,20
riparius Westl.	0,20	„ var. Troscheli Paasch	0,20
concinus „	0,20-30	rubens Mke.	0,20
nitidus Müll.	0,10	Boissieri Charp.	0,20
Clessini Westerl.	0,10-20	Orsini „	0,10-20
Ancylus		sennariensis Küst.	0,40-50
pileolus Fér.	0,20	Hydrobia	
Jani Bourg.	0,20	stagnalis Bast.	0,10
capuloides Jan.	0,10-20	„ var. Girardoti Pal.	0,10-20
fluviatilis Drap.	0,10	„ „ pictonum „	0,10-20
„ var. simplex Bourgt.	0,10-20	acuta Drap.	0,10-20
lacustris L.	0,10	„ var. Brondeli	0,10-20
abyssinicus Jickeli	0,20-30	achaja Clessin	0,10-20
Cyclostoma		Thiesseae „	0,10-20
sulcatum Drap.	0,20	balthica Nils	0,10
elegans Müll.	0,10	Kutschigi Küst.	0,10-20
costulatum Ziegl.	0,20-30	consociella Frauenf.	0,10-20

	Mk.		Mk.
gagathinella Parr.	0,10-20	Lithoglyphus	
longiscata Bourg.	0,30	naticoides Fér.	0,10
oranensis "	0,10-20	" var. aperta Küst	0,20
Bithynella		" " prasina Kok	0,20
abbreviata Mich.	0,10-20	duminensis Sadl.	0,10
austriaca Frauenf.	0,10	pygmaeus Frauenf.	0,10-20
Charpentieri Roth.	0,10-20	fuscus Pfr.	0,20-30
Dunkeri Frauenf.	0,10	Valvata	
Ferussina Desm.	0,20	piscinalis Müll.	0,10
hungarica Haz.	0,10-20	" var. alpestris Blaun	0,10-20
Heynemanni "	0,10-20	" " antiqua Sow.	0,10-20
lata Frauenf.	0,10-20	" " fluviatilis Col.	0,10-20
opaca Ziegl.	0,10	macrostoma Steenb.	0,10-20
Schmidti Charp.	0,10	cristata Müll.	0,10
" var. prasina Schm.	0,10	tolosana St. Simon	0,20-30
turgidula Pal.	0,10-20	baicalensis Gerstf.	1,1,50
tornensis Haz.	0,10-20	Choanomphalus	
viridis Poir.	0,20-30	Maacki Gerstf. (Baical-See)	1,1,50
pannonica Frauenf.	0,10-20	Schrencki Dyb. "	1,1,20
(Lithoglyphus.)		valvatoides " "	1,1,20
Annicola		Melania	
conovula Parr.	0,10-20	Hollandri Fér.	0,10-20
cretica Cless.	0,20-30	" var. elegans Schm.	0,20-30
Dupotetiana Forb.	0,10	" " afra Ziegl.	0,20-30
Gaillardoti Bourg.	0,20	" " dalmatina	0,10-20
globulus Müll.	0,20-30	parvula Schm.	0,30-40
insubrica Charp.	0,10-20	tuberculata Müll.	0,10-20
luccensis Stab.	0,20-30	Melanopsis	
macrostoma Küst.	0,10-20	acicularis Fér.	0,10-20
marginata West.	0,20-30	" var. Audebardi Prev.	0,10-20
negropontina Cless.	0,10	thermalis Brot.	0,10-20
Salinessii Phil.	0,10-20	Esperi Fér.	0,20-30
seminulum Charp.	0,10-20	buccinoides Oliv.	0,10-20
similis Drap.	0,10-20	praerosa L.	0,10-20
vestita Ben.	0,20	costata Oliv.	0,20-30
Frauenfeldtia		" var. jordanica Roth .	0,20-30
Lachaineri Charp.	0,10	nodosa Fér.	0,60-80
" var. alpestris Villa	0,10-20	Dufourei Fér.	0,10-20
tergestana	0,10-20	" var. Graëllsi Villa . .	0,20-30
Reynesi Dup.	0,20-30	lorcana Guirao	0,20-30
Vitrella		cariosa L.	0,20-30
acicula Held	1,—	Pyrgula	
pellucida Benz	1,—	annulata Mühlf.	0,20
Robiciana Cless.	1,—	Neritina	
vitrea Drap.	1,1,50	nilotica Rve. (africana). .	0,20-30
Belgrandia		Jordani Sow.	0,20
gibba Drap.	0,10-20	" var. turris Mouss. . .	0,20-30
Bourguignati Pal.	0,20-30	" " interposita Mouss.	0,20-30
Delpretiana Paul.	0,20-30	Michoni Bourg.	0,20
varica Pag.	0,20-30	Danubialis Mühlf.	0,10
Emmericia		" var. stragulata Mühlf.	0,10
patula Brum	0,10-20	" " carinata Kok	0,10-20
" var. ventricosa Kutsch.	0,10-20	" " serratilinea Ziegl.	0,10-20
Klecaki Bourg.	0,20-30		

	Mk.		Mk.
<i>fluviatilis</i> L.	0,10	<i>Mutela</i>	
" var. <i>halophila</i> Klett.	0,10	<i>nilotica</i> Fér.	1-2,50
" <i>littoralis</i> L.	0,10	<i>rostrata</i> Rang	1—2
" <i>salonitana</i> L.	0,10	<i>Sphaerium</i>	
" <i>thermalis</i> Boul.	0,10-20	<i>riviculum</i> Leach	0,10-20
" <i>rhodocalpa</i> Jan.	0,20	<i>solidum</i> Norm.	0,20
" <i>dalmatina</i> Ziegl.	0,10-20	<i>corneum</i> L.	0,10
<i>transversalis</i> Ziegl.	0,10	<i>nucleus</i> Stud.	0,10
<i>meridionalis</i> Phil.	0,10-20	<i>Scaldianum</i> Norm.	0,10-20
<i>Velascoi</i> Graëlls	0,10-20	<i>mamillanum</i> Westl.	0,10-20
<i>valentina</i> "	0,20-30	<i>Draparnaldi</i> Cless.	0,10-20
<i>praevoztiana</i> Partsch	0,10	<i>Wildi</i> Cless.	0,20-30
<i>baetica</i> Lm.	0,10-20	<i>pallidum</i> Gray	0,20-30
<i>peloponnesiaca</i> Recluz	0,10-20	<i>lacustris</i> Müll.	0,10
<i>Unio</i>		<i>Steinii</i> Ad. Schm.	0,10-20
<i>littoralis</i> Lm.	0,20-40	<i>hungarica</i> Haz.	0,20-30
" var. <i>elongatus</i> Dup.	0,40-50	<i>Rykholti</i> Norm.	0,20-30
" <i>umbonatus</i> Rossm.	1-1,20	<i>Pisidium</i>	
<i>ater</i> Nils.	0,10-30	<i>amnicum</i> Müll.	0,10
" var. <i>consentaneus</i> Ziegl.	0,20-40	" var. <i>elongatum</i> Baud.	0,10-20
" <i>reniformis</i> Schm.	0,20-40	<i>supinum</i> A. Schm.	0,10
<i>batavus</i> Lm.	0,20	<i>Henslavianum</i> Shepp.	0,10
" var. <i>riverularis</i> Rossm.	0,20-30	<i>milium</i> Held	0,10-20
" <i>amnicus</i> Ziegl.	0,20-30	" var. <i>Normandianum</i> Dup.	0,20
<i>atrovirens</i> Schm.	0,20-40	<i>subtruncatum</i> Malm.	0,10-20
<i>desectus</i> Drouët	0,80-1	<i>pulchellum</i> Jen.	0,20
<i>pictorum</i> L.	0,20-30	<i>globulare</i> Cless.	0,20
<i>longirostris</i> Ziegl.	0,30-40	<i>pallidum</i> Jeff.	0,10
<i>spinelli</i> Villa	0,40-50	<i>nitidum</i> Jen.	0,20
<i>cumanus</i> Kob.	0,80-1	<i>obtusale</i> C. Pfr.	0,10
<i>Moreleti</i> Desh.	0,50-60	" var. <i>personatum</i> Malm.	0,20-30
<i>pallens</i> Parr.	0,50-60	<i>roseum</i> Scholz	0,20-30
<i>tumidus</i> Retz.	0,20-30	<i>intermedium</i> Gass.	0,10-20
" var. <i>saccatus</i> Rossm.	0,40-50	<i>riverulare</i> Cless.	0,10-20
<i>aegyptiacus</i> Call.	0,20-30	<i>fossarinum</i> "	0,10
<i>Margaritana</i>		" var. <i>acuminatum</i>	0,10
<i>margaritifera</i> Retz.	0,80-1,20	" var. <i>curtum</i>	0,10-20
" var. <i>minor</i> Rossm.	0,50-80	<i>Heldreichi</i> Cless.	0,10-20
<i>Anodonta</i>		<i>casertanum</i> Poli.	0,20
<i>cygnea</i> L.	1—3	<i>italicum</i> Cless.	0,10-20
<i>cellensis</i> Schrt.	0,20-1	<i>Corbicula</i>	
<i>rostrata</i> Kock	0,30-50	<i>fluminalis</i> Müll.	0,30-50
<i>piscinalis</i> Nils.	0,20-30	<i>radiata</i> Parr.	0,40
" var. <i>ponderosa</i> C. Pfr.	0,40-80	<i>pusilla</i> Phil.	0,50-1
" <i>anatina</i> L.	0,20-30	<i>Dreissana</i>	
<i>jdrina</i> Spinelli	0,30-40	<i>polymorpha</i> Pall.	0,10-20
<i>submacilenta</i> Serv.	0,40-50		

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren.

Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

LINNÆA

Naturhistorisches Institut

(Dr. A. Müller)

FRANKFURT AM MAIN

7, Elsheimerstrasse 7.

Preis-Verzeichniss

über

Tertiär-Fossilien

des Mainzer und Wiener Beckens sowie von Sternberg
und Tuchořic.

FOSSILES TERTIAIRES. TERTIARY FOSSILS.

Preise in baar in Mark. — 1 Mark = 1 Shilling Engl. = 1.25 Francs.

Ohne Verbindlichkeit. Emballage zum Selbstkostenpreis.

Die mit * bezeichneten Arten werden bei einfacher Preisberechnung in zwei bis drei Exemplaren gegeben.

Einige Arten sind nur in wenigen oder einzelnen Stücken vorhanden.

Mainzer Becken.

1) Weinheim-Alzei.

Gasteropoda.

	Mark.
*Murex conspicuus A. Br.	0,20
Pleurotoma belgica Goldf.	0,30-60
Tritonium flandricum de Kon.	0,30-80
„ foveolatum Sandbgr.	0,40-1
*Buccinum cassidaria Bronn.	0,20
Voluta modesta Mer.	0,50-80
„ Rathieri Héb.	0,50-1
Cassidaria depressa v. Buch.	0,50-4
Natica crassatina Lmk.	0,60-1,50
* „ Nysti d'Orb.	0,20
„ hantoniensis Sow.	0,30-40
Conus symmetricus Desh.	0,20-50
Chenopus tridactylus A. Br.	0,30-40
Cypraea subexcisa A. Br.	0,30-1
Bittium lima Brug.	0,20
Cerithium dentatum Grat.	0,50-1
* „ margaritaceum Brocc. var. moniliformis Grat	0,20
* „ plicatum Brug. var. papil- latum Sandbgr.	0,20
„ Lamarcki Desh.	0,20-30

	Mark.
*Cerithium laevisimum Schloth.	0,20-40
* „ subvaricosum A. Br.	0,20-40
* „ dissitum Desh.	0,20-30
Vermetus Sandbergeri Bttgr.	0,20-40
Xenophora Lyelliana Bosq.	0,20-40
Trochus rhenanus Mer.	0,20
* „ sexangularis Sandbgr.	0,20-50
„ margaritula Mer.	0,20-30
*Dentalium Kickxi Nyst.	0,20
„ Sandbergeri Nyst.	0,20
Tornatella Nysti Duch.	0,30-40
Bulla Laurenti Bosq.	0,20

Acephala.

Panopaea Heberti Bosq.	1,50
Corbula gibba Oliv.	0,20
*Corbulomya Henckelusiana Nyst.	0,30-60
„ elongata Sandbgr.	0,50
Thracia elongata Sandbgr.	1,-1,50
Tellina Nysti Desh.	0,50-1
*Cytherea incrassata Sow. var. lunulata Sandbgr.	0,20-50
* „ splendida Mer.	0,20-50
„ „ var. postera Meyer	0,50
Cyprina rotundata A. Br.	1—4
*Cyrena semistriata Desh.	0,20

	Mark.
* <i>Cardium cingulatum</i> Goldf.	0,20-60
" <i>Ranlini</i> Desh.	0,60
<i>Isocardia subtransversa</i> d'Orb.	0,30-1
* <i>Chama exogyra</i> Br.	0,30-50
* <i>Lucina tenuistria</i> Héb.	0,20-40
" <i>Heberti</i> Desh.	0,50
" <i>squamosa</i> Lmk.	0,30
<i>Astarte plicata</i> Mer	0,40
* <i>Crassatella Bronni</i> Mer	0,20-30
* <i>Cardita tuberculata</i> Münst.	0,20-30
* " <i>paucicostata</i> Sandbgr.	0,30
* <i>Modiola micans</i> Br.	0,50-1
<i>Perna Sandbergeri</i> Desh.	0,40-1,50
<i>Arca Sandbergeri</i> Desh.	0,30-1
* <i>Pectunculus obovatus</i> Luck.	0,20-50
* " <i>angusticostatus</i> Lmk.	0,20-50
<i>Limopsis Goldfussi</i> Nyst.	0,60
* <i>Nucula Lyelliana</i> Bosq.	0,20-40
* <i>Pecten pictus</i> Münst.	0,20-40
" <i>compositus</i> Goldf.	0,60
<i>Ostrea cyathula</i> Lmk.	0,20-30

Diversa.

<i>Cacharodon angustidens</i> Agass. Zahn	3—5
* <i>Lamna cuspidata</i> Agass. 6 Zähne verschied. Stellung	1,—
* " <i>contortidens</i> Agass. 6 Zähne verschied. Stellung	1,25
<i>Notidanus primigenius</i> Agass. Zahn	0,50-1
<i>Balanus stellaris</i> Bronn.	0,50
* <i>Balanophyllia sinuata</i> Reuss.	0,20-30

2) Hochheim-Flörsheim.

Gasteropoda.

<i>Stenomphalus cancellatus</i> Thomae	0,20-50
* <i>Cerithium plicatum</i> Brug. var. <i>multinodosum</i> A. Br.	0,20
" <i>plicatum</i> var. <i>pustulatum</i> A. Br.	0,30
* <i>Hydrobia aturensis</i> Noul.	0,20
* <i>Neritina pachyderma</i> Sandbgr.	0,20-50
<i>Oleacina Sandbergeri</i> Thomae	0,30-60
<i>Cochlicopa lubricella</i> A. Br.	0,30-60
<i>Trochonanina imbricata</i> A. Br.	1—2
* <i>Archaeozonites subverticillus</i> Sandbgr.	0,50-80
<i>Hyalinia impressa</i> Sandbgr.	1,—
<i>Trichia apicalis</i> Reuss.	1,25-2,50
<i>Omphalosagda Goldfussi</i> Thomae	0,30-50
<i>Strobilus uniplicatus</i> A. Br.	0,50
<i>Helix pomiformis</i> A. Br.	2—6
" <i>Ramondi</i> Brongn.	2—3
" <i>Rahti</i> A. Br.	1—3
" <i>stenotrypta</i> A. Br.	0,50-2
" <i>lepidotrichia</i> A. Br.	0,50-2
" <i>rugulosa</i> G. v. Mart.	0,20-40
* " <i>oxystoma</i> Thomae	0,30-50

	Mark.
* <i>Helix hortulana</i> Thomae	0,20-30
* " <i>deflexa</i> A. Br.	0,20
* " <i>osculum</i> Thomae	0,30-40
" <i>phacodes</i> Thomae	1—2
" <i>involuta</i> Thomae	1—2
<i>Patula disculus</i> A. Br.	1,—
" <i>euglypha</i> Reuss	1,—
<i>Buliminus gracilis</i> Thomae	1—2
* <i>Pupa subvariabilis</i> Sandbgr.	0,40-60
* " <i>subtilissima</i> A. Br.	0,50
* " <i>suturalis</i> A. Br.	0,50
" <i>didymodus</i> A. Br.	0,50
* " <i>quadrigranata</i> A. Br.	0,50
" <i>impressa</i> Sandbgr.	0,50
* " <i>cryptodus</i> A. Br.	0,50
* <i>Cyclostoma antiquum</i> Brongn.	0,20-30
* <i>Strophostoma tricarinatum</i> A. Br.	0,20-30
" " var. <i>minor</i>	0,50
* <i>Pomatias labellum</i> Thomae	0,40-60

Acephala.

<i>Cytherea incrassata</i> Sow. var.	0,40-50
<i>Cyrena semistriata</i> Desh.	0,30-50
<i>Mytilus socialis</i> A. Br.	0,20-30
<i>Modiola angusta</i> A. Br.	0,50

Wiener Becken.

Gasteropoda.

<i>Murex spinicosta</i> Bronn	0,30-1
" <i>Sedgwicki</i> Michti.	0,50-2
" <i>aquitaneus</i> Grat	0,50-2
" <i>Partschi</i> Hoern	0,40-1,20
" <i>Swainsoni</i> Michti	1—2
<i>Trophon goniostomus</i> Partsch	1—2
<i>Typhis fistulosus</i> Brocc.	0,30-1
* <i>Fusus bilineatus</i> Parsch	0,30
" <i>longirostris</i> Brocc.	0,50-1,50
" <i>crispus</i> Bors.	0,50-1,50
" <i>semirugosus</i> Bell et Michti	0,50-80
" <i>Valenciennesi</i> Grat.	0,50-1
" <i>rostratus</i> Oliv.	2,—
<i>Pyrula granifera</i> Michti	3,—
<i>Euthria cornea</i> L. var.	1,—
<i>Pleurotoma asperulata</i> Lmk.	0,30-80
" <i>cataphracta</i> Brocc.	0,30-70
* " <i>turricula</i> Brocc.	0,20-30
" <i>crispata</i> Jan.	0,50
" <i>Sandleri</i> Ptsch.	0,80
" <i>harpula</i> Brocc.	0,80
" <i>plicatella</i> Jan.	0,80
* " <i>Lamarecki</i> Bell.	0,20-60
" <i>bracteata</i> Brocc.	0,80-1
* " <i>monilis</i> Brocc.	0,20-40
" <i>rotata</i> Brocc.	0,20-50
* " <i>obeliscus</i> Desm.	0,20-30
* " <i>dimidiata</i> Brocc.	0,20-30
* " <i>coronata</i> Mstr.	0,20-30

	Mark.
<i>Pleurotoma semimarginata</i> Lmk.	0,30-1
" <i>spiralis</i> Serr.	0,30-40
" <i>spinescens</i> Partsch	0,50-80
" <i>Coquandi</i> Bell.	0,30-50
" <i>trifasciata</i> Hoern.	0,80
" <i>Schreibersi</i> Hoern.	0,80
<i>Drillia pustulata</i> Brocc.	1,—
<i>Tritonium Tarbellianum</i> Grat.	0,50-1
<i>Ranella marginata</i> Brongn.	0,50
<i>Phos Hoernesii</i> Semp.	2,—
* <i>Nassa badensis</i> Partsch.	0,20
" <i>laevis</i> Brus.	0,60
" <i>restitutiana</i> Font.	0,40
" <i>vindobonensis</i> Ch. Meyer	0,60
" <i>serraticosta</i> Bronn.	0,30-40
" <i>signata</i> Patsch.	0,60
* <i>Ancillaria obsoleta</i> Brocc.	0,20-40
" <i>pusilla</i> Fuchs	0,50
" <i>glandiformis</i> Lmk.	0,20-40
* <i>Mitra scrobiculata</i> Brocc.	0,20-40
" <i>Bellardii</i> Hoern.	0,30-80
" <i>cupressina</i> Brocc.	0,30-60
<i>Columbella subulata</i> Brocc.	0,20-30
" <i>fallax</i> Hoern.	0,20
<i>Cassid. saburon</i> Lmk.	0,20-50
<i>Cassidaria echinophora</i> Lmk. var.	1,—
<i>Natica Alderi</i> Forbes	0,20-40
" <i>raropunctata</i> Sassi	0,20-30
" <i>redempta</i> Michti	0,30-50
" <i>millepunctata</i> Lmk.	0,20-30
" <i>helicina</i> Brocc.	0,20
<i>Scalaria lamellosa</i> Brocc.	3,—
" <i>lanceolata</i> Brocc.	2—3
<i>Terebra acuminata</i> Borson.	0,20-40
" <i>costellata</i> Sow.	1—2
* <i>Rinocula buccinea</i> Desh.	0,20
<i>Eulima subulata</i> Danovan.	0,60
<i>Niso eburnea</i> Risso	0,50
<i>Solarium carocollatum</i> Lmk.	1—2
* <i>Conus Dujardini</i> Desh.	0,20-30
" <i>antediluvianus</i> Brug.	0,40
" <i>Daciae</i> Hoern.	3—7
" <i>extensus</i> Partsch	2—3
" <i>Puschi</i> Michti	2—3
" <i>avellana</i> Lm.	2—3
" <i>Noae</i> Brocc.	6—7
<i>Aporrhais alatus</i> Eichw.	0,20
<i>Cancellaria lyrata</i> Brocc.	0,30-80
" <i>spinifera</i> Grat.	0,20-60
" <i>canaliculata</i> Horn.	1,50
<i>Cerithium doliolum</i> Brocc.	0,30-50
" <i>minutum</i> Serres	0,50
<i>Bittium spina</i> Partsch	0,30-40
<i>Potamides lignitarum</i> Eichw.	0,20-30
<i>Turritella Rieperi</i> Partsch	0,30
" <i>bicarinata</i> Eichw.	0,20-30
" <i>Archimedis</i> Brogn.	0,20
" <i>subangulata</i> Brocc.	0,20
<i>Dentalium pseudoentalis</i> Lmk.	0,30

	Mark.
<i>Dentalium Bouei</i> Desh.	0,20-40
" <i>Michelottii</i> Hörn.	0,50
* " <i>badense</i> Partsch	0,20

Acephala.

<i>Lucina glubulosa</i> Desh. Prachtst.	6,—
<i>Area diluvii</i> Lmk.	0,20-30
<i>Pinna Brocchii</i> d'Orb.	0,50-1
<i>Pecten cristatus</i> Bronn.	0,20-40
" <i>spinulosus</i> Münt.	0,40-60

Polypi.

<i>Turbinolia spec.?</i>	0,20
--------------------------	------

Sternberg

(Ob. Oligocaen.)

<i>Murex Deshayesi</i> Nyst.	0,50-3,50
<i>Tiphys Schlottheimi</i> Beyer.	0,30-60
" <i>pungens</i> Sol.	1,—
<i>Fusus Waeli</i> Nyst.	0,40-80
" <i>scrobiculatus</i> Boll.	1,—
" <i>elongatus</i> Nyst.	0,20-60
" <i>elegantulus</i> Phil.	0,50-3
<i>Pisanella subgranulata</i> v. Schloth.	0,40-2
<i>Pleurotoma terebralis</i> Lam.	0,80-1,20
* " <i>Selysi</i> de Kon	0,30-60
" <i>Morreni</i> Nyst.	0,30-60
* " <i>obeliscus</i> Des Moul.	0,20-50
* " <i>regularis</i> de Kon	0,30-50
" <i>denticula</i> Bast	0,40-80
" <i>flexuosa</i> v. Münt.	0,40-60
" <i>flexuosa</i> v. Münt. var. <i>plano-</i> <i>spira</i> Speyer	0,30-40
" <i>obliquinodosa</i> Koch	0,50-60
* " <i>laticlavata</i> Beyr.	0,20-40
" <i>turbida</i> Sol.	0,20-40
" <i>coronata</i> var. <i>trifasciata</i>	0,30-60
<i>Defrancia Naumanni</i> Speyer	0,50-80
<i>Mangilia Ruppardi</i> v. Koen.	0,50-80
" <i>Koeneni</i> Sp.	0,50-80
<i>Tritonium flandricum</i> de Kon	0,20-50
<i>Cominella Bolli</i> Beyr.	0,20-40
* <i>Nassa pygmaea</i> v. Schloth. var. <i>bispiralis</i>	0,20-40
" <i>Schlottheimi</i> Beyr.	0,30
<i>Ancillaria Karsteni</i> Koch	0,50-80
<i>Mitra Philippi</i> Beyr.	0,40-60
" <i>semimarginata</i> Beyr.	0,40-50
" <i>hastata</i> Karsten	0,50-1
* <i>Cassid. megalopolitana</i> Beyr.	0,20-60
<i>Ficula concinna</i> Beyr.	0,30-60
" <i>condita</i> Brong.	1,1-50
<i>Natica Nysti</i> d'Orb.	0,20-30
* " var. <i>elevata</i>	0,20-30
* " <i>dilatata</i> Phil.	0,30-50
<i>Terebra cincta</i> Schloth.	0,40-80
* <i>Ringicula striata</i> Phil.	0,20-30
" <i>Grateloupi</i> d'Orb.	0,20-40
<i>Niso minor</i> Phil.	0,30-60

	Mark.		Mark.
Chenopus speciosus v. Schloth.	0,50-1	Tuchořic	
Cancellaria evulsa Sol.	0,30-1,20	(Unt. Miocaen.)	
" subangulosa Wood.	0,40-60	Glandina inflata Reuss	3,—
Tornatella Philippii Koch.	0,20-30	Oleacina producta Reuss	1-1,50
" punctata-striatus Phil.	0,30-50	" Sandbergeri Thomae	0,30-50
Tornatina elongata Sow.	0,40-60	Zonites algoirides Reuss	1-2
Bulla subperforata Boll.	0,50-80	Hyalinia denudata Reuss	0,50-80
" utriculus Br.	0,30-40	Helix robusta Reuss	0,80-1,50
" lineata Phil.	0,50-60	" bohémica Bttgr.	0,50-80
" acuminata Brug.	0,20-30	" apicalis Reuss	0,50-80
* " Laurenti Bosq.	0,20-30	" obtusecarinata Sandbgr.	1-1,50
Scaphander lignarius L.	0,40-60	" Zippei Reuss	0,50-1
Siliqua oblonga v. Koenen	0,80	" homalospira Reuss	1-1,50
*Corbula gibba Ol.	0,20-30	" osculum Thomae	0,20-30
*Mactra trinacria Semp.	0,20-40	" devexa Reuss	0,40-60
Syndosmya Bosqueti Semp.	0,80	" Petersi Reuss	2-3
*Cytherea Beyrichi Semp.	0,30-50	Buliminus complanatus Reuss	1-2
*Cardium comatulum Bron.	0,30-60	Pupa lamellidens Sandbgr.	0,50
" Kochi Semp.	0,40-60	" intrusa Slavik	1-2
Lucina Schloenbachi v. Koen.	0,80-1	" callosa Reuss	0,30-40
Cardita tuberculata v. Münst.	0,20-30	Pupilla raricosta Slavik	0,30-50
*Arca Speyeri Semp.	0,50-80	Clausilia tenuisculpta Reuss	3-5
* " pretiosa Desh.	0,20-30	" polyodon Reuss	4-7,50
" appendiculata Sow.	0,30-60	" vulgata Reuss	2,—
" gemina Semp.	0,50-60	Carychium nanum Sandbgr.	0,30
*Nucula compta Goldf.	0,20-40	Limnaea subpalustris Thomae	1,50
* " peregrina Desh.	0,30-60	Planorbis declivis Al. Br.	0,20
*Leda glaberrima v. Münst.	0,40-80	" solidus Reuss	0,50-80
" gracilis Desh.	0,20-50		
*Yoldia pygmaea v. Münst.	0,20-30		
*Pecten Münsteri Goldf.	0,30-50		

Auch liefern wir ganze Sammlungen, die Hauptformen der verschiedenen Gebiete enthaltend, und zwar:

Mainzer Becken.

	Mark.
50 Species in circa 120 Exemplaren	20,00
75 " " " 150 "	35,00

Wiener Becken.

	Mark.
30 Species in circa 50 Exemplaren	10,00
45 " " " 70 "	18,00

Sternberg.

30 Species in circa 60 Exemplaren	12,00
---	-------

Sollten Sammlungen inclusive Kasten, Schächtelchen und Gläser gewünscht werden, so lassen wir letztere zum Selbstkostenpreise ab.

Eventuelle Wünsche auf Reste fossiler Säugethiere etc. des Mainzer Beckens wolle man uns mittheilen.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

	Mk.		Mk.
Melampus.			
Adamsianus Pfr. N.-Caledon.	0,20	giganteus Gray Columbia	3,—
affinis Desh. Dahlak	0,20-30	Hunanus Grdl. Hunan	1-1,20
Australis Quoy Australien	0,30-40	Jamaicens Chem. Jamaica	0,50-60
caffer Krss. Sulu-Ins	0,10-20	Inca Orb. Brasilien	1,—
castaneus Mühlf. Sandw.-I.	0,20-30	latecostatus Kob. Philippin.	0,50-60
cingulatus Pfr. Cuba	0,20	Lowianus Pfr. Labuan	0,60
coffeus L. Antillen	0,20-30	Popayannus Lea N.-Granada	0,60-80
exesus Sossies N.-Caledon.	0,30	seminudus Ads. Jamaica	0,50-60
fasciatus Desh. Sulu-Insel	0,20-30	Cyclosurus.	
flavus Gmel. Antillen	0,30-40	Mariei Morl. I. Mayotte	5—8
fuscus Desh. Samoa-Ins.	0,20	Pterocyclos.	
lutens Quoy Gesellsch.-Ins.	0,20-30	brevis Mart. Philippinen	2,—
lividus Desh. Mauritius	0,20-30	Alycaeus.	
Massauensis Ehrbg. Massaua	0,10-30	pyramidalis Bens. Salanga	1,—
Montrouzieri Sow. N.-Caled.	0,20-30	strangulatus Hutton O.-Ind.	0,30
olivaceus Carp. Californien	0,20	Diplomatina.	
pusillus Gm. Antillen	0,20-30	Huttoni Pfr. var. occidentale	
Siamensis Mart. Siam	0,20-30	Trinidad	0,10-20
strictus Cass. N.-Caledon.	0,30-40	pachycheilus Born Dargeling	0,20-30
tabagensis Ads. Panama	0,20-30	Craspedopoma.	
variabilis Gass. N.-Caledon.	0,20-30	lucidum Lowe Madeira	0,20-30
zonatus Mühlf. Philippinen	0,20-30	Cyclophorus.	
Pedipes.			
afer Gm. Afric. occid.	0,20-30	aquila Sow. Singapore	1—2
affinis Fér. Mauritius	0,40	Apiæ Reclz. Samoa-Insel	0,40
Pythia.			
leopardus Rve. N.-Caledon.	0,50-60	aurantiacus Sch. Salanga	3,—
pantherina Ads. Philippin.	0,50-60	Borneensis Mtclf. Borneo	1,50-2,50
" var. minor "	0,40	canaliferus Sow. I. Luzon	0,80
plicata Fér. Bengalen	0,60-1	Cantori Bens. Salanga	0,60-80
pollex Hinds Viti-Insel	0,60-80	eximius, Mouss. Sumatra	7—10
trigona Troschel Philipp.	0,30-50	exaltatus Pfr. Honkong	0,80
Plecotrema.			
rapax Dohrn M. rubrum.	0,40	fulguratus " Pegu	1-1,20
Cassidula.			
angulifera Pet. Australien	1,—	Indicus " Ind. orient.	1—2
inflammata Bolten		patens Blfd. Pegu	2-2,50
(= felis Lm.) Ostindien	0,50-80	perdix Brod. et Sow. Sumatr.	1,20
Kraussi Küst. Mauritius	0,30-40	planorbis Blfd. O.-Indien	0,60
labrella Desh. M. rubr.	0,20-30	punctatus Sow. Ceylon	0,80
mustellina " N.-Zealand	0,30-50	raripilus Morl. Mayotte	0,50
nucleus Martyn Otaheiti	0,20-40	semisulcatus Sow. Malacca	1,20
sulculosa Mss. Viti-Insel	0,20-30	trigrinus Sow. Samar.	1,50-2
Auriculus.			
auris-Judae L. Java	1—2	Upolensis Mss. Upolu	0,30-50
auris-Malchi Müll. Moluccen	3,—	validus Sow. Philippinen	2,50
auris-Midae L. Java	1—3	Wahlbergi Bens. Cap.	0,40-50
elongatus Parr. Sandw.-I.	0,30-40	Woodianus Lea I. Luzon	1,—
Gangeticus Bens. Calcutta	0,30-40	Leptopoma.	
semisculptus Ads. Viti-Insel	0,30-50	acutimarginatum Sow. Samar	1,20
Cyclotus.			
auriculatus Kob. Philippin.		Dohrni Ads. et Ang. N.-Irl.	0,50
campanulatus Mart. Hunan	1-1,50	distinguendum Dohrn Philip.	0,50
Caroli Kob. I. Bohol	0,50-60	sericatum Pfr. Borneo	0,40
Dysoni Pfr. Mexico	0,50-1	vitreum Less. Salanga	0,30-40
		Megalommastoma.	
		altum Sow. I. Negros	1,50-2
		alutaceum Mke. Cuba	1—2
		Antillarum Sow. I. Tortola	0,40-50
		auriculatum D'Orb. Cuba	1-1,50
		cylindraceum Chem. Portor.	1—2
		funiculatum Bens. Dargeling	1,50-2

		Mk.		Mk.
Gundlachi Pfr.	Cuba	2,—	bicarinatus "	Madagasc. 1,20
leonium "	"	2,—	carinatus Born	Mauritius 1—2
Lowei Ads.	Borneo	1,—	Chevalieri Ads.	Jamaica 0,20-30
Mani Poey	Cuba	1,50	campanulatus Pfr.	Madagasc. 1-1,50
Orbigny Pfr.	Haiti	1,50-2	Cuvierianus Pet.	" 4—5
procer Poey	Cuba	1,50-2	filostratus Sow.	Madagasc. 0,80-1
seminudum Poey	"	1,50-2	Humphreysianus Pfr.	Jamaic. 0,20-30
sectilabrum Gould	Labuan	1-1,50	Jayanus Ads.	" 0,10-20
ungula Poey	Cuba	1,50-2	levis Pfr.	Salomon-Ins. 0,20-30
Tomocyclus.			Lachaineri Gdlch.	Cuba 0,40
simularum Mor.	Guatemala	2—3	Newcombianus Ads.	St. Jan 0,30-40
Cataulius.			Rollei Weinl.	Haiti 0,30-40
Austenianus Bens.	Ceylon	2,—	solidulum Gdlch.	Cuba 0,30
decorus "	"	2,50-3	semilabre Lm.	Haiti 0,50-60
haemastomus Pfr.	"	4—5	tractum Gdlch.	Cuba 0,40-60
pyramidatus "	"	2,—	tricarinatus Müll.	Mauritius 0,80
Templemanni "	"	3,—	unicolor Pfr.	" 0,60-1
Thweitesi "	"	2,—	" v. sulcatus "	" 0,50-1
Pupinella.			zonulatus Fér.	Madagascar 1,20
rufa Sow.	Japan	0,30-40	Tudora.	
Pupina.			Augustae Ads.	Jamaica 0,30
Ambigua Semp.	Luzon	0,30	columna Wood	" 0,40-60
bilinguis Pfr.	C. York	0,30-40	megachila Pot. et M.	Curacao 0,40-50
complanata Psl.	Marshall-I.	0,30	versicolor Pfr.	" 0,40-50
Cumingiana Pfr.	N.-Hebrid.	0,20-30	Cistula.	
ephippium Grdlr.	Hunan	0,50-60	ruflabris Beck.	S. Croix 0,10-20
fusca Gray	Luzon	0,30	Chondropoma.	
grandis "	Palaos-Insel	0,30	limbiferum Mke.	Haiti 0,40-60
meridionalis Pfr.	P. Dennison	0,30	marginalbum Gdlch.	Cuba 0,50-60
polita Ads.	Salomon-Ins.	0,30-40	Newcombianum Pfr.	St. Thom 0,20-30
pulchella Möll.	Hunan	0,40	obesum Mke.	Cuba 0,30-50
Pfeifferi Dohrn.	Lizard-Ins.	0,30-40	pictum Pfr.	" 0,60-80
puncticola Crosse	Austral.	0,30	pudicum Orb.	" 0,60
robusta Cox	"	0,30-40	revinctum Poey	" 0,50-60
Choanopoma.			sacrum "	" 0,80-1
fimbriatulum Sow.	Jamaica	0,30-50	Realia.	
hystrix Wright	Cuba	1—3	Cheneyi Dohrn	Peleliu-Ins. 0,20-30
scabriculum Sow.	Jamaica	0,60-80	manpiensis Grt.	Manpili-Ins. 0,20-30
Yaterascense Pfr.	Cuba	0,60	Blandiella.	
Ctenopoma.			reclusa Guppy	Trinidad 0,30
semicoronatum Gdlch.	Cuba	0,40-60	Trochatella.	
Adamsiella.			pulchella Gray	Jamaica 0,10-20
Grayana Pfr.	Jamaica	0,50-60	regina Mor.	Cuba 0,80-1,50
variabilis Ads.	"	0,30-40	Tankervillei Gray	" 0,80-1
Otopoma.			Lucidella.	
cuilini Pet.	Zanzibar	2,—	aureola Fér.	Jamaica 0,10-20
Listeri Cray	Mauritius	0,30-40	" v. granulosa Ads.	" 0,10-20
Cyclostomus.			Alcadia.	
albus Sow.	Jamaica	0,40	Brownei Gray	Jamaica 0,40
articulatus Gray.	I. Rodrg.	1,—	" v. alba "	" 0,30
balteatus Say	Madagascar	0,80-1,20	Hollandri Pfr.	" 0,30
Barclayanus Pfr.	Mauritius	0,80-1,20	major Gray	" 0,30-40
Banksianus Sow.	Jamaica	0,30-40	palliatu Ads.	" 0,20-30

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren.
Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

	Mk.		Mk.
<i>Nanina.</i>			
atrofusca Alb. Borneo	2,—	Dattaensis Semp. Philipp.	2,—
bistrialis Bk. Hymalaya	1-1,20	Dryas Brod. "	1,—
Brookei Ads. et Rve. Borneo	7—9	electrina Rve. "	2,—
Cambojiensis Rve. Siam	12—20	Faunus Brod. I. Zebu	2,—
citrina L. Ceram	0,60-1	fulgetrum Brod. Philipp.	2—3
Decrespiguyi Higg. I. Labuan	2—3	Iloconensis Sow. "	0,60-80
densa Ads. et Rve. Philipp.	2,—	Leai Pfr. "	1,—
distincta Pfr. Cochinchina	1,50-2	leucophaea Sow. I. Luzon	1,—
glauca Bens. Himalaya	0,30-40	var. concinna "	1,20
Humphreysiana Lea. Philipp.	0,60-1	lignaria Pfr. I. Mindoro	2,—
inversicolor Fér. Mauritius	0,40-1	luzonica Sow. Philippinen	2,—
leucostyla Pfr. "	0,50-60	matruelis Sow. "	1,80
Nouletii Lequill. Viti Ins.	0,50-60	metaformis Fér. "	1,50-1,80
ovum Val. Philippinen	2,50-3	Mindoroensis Brod. I. Mind.	1,50-2
porphyrea Pfr. "	1,50-2	mirabilis Fér. I. Luzon	1,50-2
rareguttata Mss. Timor	1,50	monticola Sow. "	1,50-2
regalis Bens. Borneo	1,50-2	Najas Pfr. Celebes	0,80-1
resplendens Phil. Salanga	0,60-1,20	nimbosa Brd. Philippinen	2—3
semiglobosa Pfr. Philipp.	1,50	uympha Pfr. "	1,50-2
semigranosa Rve. Labuan	2,—	opalina Sow. I. Luzon	2,—
Sophiae Gask. Lord Howes I.	1—2	Pfeifferiana Brod. Philipp.	2—3
Sowerbyana Pfr. Philipp.	2-2,50	Polillensis Pfr. I. Polillo	1-1,50
striata Gray Salanga	0,40-50	polychroa Sow. "	1,50
trifasciata Chm. Bombay	1-1,20	pulcherrima Sow. Philipp.	0,60
Uranus Pfr. Polillo Ins.	5	rufogaster Less. "	3—4
vitrinoides Desh. Bengalen	0,60-80	speciosa Jay "	1,50-2,50
Weinkauffiana Crosse		stabilis Sow. "	1,—
		Valenciennesii Eyd. "	1,20
		(Helix)	
Wilsoni Semp. Palaos Ins.	0,20-30	virgo Brod. (Helix) "	1,20-1,50
<i>Trochonanina.</i>			
Jenynsi Pfr. Zanzibar	0,10-20	zonifera Sow. "	1,20-2
Mozambicensis Pfr. "	0,20-30	zebuensis Brod. (Hel.) "	2,—
<i>Macrocyclus.</i>			
Vancouverensis Lea Calif.	0,50-60	<i>Bulimus.</i>	
<i>Trochomorpha.</i>			
apia Hombr. Hebriden	0,40	albizonatus Rve. Ceylon	1,50-2
Belmorei Cox Salomon Ins.	0,60-80	Alexander Cross. N. Caled.	2,50-3,50
castra Bens. Salanga	0,60-80	auris-leporis Brug. Brasil.	0,60-80
entomostoma Hombr. Carol.	0,60-1	bilabiatus Brod. Bahia	3,50
Lomonti Braz. n. sp. Guinea	0,60-80	Blainvillaeus Pfeiffer	
Metcalfi Pfr. Philippinen	0,40-60		Venezuela
nigritella Pfr. Carolin.	0,20-40	Cantagallanus Rang. Brasil.	2,—
retangula Pfr. Ins. Marq.	0,30	Ceylonicus Rve. Ceylon	2,—
sculpticarinata v. Mart. Sal.	1-1,50	Cleryi Pet. Salom. Ins.	4-4,50
Swainsoni Pfr. Raiatea.	0,40	coloratus Nyst. Venezuela	2,—
trochiformis Fér. Tahiti	0,30	comes Pfr. Cambodja	2,—
troilus Gould Samoa Ins.	0,40-50	contrarius Müll. I. Timor	0,80
<i>Cochlostyla.</i>			
annulata Sow. Philippinen	0,60-80	var. furcillatus Mss. Borneo	1,50-2
aspera Grt. "	3,—	var. subconcolor I. Timor	0,50-60
balteata Sow. "	0,50-80	crenulatus Pfr. Chile	0,60
Boholensis Brod. "	1,20	dentatus Wood Uruguay	0,60-80
calobapta Jon. I. Mindoro	1,20-2	distortus Brüg. Venezuela	1,—
chrysallidiformis Sow. Phil.	2,—	exesus Spix Brasilien	1,50-2
cinnus Sow. "	0,40-60	eximius Alb. N. Calodon.	4—6
		fibratus Martyn "	2-2,50
		Founaki Hombr. Salom. I.	1,80
		fulguratus Jay Viti Ins.	1,—
		fusiformis Rang Philippinen	1,20-1,80
		Grayanus Pfr. Brasilien	3,50

	Mk.		Mk.
illheocala Moric. Bahia	2—3	pupiformis Brod. Chile	0,60
interruptus Müll. Moluccen	0,50-1	rhodostomus Gray Swan River	1,—
inversus Müll. Singapore	1-1,20	saccatus Pfr. Peru	0,50-1,20
luzonica Sow. Philippinen	1,50-2	Sachsei Alb. Columb.	1,—
Mac. Farlandi Cox Salom. I.	2,50-3	scalariformis Brod. Peru	0,40-50
maculiferus Sow. Mindan.	2-2,50	sepulchralis Poey Havan.	0,40
magnificus Grt. Brasilien	2,—	sporadicus Orb. S. America	1,—
malleatus Jay Viti Ins.	1,20	terebralis Pfr. Peru	0,60
melanostomus Sw. Brasilien.	1-1,50	violaceus Mss. Bolivia	1,20
mitocheilus Rve. Salom. I.	1—2	virgulatus Fér. St. Thomas	0,30-40
navicula Wag. Bahia	2,—	var. caribaeorum Lm. Antill.	0,30-40
obliquus Pfr. „	0,50-80	var. Kammereri St. Croix	0,40
oblongus Müll. S. Amerika	0,50-1,50	vittatus Spix Brasilien	0,40-1
pachychilus Pfr. Chile	1,—	Porphyrobaphe.	
Pancheri Crosse N. Caled.	1,50	Fungainrinoi Hid. Ecuador	3-3,50
perversus L. Singapore	0,50-80	istomus Sow. Chile	1,50-2,50
piperitus Sow. var. Peru	0,60	Saturnus Pfr. Peru	4—5
planidens Müll. Brasilien	3,50	Orthalicus.	
porcellanus Rve. Java	0,60-80	fasciatus Müll. Cuba	0,80-1
pudicus Müll. Brasilien	1—2	gallina-Sultana Chm. Guyana	1—3
rosaceus King Chile	0,80-1,50	phlogerus D'Orb. Bolivia	1—2
Sanchristovalensis Cox		pulchellus Spix Brasilien	0,80-1
Salom. Ins.	2,—	zebra v. undatus Brug. Trinidad.	0,20-40
Seemanni Dhrn. Viti Ins.	4,—	var. albus Venezuela	0,40
Shongii Less. N. Seeland	3,—	Liguus.	
signatus Spix Bahia	1,20	Blainianus Poey Cuba	1,—
sinistralis Rve. Java	1,—	virgineus L. „	0,50-1
Strangei Pfr. Eddyst. Ins.	0,80-1	Perideris.	
Wagneri Pfr. Brasilien	1-2,50	alabaster Rang. I. Princip.	0,80
Bulimulus.		Martense Smith defect!	
albus Sow Chile	0,30	Tanganjka See	2,50
alternans Beck Panama	0,60	Limicolaria.	
Altoperuvianus Rve. Peru	1,50-2	Adasoni Pfr. Senegal	1,50-2,50
Anguillensis Pfr. Anguilla	0,60	flammea Müll. W. Afrika	1,20
apodemetes Orb. Bolivia	0,50	Pyrrha Alb. Afric. occid.	2,—
Capueira Spix Brasilien	1,50	tenebrica Rve. W. Afrika	0,80
Catlowiae Pfr. Gallop.	1,—	turbinata „ Liberia	1-1,50
dealbatus Say Alabama	0,40	Achatina.	
derelictus Brod. Bolivia	0,40	balteata Rve. Gambia	1,20
exilis Gm. Westind.	0,10-20	cebra South Africa	0,60
var. Guadaloupensis Gdl.		fulica Fér. Mauritius	0,40-1
Guadeloupe	0,20-30	inornata Pfr. Ceylon	0,80
Farrisii Pfr. Peru	1,50-2	marginata Sw. Guinea	1,20-1,50
fraterculus Fér. Westind.	0,50	panthera Fér. Madagascar	0,40
Hartwegi Pfr. Ecuador	2,50	reticulata Pfr. Zanzibar	4,50
Jonasi Pfr. Br. Honduras	0,80-1	semisculpta Pfr. Bengalen	0,80-1
Knorri „ Venezuela	2,—	suturalis Gabon	1,20
Laurentii Sow. Peru	0,30-40	Pseudachatina.	
Lobbii Rve. „	0,30	Downesii Gray Fernando	5,—
Mariae Alb. Mexico	0,80	Wrighti Sow. Old. Calabar	4-4,50
nigrofasciatus Pfr. N. Granada	0,60	Carelia.	
nux Brod. Gallop.	0,80-1	Cumingiana Pfr. Sandw. I.	3,00
Nystianus Pfr. Quito	1,20	Columna.	
Onager Beck Brasilien	0,80-1	flammea Martyn I. Princip.	6,—
Peruvianus Brug. Peru	0,80-1	Eucalodium Blandianum	
Philippii Pfr. „	0,50	Cross. et F. Mexico	6,—
Proteus Brod. „	1,—		

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren
 Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut
 Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

No. 54.

1884.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

Meeresconchylien

aus dem palæaretischen Faunengebiete.

Erste Abtheilung.

Die genaueren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.

	Mk.		Mk.
Ovula.		Cassidaria.	
adriatica Sow.	0,30-50	echinophora L.	0,20-50
carnea Poir.	0,20-30	tyrrhena Kien.	3—5
„ var. albida	0,40		
spelta L.	0,40-60	Dolium.	
		galea L.	0,50-1
Cypraea.		Cyclope.	
europaea Mtg.	0,10-20	nerita L.	0,10-20
lurida L.	0,30-1	„ var. pellucida	0,10-20
pyrum Gm.	0,50-1	„ „ Kamiesch Dsh.	0,20-30
pulex Sol.	0,10-20	Nassa.	
spurca L.	0,30-50	Cuvieri Payr.	0,20
Erato.		cornicula Oliv.	0,10-20
laevis Don.	0,20-30	gibbosula L.	0,20-50
Marginella.		incrassata Müller.	0,10-20
clandestina Broc.	0,20-30	limata Chm.	0,30-60
miliaria L.	0,10	mutabilis L.	0,20-40
minuta Pfr.	0,20-30	obsoleta Say	0,20-30
Cymbium.		reticulata L.	0,20-30
papillatum Schum.	2,—	trivittata Say	0,10-30
Mitra.		varicosa Turt.	0,20-30
cornicula L.	0,20-40	variabilis Phil.	0,10-20
ebenus Lm.	0,30-50	Buccinum.	
tricolor Gm.	0,10-20	Amaliae Verkr.	2—4
Columbella.		elegans „ defect!	2—3
avara Say	0,30-40	fragile „	1—3
Hollbölli Möller	0,80-1,20	finmarchianum Verkr.	0,50-1,50
lunata Sow.	0,20	glaciale L.	2—4
minor Scac.	0,20-40	groenlandicum Chm.	0,50
rustica L.	0,10-20	Humphreysianum	
scripta L.	0,10-20	Ben.	2—4
„ v. Gervillei Payr.	0,10-20	undatum L.	0,30-1
Cassis.		„ var. pelagicum	
saburon Brug.	0,30-60	Sars	0,50-1
sulcosa Brug.	0,20-1	„ var. zetlandic.	
		Jeffr.	1—2
		undulatum Möll.	2—3

	Mk.		Mk.
Totteni Stimps	3-4	var. Gunneri Lov.	1,50-1,50
tenue Gray	3-4	cinereus Say	0,40-80
Purpura.		Geversianus Pall.	2-5
canaliculata Ducl.	0,30-50	muricatus Mtg.	0,40-80
emarginata Desb.	0,60-80	truncatus Ström.	0,20-50
haemastoma L.	0,20-50	Pollia.	
lapillus L.	0,10-20	D'Orbygni Payr.	0,10-20
var. imbricata Lm.	0,20-30	leucozona Phil.	0,20-40
lactuca Esch.	0,80-2	picta Scacchi.	0,60-80
Coralliophila.		Pisania.	
scalaris Broc. =		maculosa Lm.	0,10-20
Meyendorfi Calc.	1-1,50	Eutria.	
Ocenebra.		cornea L.	0,20-50
aciculata Lm.	0,20-40	var. minor.	0,30
Edwardsi Parr.	0,10-30	Neptunea.	
erinacea L.	0,30-2	antiqua L.	0,50-1
var. Tarentina Lm.	0,50-1	Beringii Midd. defect!	6,—
gibbosa Lm.	1-3	despecta L.	1-3
Murex.		var. carinata	1-3
brandaris L.	0,20-1	var. varicosa-carinata	2-4
var. coronatus	1-2	decemcostata Say	3-8
cristatus Broc.	0,20-40	tornata Gould	3-4,50
trunculus L.	0,20-1	Turtoni Bean.	4-10
Tiphys.		Sipho.	
tetrapterus Bronn	0,50-1	curtus Jeffr.	3-10
Tritonium.		gracilis F. et H.	1-2
corrugatum Lm.	0,50-2	glaber Verkr.	2-5
cutaceum L.	0,50-1	islandicus Chm.	10-20
nodiferum Lm.	1-3	Jeffreysianus Fischer	3-5
parthenopeum v. Salis	1-3	Kroyeri Möller defect!	6-10
Epidromis.		propinguus Alder	2-5
reticulatum Blainv.	0,20-30	pygmaeus Gould	1-2
Bufonaria.		striatus Rve.	2-3
serobiculator L.	2-3	Fusus.	
Ranella.		craticulatus Broc.	0,20-60
gigantea Lm.	1,50-4	pulchellus Phil.	0,20-60
Fascicolaria.		rostratus Olivi	0,40-2
lignaria L.	0,20-50	Sitchensis Midd.	0,50-1,20
Trophon.		syracusanus L.	0,30-80
barvicensis Johnst.	0,50-1	Lachesis.	
craticulatus Fabr.	1-2	candidissima Phil.	1,—
var. grandis	5-6	minima Mtg.	0,10-20
clathratus L.	0,50-1	var. mamillata Risso	0,20-30
		Pleurotoma.	
		nivalis Lovén	1-3

	Mk.		Mk.
Bela.		Triforis.	
mitrula Lovén	0,30-50	preversa L.	0,10-20
Mörchi Malm	1—2	Cerithiopsis.	
pyramidalis Ström	0,30-60	costulaia Möller	0,50-1
septangularis Mtg.	0,30-50	minima Brus.	0,20-30
simplex Midd.	0,50-2	tubercularis Mtg.	0,20-30
turricula Mtg.	0,20-30	Cancellaria.	
var. excarata Möller	0,20-30	cancellata L.	1—2
„ nobilis „	0,50-1	Trichotropis.	
„ rosea Sars	0,30-40	canaliculatus Leach.	1—3
Trevelyana Turt.	0,50-1	var. acuminata Jeffr.	0,50-1,50
violacea Migh. et Ads.	0,20-40	insignis Midd.	2—4
Raphitoma.		St. Johnensis Verkr.	2—4
attenuata Mtg.	0,20-60	Natica.	
brachystoma Phil.	0,50-80	affinis Gm.	0,20-80
Bertrandi Payr.	0,20-40	Guillemini Payr.	0,20-40
clathrata Serr.	0,30-50	Groenlandica Beck.	0,40-80
costata Don.	0,50-80	hebraea Mart.	0,40-60
gracilis Mtg.	0,40-60	helicina Broc.	0,20-40
Leufroyi Mich.	0,30-80	heros Say	0,50-3
linearis Mtg.	0,20-50	islandica Bean.	0,40-80
multilineata Desh.	0,20-40	immaculata Tott.	0,20-40
nebula Mtg.	0,20-40	Josephinia Risso	0,20-40
paciniana Calcara	0,20-30	intricata Don.	0,20-30
purpurea Mtg.	0,20-50	macilenta Phil.	0,20-40
var. Philberti Mich.	0,20-40	millepunctata Lm.	0,40-60
rugulosa Phil.	0,30-50	pallida Brod. et Sow.	3—4
reticulata Ren.	0,30-60	pulchella Risso	0,20-40
taeniata Desh.	0,30-50	trifasciata Say	0,30-50
Vauquelinii Payr.	0,50-60	Sigaretus.	
Conus.		striatus M. de Perr.	0,50-1,20
mediterraneus Brug.	0,20-1	Velutina.	
Chenopus.		laevigata Penn.	0,20-50
occidentalis Beck.	2—6	zonata Gould.	1,—
pespelicani L.	0,20-50	Lamellaria.	
Serreseanus Mich.	2—3	perspicua L.	0,20-40
Cerithium.		Adeorbis.	
conicum Blainv.	0,20-40	subcarinatus Mtg.	0,20-30
elegans Blainv. u.		Skeneia.	
Desh.	0,20-40	planorbis Fabr.	0,10
metaxa Sow.	0,30-50	Homalogyra.	
metula Lov.	0,50-1,20	atomus Phil.	0,20-30
mediterraneum Desh.	0,20-30		
pusillum Jeffr.	0,20-40		
scabrum Olivi	0,10 20		
var. lima Brug.	0,10-20		
vulgatum „	0,20-50		

	Mk.		Mk.
Littorina.		<i>inconspicua</i> Alder	0,10-80
<i>curila</i> Midd.	0,20-30	<i>Jeffreysii</i> Waller	0,30-40
<i>grandis</i> Midd.	0,50-1,20	<i>labiosa</i> Mtg.	0,20
<i>littorea</i> L.	0,10-20	<i>lactea</i> Michaud	0,50
<i>neritoides</i> L.	0,10-20	<i>Lanciae</i> Calc.	0,30-40
<i>obtusata</i> L.	0,10-20	<i>lilacina</i> Reclz.	0,20
var. <i>groenlandica</i>		<i>lineolata</i> Mich.	0,20
Mörch	0,10-20	<i>Mariae</i> Hörnes	0,30
" <i>limata</i> Lovén	0,10-20	<i>membranacea</i> Ads.	0,20
<i>punctata</i> Gmel.	0,20-30	<i>monodonta</i> Phil.	0,20
<i>rudis</i> L.	0,10-20	<i>Montacuti</i> Payr.	0,10-20
var. <i>sexatilis</i> Johnst.	0,10-20	<i>oblonga</i> Desm.	0,20
" <i>tenebrosa</i> Mtg.	0,10 20	<i>parva</i> (Da C.) F. et H.	0,10
<i>sitchana</i> Phil.	0,30-40	var. <i>interrupta</i> Ads.	0,10
<i>vestita</i> Say	0,10-20	<i>punctura</i> Mtg.	0,10
		<i>pusilla</i> Phil.	0,20-30
Lacuna.		<i>radiata</i> "	0,20
<i>crassior</i> Mtg.	0,30-40	<i>reticulata</i> Mtg.	0,10
<i>divaricata</i> Fabr.	0,20-30	<i>robusta</i> Dall.	0,30-40
var. <i>quadrifasciata</i>		<i>rudis</i> Phil.	0,30-40
Mtg.	0,20-30	<i>seminulum</i> Montr.	0,20-30
" <i>solidula</i> Lovén	0,20-40	<i>semistriata</i> Mtg.	0,10-20
<i>puteolus</i> Turt.	0,20-40	<i>similis</i> Scacchi	0,50
<i>pallidula</i> (Da Costa)		var. <i>laevis</i> Montr.	0,30-40
F. et H.	0,20-30	<i>solida</i> Phil.	0,10-20
		<i>subcostulata</i> Schw.	0,10-20
Fossarus.		<i>striata</i> Mtg.	0,10
<i>ambiguus</i> L.	0,30-50	var. <i>saxatilis</i> Möller	0,20
		<i>striatula</i> Mtg.	0,30-40
Rissoina.		<i>tesselata</i> Schw.	0,20
Bruguieri Payr.	0,10-20	<i>variabilis</i> v. Mühlf.	0,10
		v. <i>splendida</i> Eichw.	0,20
Rissoa.		<i>venusta</i> Phil.	0,10
<i>auriscalpium</i> L.	0,10	<i>ventricosa</i> Desm.	0,10
<i>algeriana</i> Montr.	0,10-20	<i>violacea</i> Desm.	0,10-20
<i>arenaria</i> Ads.	0,10-20	v. <i>rufilabrum</i> Leach.	0,10
<i>caribaea</i> D'Orb.	0,20	<i>vitrea</i> Mtg.	0,20
<i>castanea</i> Möller	0,70	Weinkanff Schw.	0,20
<i>calathus</i> F. et H.	0,20-30	<i>zetlandica</i> Mtg.	0,30-40
<i>costulata</i> Alder	0,20		
<i>cimex</i> L.	0,10	Barleia.	
<i>cingillus</i> Mtg.	0,10	<i>rubra</i> Ads.	0,10
<i>crenulata</i> Mich.	0,10	var. <i>pallida</i> Jeffr.	0,10
<i>costata</i> Ads.	0,10	var. <i>unifasciata</i> Mtg.	0,10
<i>dictyophora</i> Phil.	0,20-30		
<i>decorata</i> Phil.	0,20	Jeffreysia.	
<i>fulgida</i> Ads.	0,10	<i>diaphana</i> Alder	0,20-30
<i>fulva</i> Mtg.	0,10	<i>globularis</i> Jeffr.	0,20-30
Jan Meyeni Friele	0,20-40	<i>opalina</i> "	0,20-30

	Mk.		Mk.
Hydrobya.		Scillae Scacchi	0,30-50
ulvae Penn.	0,10	Odontostoma.	
var. octona L.	0,10	albella Lovén	0,20-40
Truncatella.		acuta Jeffr.	0,20-40
truncatula Drap.	0,10	conoidea Broc.	0,20-40
Caccum.		var. Australis Jeffr.	0,50
auriculatum Folin	0,20-30	insculpta Mtg.	0,20-40
glabrum Mtg.	0,10-20	nivosa Mtg.	0,30-50
subangulatum	0,20-30	pallida Mtg.	0,20
trachea Mtg.	0,10-20	var. angusta Jeffr.	0,20-30
Siliquaria.		„ novogradensis	
anguina L.	6—10	Bruss.	0,20-30
Vermetus.		plicata Mtg.	0,30-50
intortus Lm.	0,40-50	rissoides Hanl.	0,30-50
lumbricalis Gm.	0,50-1,20	turrita Hanl.	0,40-40
triqueter Biv.	0,20-60	truncatula Jeffr.	0,30-40
Turritella.		unidentata Mtg.	0,20-40
acicula Stimp.	0,30-50	Auriculina.	
communis Risso	0,10-30	Erjaveciana Bruss.	0,20-30
polaris Beck.	0,50-1	Turbonilla.	
triplicata Broc.	0,40-1	decussata Mtg.	0,30-50
Mesalia.		delicata Montr.	0,20-30
brevialis Lm.	1-2,50	excavata Phil.	0,30-50
lactea Möller	0,50-1	eximia Jeffr.	0,10-20
Sealaria.		fenestrata Forb.	0,20-30
communis Lm.	0,20-50	indistincta Mtg.	0,10-20
clathratula Mtg.	0,50-80	interstincta Mtg.	0,10-20
pseudoscalaris Broc.	0,20-60	var. monozoa Bruss.	0,20-30
tenuicostata Mich.	1,50-1,20	interrupta Totten	0,40-50
Trevelyana Leach.	1—2	lactea L.	0,10-30
Eulima.		pusilla Phil.	0,30-50
polita Risso	0,50-1,50	scalaris Phil.	0,30-40
„ v. brevis Reg.	0,20-30	var. rufescens Forb.	0,30-50
Philippii Wkff.	0,20	spirialis Mtg.	0,20-40
stenostoma Jeffr.	0,30-45	striolata L.	0,20-30
sinuata Sc. var. inter-		Actaeon.	
media Cantr.	0,20-50	tornatilis L.	0,20-40
subulata Don.	0,40-80	Cylichna.	
Eulimella.		alba Lovén	0,10-30
acicula Phil.	0,20-30	cuneata Tib.	0,20-30
var. obeliscus Jeffr.	0,30-40	cylindracea Mtg.	0,20-40
„ ventricosa Forb.	0,30-40	Jeffreysi Wkff.	0,20-40
bilineata Ald.	0,30-60	nitidula L.	0,20-40
		Reinhardti Hölb.	0,40-60
		striatula Forb.	0,20-30
		umbilicata Mtg.	0,10-20

	Mk.		Mk.
Utriculus.		Gadinia.	
canaliculatus Say	0,30-40	Garnoti Payr.	0,20-50
Gouldi Couth	0,20-30	Calyptrea.	
hyalinus Turt.	0,50-1	chinensis L.	0,20-40
minutissima Mart.	0,10-20	Capulus.	
mamillatus Phil.	0,10-20	hungaricus L.	0,50-1
obtusus Mtg.	0,10-20	Crepidula.	
truncatus Mtg.	0,19-20	fornicata Gray.	0,30-50
Amphisphyra.		glauca Say.	0,30-40
debilis Gould.	0,30-60	lingulata Gould	0,20-30
Bulla.		Moulini Mich.	0,20-50
hydatis L.	0,10-50	plana Lm.	0,30-40
var. cornea Lm.	0,10-30	unguiformis L.	0,20-30
" elegans Leach.	0,10-30	Crucibulum.	
striata Brug.	0,20-50	striatum Say.	0,30-40
Scaphander.		Neritina.	
lignarius L.	0,20-1	viridis L.	0,10-20
punctostriatus Migh.	1—5	Xenophora.	
Akera.		mediterranea Per.	4—6
bullata Müller	0,20-50	Phasianella.	
Philine.		pullus L.	0,10-80
aperta L.	0,20-50	speciosa v. Mühlf.	0,10-20
catena Mtg.	0,20-40	tenuis Mich.	0,10-20
Finnmarchiana Sars	0,50-80	Turbo.	
punctata Clark.	0,30-50	rugosus L.	0,50-1
quadrata S.W.	0,50-80	sangarensis Schrenk	0,50-60
scabra Müller	0,30-50	Cyclostrema.	
Lobiger.		Cutlereanum Cl.	0,20-40
Philippi Krotm.	0,20-60	serpuloides Mtg.	0,20-30
Aplysia.		Mölleria.	
depilans L.	0,30-50	costulata Möller	0,25-50
Pattisoni Sow.	0,60	Clanculus.	
punctata Cuv.	0,20-40	corallinus Gm.	0,20-40
Umbrella.		cruciatus L.	0,10-20
mediterranea Lm.	1—2	Jussieni Payr.	0,10-20
Assimineia.		Trochus.	
Grayana Leach.	0,10-20	articulatus Lm.	0,20-30
Melampus.		Adansoni Payr.	0,10-20
bidentatus Mtg.	0,20-30	albidus Gm.	0,20-50
myosotis Drap.	0,20-30	conulus L.	0,20-50
Otina.		crassus Pult.	0,10-20
otis Turt.	0,20-40	cinerarius L.	0,10-20
Siphonaria.		divaricatus L.	0,10-20
algesirae Quoy	0,30-60		
thersites Carp.	0,60-80		

	Mk.		Mk.
depictus Desh.	0,20-30	Puncturella.	
dubius Phil.	0,20-30	Noachina L.	0,20-50
exiguus Pult.	0,10-20	Emarginula.	
Fermonii Payr.	0,10-30	cancellata Phil.	0,20-50
fannulum Gm.	0,20-50	conica Schum.	0,30-60
granulatus Born.	0,20-60	crassa Sow.	1,50-6
iridescens Midd.	0,30-40	elongata Costa	0,20-30
Languieri Payr.	0,10-30	fissura L.	0,29-50
lineatus Lm.	0,20-30	Huzardi Payr.	0,20-40
millegranus Phil.	0,20-50	tenera Montr.	0,30-40
magus L.	0,20-1	Lepeta.	
occidentalis Migh.	2—4	caeca Müller	0,30-60
obliquatus Gmel.	0,10-20	Pilidium.	
Raketi Payr.	0,20-30	fulvum Müller	0,30-50
rarelineatus Mich.	0,20-30	rubellum Fabr.	0,20-30
Richardi Payr.	0,20-40	Tectura.	
striatus L.	0,10-20	cassis Esch.	0,29-40
turbinatus Born.	0,20-30	digitalis Esch.	0,10-40
tumidus Mtg.	0,30-50	patina Esch.	0,20-50
turbinoides Desh.	0,20-40	pellucida L.	0,20-50
umbilicaris L.	0,10-20	spectrum Nutt.	0,20-40
villicus Phil.	0,10-30	testudinalis Müll.	0,20-30
varius L.	0,10-30	virginea Müll.	0,20-40
zizyphinus L.	0,20-60	Patella.	
var. Lyonsii	1-1,50	ferruginea Gm.	0,80-1,20
Margarita.		lusitanica "	0,30-50
bella Verkr.	1—2	magellanica "	0,40-1,20
cinerea (Gld.) Couth.	0,20-50	vulgata L.	0,10-20
groenlandica Chm.	0,20-30	var. caerulea L.	0,10-30
helicina Fabr.	0,20-30	Chiton.	
obscura Couth.	0,20-50	albus L.	0,20-40
olivacea Braun	0,30-56	atratus Sow.	1,—
striata Brod. et Sow.	0,50-1,50	cancellatus Wood	0,20-50
umbilicalis Brod. et Sow.	0,60-2	discrepans Brown.	0,30-40
Vahli Möll.	0,30-40	fulvus Wood.	0,20-1
varicosa Migh.	0,50-80	fascicularis L.	0,30-50
Scissurella.		laevis Penn.	0,20-40
crispata Flem.	0,20-50	lineata Wood.	1,20
costata D'Orb.	0,30-50	marmoreus Fabr.	0,20-30
Haliotis.		magellanicus Chem.	1,50
tuberculata L.	0,20-50	marginatus Penn.	0,20-40
Fissurella.		Poli Phil.	0,30-40
costaria Defr.	0,30-60	ruber L.	0,20-40
græca L.	0,20-40	Rissoi Payr.	0,40-50
gibba Phil.	0,20-30	Siculus Gray.	0,30-50
		submarmoreus.	0,30-60
		tunicatus Wood	0,60-80

	Mk.		Mk.
Dentalium.		Hyalaea.	
agile Sars	0,30-50	inflexa Les.	0,20
abyssorum Sars	0,20-30	longirostris Les.	0,30
dentalis Lm.	0,20-30	tridentata Forsk.	0,20-30
entalis L.	0,20	Clio.	
novemcostatum Lm.	0,20-30	pyramidata Lm.	0,20-40
rufescens Phil.	0,30-50	subulata Quoy et G.	0,30-40
tarentinum Lm.	0,20-30	Creseis.	
Siphonodentalium.		vitrea Dkr.	0,20-30
affine Sars	0,30-50	Carinaria.	
Lefotense Sars	0,40-50	mediterranea Per. et L.	2,50-4
quinguangulare Forb.	0,20	Argonauta.	
vitreum Sars	0,50-1	argo L.	3—10
Dischides.		Spirula.	
bifissus Wood	0,20-30	Peroni Lm.	0,30-1

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Catalog für die deutsche malakozoologische Gesellschaft 1886 No.6 197-234](#)