

LINNÆA,

Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.
7 Elsheimerstrasse 7.

TAUSCH-CATALOG No. 3, 1885
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Verzeichniss Senegambischer Conchylien.

Die näheren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.

	Mk.		Mk.
Murex.		Nassa.	
cornutus L.	2—5	miga Brug.	0,30-60
cristatus Broc. var.	0,50-60	Mülleri v. Maltz.	0,50-80
fasciatus Sow.	0,80-1,20	semistriata Broc.	
gibbosus Lm.	2—3	(maculata Ads.)	0,30-40
lyratus Ads.	1—2	Purpura.	
Pollia.		Forbesi Dkr.	0,40-60
excavata Dkr.	0,30-50	haemastoma L.	0,20-50
lineata Gm.	0,40-60	neritoidea L.	0,40-60
Fusus.		Oliva.	
Boettgeri v. Maltz.	1-2,50	flammulata Lm.	0,20-60
morio L.	1—3	hiatula Lm.	0,30-60
Genota.		pulchella Ducl.	0,40-60
papalis Reeve	1,50-4	Steeriae Rve.	0,50-60
Crassispira.		Tudicla.	
callosa Kien.	2—3	afra Gmel.	2—3
carbonaria Rve.	1-1,50	Plicatella.	
consociata Smith	2—3	filosa Wagn.	2—4
laevisulcata v. Maltz.	1-1,50	Cymbium.	
Drillia.		cymbium Lm.	1-2,50
tripter v. Maltz.	1—2	navicula Gmel.	1-2,50
Clavatula.		porcinum Lm.	1,50-2,50
bimarginata Lm.	1,50-3	Conohelix.	
Colini v. Maltz.	2—4	carbonacea Rve.	0,50-2
diadema Kien.	1-2,50	Marginella.	
muricata Lm.	2—3	Adasoni Lm.	1,50-2,50
sacerdos Rve.	1—2	aurantia Lm.	1,50-2
rubrifasciata Rve.	3—5	amygdala Lm.	0,40-60
Pusionella.		bifasciata Lm.	2—3
aculeiformis Lam.	2—4	cornea Lm.	0,80-1
nifat Ads.	1—3	cineta Kien.	1,50-2
Recluziana Petit.	3—4	cingulata Dillw.	0,20-30
vulpina Born.	2—4	Cleryi Pet.	1,50-2
Tritonium.		fabia L.	1,50-2,50
ficoides Rve.	1—3	Goodalli Sow.	12—18
olearium L.	1—2	glabella L.	1—2
Phos.		harpaeformis Beck.	1,50-2
Grateloupiana Pet.	0,80-1,50	laeta Jouss.	1-1,50
Cyllene.		monile Lm.	0,20-30
lyrata Lm.	0,80-1,20	olivaeformis Kien.	1-1,50
Desmoulea.		oryza Lm. var.	0,30-40
pinguis Ads.	2,50-4	persicula L.	0,30-50
Pseudostrombus.		pseudofaba Sow.	12—16
politus Lm.	0,30-50	triticea Lm.	0,20-40

	Mk.		Mk.
Columbella.		Fissurella.	
cribraria L.	0,20-30	alabastrites Rve.	0,30-50
Freytagi v. Maltz.	0,60-80	Dentalium.	
striata Ducl.	0,30-50	dentale L.	0,20-40
Natica.		v. rosea	0,30-40
collaria Lm.	0,40-80	Maltzani Dkr.	0,30-1,50
fanel Reclz.	0,60-1	Patella.	
fulminea Gm.	0,50-1,20	Adansoni Dkr.	0,30-60
var. punctata Swains.	0,50-1	caerulea L.	0,20-30
Loveni Dkr.	0,40-1	electrina Rve.	0,40-60
variabilis Reclz.	0,50-80	Bulla.	
Scalaria.		Adansoni Phil.	0,30-50
pseudoscalaris Broc.	0,40-80	Siphonaria.	
Terebra.		venosa Rve.	0,30-50
cinerea Born.	0,30-40	Corbula.	
Conus.		sulcata Lm.	0,30-50
Genuanus L.	3—5	Tellina.	
mercator L.	1—4	exilis Lm.	0,50-80
testudinarius Mart.	1—3	Donax.	
papilionaceus Hwss.	1—5	rugosus L.	0,20-30
Strombus.		Venus.	
fasciatus Gmel.		affinis Sow.	1—2
(bubonius)	2—3	rosalina Rang	1—2
Cypraea.		Cardium.	
lurida L.	0,40-80	Kobelti v. Maltz.	0,60-1,50
nebulosa Kien.	2-2,50	pulchrum Hinds	0,40-80
sanguinolenta Gmel.	1—2	Ungulina.	
Sowerbyi Kien.	1-2,50	alba Rang.	1-1,50
stercoraria L.	1-1,50	Crassatella.	
Tympanotonos.		Paeteli v. Maltz.	0,60-1,50
radula L.	0,60-80	Chama.	
Turritella.		Senegalensis Rve.	2—5
aspera Ad. et Rve.	1—2	Cardita.	
trisulcata Lm.	0,60-80	ajar Brug.	0,60-1,50
Mesalia.		Pectunculus.	
brevialis Lm.	1-2,50	spadiceus Rve.	0,50-1,50
Freytagi v. Maltz.	1,50-3	scriptus Lm.	0,50-2
Smithia.		Leda.	
gracilis v. Maltz.	6—15	bicuspadata Gould	0,30-40
Calyptraea.		Lithodomus.	
vulgaris L.	0,60-1,50	caudigerus Lm.	
Crepidula.		f. minor	0,30 40
aspersa Dkr.	0,20-40	Arca.	
v. fasciata	0,20-40	Geissei Dkr.	0,40-80
v. unicolor	0,20-40	Mytilus.	
Littorina.		Charpentieri Dkr.	0,30-50
pulchella Dkr.	0,20-40	africanus Chm.	0,40-60
Nerita.		Modiola.	
Senegalensis Gmel.	0,30-40	barbata L.	0,20-40
Trochus.		Ostrea.	
magus L. f. Senegal.	0,30-40	Guineënsis Dkr.	0,30-60
punctulatus Lm.	0,30-40		

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren
 Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut
 Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.
7 Elsheimerstrasse 7.

TAUSCH-CATALOG No 3,
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

	Mk.		Mk.
Oleacina.		Rüsei Pfr.	Portorico 0,60
leucozonias Walch Jamaica	0,60-1,50	Sauvalleana Gundl.	Cuba 0,40-60
Philippiana Pfr.	" 0,80-1,20	seminuda Ads.	Jamaica 0,40-50
striata Müll.	Bolivia 2-2,50	speciosa Dkr.	Mexico 5
Streptaxis.		torquata Morl.	Cuba 0,40-60
costulatus v. Möll.	China 0,80-1	variegata Pfr.	" 0,30-40
Fuchsianus Gredl.	" 1	volubilis Morl.	" 0,40-50
Monroviaus Rang	Liberia 1-1,50	Buliminus.	
sinensis v. Möllend.	China 0,80-1	Bengalensis Lm.	Australien 0,40-50
Wagneri Pfr.	Brasil. 1-1,50	Cantori Bens.	China 0,40-50
Gibbulina.		Dufresnii Leach.	Tasmania 0,80-1,50
funicula Val.	Mauritius 0,40-50	dux Pfr.	Australien 1,50-2
Mauritiana Morl.	" 0,40-50	insularis Ehrbg.	Dahlak I. 0,20
pagoda Fér.	" 1-1,50	Mageni Gass.	N. Caledon. 0,50-80
palanga Fér.	" 0,50	pullus Gray	Bengalen 0,20-30
sulcata Müller	" 0,50-1	sanguineus Barcl.	Mauritius 1-1,50
Ennea.		velutina Pfr.	Seychellen 0,80
microstoma v. Möll.	China 1	Partula.	
ovoidea Brug.	Mayotte 1-50,2	abbreviata Mouss.	Tahiti 0,50
Rhytida.		arguta Pease	Gesellsch.-I. 0,50
Boydii Ang.	Anstral. 1,50-2	Australis Sow.	" 0,40-50
inaequalis Pfr.	N. Caledon. 1	canalis Mouss.	" 0,60-1
Leia.		fabia Mart.	" 0,60-80
Maugeri Wood	Jamaica 0,20-30	gibba Fér.	" 0,50
Macroceramus.		gracilis Pease	Sandw.-Ins. 0,30-40
claudens Gundl.	Cuba 0,20-30	hebe Pfr.	Gesellsch.-Ins. 0,30-60
cylindricus Gray I.	Tortola. 0,30	Huabeinensis Garr.	" 0,50
festus Gundl.	Cuba 0,20-30	hyalina Brod	" 0,20-50
Gossei Pfr.	Jamaica 0,30	inflata Reeve	" 0,40-80
Guildingi Pfr.	Cuba 0,30-40	Layardi Braz.	N. Hebriden 0,60
Poeyi Pfr.	Cuba 0,30-50	lignaria Pease	Tahiti 0,50
Cylindrella.		lineolata Pease	" 0,40
agnesiana C.B.Ads.	Jamaica 0,40-80	lirata Mouss.	" 0,50-80
arcuata Weinl.	Haiti 0,80	lugubris Pease	" 0,50
brevis Pfr.	Jamaica 0,30-50	Mastersi Pease	" 0,40
Brooksiana Gundl.	Cuba 1	nodosa Pfr.	" 0,40
camoensis Pfr.	Cuba 0,20	Otaheitana Brug.	" 0,30-50
chordata Pfr.	St. Croix 0,50	radiolata Pfr.	N. Hibern. 0,40
clara Wright	Mexico 2-3	Recluziana Pet.	Gesellsch.-I. 0,60
cylindrus Ch.	Jamaica 0,40	rosea Brod.	" 0,50-80
v. rosea C. B. Ads.	" 0,30-40	rustica Pease	" 0,40
elegans Pfr.	Cuba 0,20-40	solidula Reeve	" 0,50
fabreana Poey	" 0,80-1	sinistrorsa Pease	Tahiti 0,30-40
fastigiata Gundl.	" 0,60	trilineata "	" 0,40-50
gracilis Wood	Jamaica 0,40-1,50	Vanicorensis Quoy	Vanicoro 0,50
lateralis Poey	Cuba 0,60-80	variabilis Pease	Raiatea 0,50
pallida Gould	St. Thomas 0,40	zebrina Gould	Upolu 0,60
perplicata Fér.	Guadeloupe 0,40-50	Auriculella.	
Philippiana Pfr.	Cuba 0,40-50	auricula Fér.	Sandw.-Ins. 0,20-30
Poeyana d'Orb	" 0,60	Achatinella.	
		abbreviata Reeve	Sandw.-I. 0,60

	Mk.		Mk.
adusta Reeve Sandw. Ins.	0,60	gemma Bens. Bengal.	0,30
bacca " "	0,60-80	notigena " "	0,30-50
bulimoides Sw. " "	0,60-80	Tornatellina.	
biplicata Newc. " "	0,80	gigas v. Mart. Ruck Ins.	2—5
citrina Reeve " "	0,40-50	Pupa.	
colorata Reeve " "	0,60	hunanensis Gredl. China	0,30-50
crassa Newc. " "	0,60	Strophia.	
Dunkeri Cumg " "	1	chrysalis Fér. Cuba	0,40-50
elegans Newc. " "	0,80	cyclostoma Küst. "	0,40
fumosa Newc. " "	0,50	glans " Bahama	0,40
lorata Fér. " "	0,60	latilabris Pfr. (fossil) S. Croix	0,60
labiata Newc. " "	0,40-50	maritima Pfr. Cuba	0,60-80
nubilosa Migh. " "	0,80	Martensiana Küst. Portorico	0,30-40
nucleola Gould " "	0,40	mumia Lam. Cuba	0,40-60
ovata Newc. " "	0,80	striatella Fér. "	0,30-50
pallida Nutt. " "	0,60	uva L. Jamaica	0,10-20
perversa Swains. " "	0,60-80	Weinlandi Kurr. Bahama	0,60-80
prasina Reeve " "	0,60	zebra Weinkl. "	0,30-40
producta Reeve " "	0,50	Megaspira.	
pulcherrima Swains. " "	0,50-60	elatiox Spix Brasilien	2—3
rugosa Newc. " "	0,60	Clausilia.	
splendida Newc. " "	1	aculus Bens. China	0,40-50
subvirens Newc. " "	0,60	v. labio Gredl. "	0,60-80
Swifti " "	0,80-1	v. shangeiensis " "	0,50
taenicolata Pfr. " "	0,60	Adamsiana Pfr. Peru	2
tristis Pfr. " "	0,40	bilabrata Smith Japan	1,50-2
turritella Fér. " "	0,60	brevior v. Mart. "	0,80-1
variabilis Newc. " "	0,40	Cumingiana Pfr. Philippn.	1
venusta Migh. " "	0,40-50	cylindrica Gray Himalaya	0,80
virgulata Migh. " "	0,40-50	Elisabethae v. Möll. China	0,80-1,20
viridana " "	0,60	exilis Ads. Formosa	3
vulpina Fér. " "	0,40-50	Heldi Küst. Java	2
Spiraxis.		Japonica Cross. Japan	1,50
mira Gredl. China	1—2	Javana Pfr. Java	2
Stenogyra.		Lorraini Mke. China	0,60-1
bacillus Pfr. Cuba	0,40-50	Martensiana Herkl. Japan	1—2
calcarea Born. Brasilien	2—4	Möllendorfi v. Mart. China	0,50-60
carracasensis RveVenezuela.	0,20-30	perarata v. Mart. N. Granada	0,40-50
cuneus Pfr. Brasilien	1,50-3	Peruviana Troschel Peru	4—5
Haughtoni Bens. Andam.	0,50-80	Philippiana Pfr. Birmah	2-2,50
homalogyra Shuttl. Cuba	0,20-40	plathytera v. Mart. Japan	0,80-1
Johanina Morl. Mayotte	0,30-40	pluviatilis Bens. China	2—3
obeliscus Moric. Brasilien	1,50-2	porphyrea v. Möllend. "	0,80-1,20
octona Ch. W. Indien.	0,20-30	praeclsa Gredl. "	3—4
octonoides Ads. St. Thomas	0,30	Semprinii Gredl. "	3—4
pyrgula Ads. Japan	0,30	Sheridani Pfr. Formosa	3
riparia Pfr. Ecuador	0,40-60	Sieboldi Pfr. Japan	1—2
subula Pfr. Hayti	0,30-40	Stosarskie Lub. Peru	2,50
sylvatica Spix Brasilien	0,40-1	tau Bttg. Formosa	2—3
Rhodea.		v. Hunana Gredl. China	0,80
gigantea Mouss. N.Granada	6	Taczanowskii Lub. Peru	3—4
Glessula.		tridens Chm. Portorico	0,20-40
Deshayesii Pfr. Ceylon	0,30-40		

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren
 Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut
 Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

Verzeichniss exotischer Zweischaler.

I. Abtheilung.

		Mk.			Mk.
Pholas.			Corbula.		
costata L.	Florida	5—6	albuginosa Hinds N. Guinea		0,20-30
einzelne Schalen		1-1,50	carybaea D'Orb. St. Thomas		0,40
latissima Sow.	Manilla	2,—	Kieneriana Ads. Jamaica		0,30-40
Dactylina.			Lavalleana D'Orb. St. Thom.		0,20-30
Chiloënsis King.	Chile	4,—	nasuta Sow.		0,40
Barnia.			sulcata Lam.	Gorée	0,20-40
Manillae Sow.	Manilla	2,—	trigona Hinds	Afrika	0,40-50
similis Gray	N-Seeland	2,50	tunicata „	Port Jackson	0,40-60
Pholadidea.			Anatina		
melanura Sow.	Panama	0,20-50	truncata Lam.	Manilla	3—4
Talona.			Lyonsia.		
clausa Gray	Gambia	3—4	cuueata Sow.	Californien	3,—
Martesia.			Neaera.		
calva Sow.	Panama	1,50-2,50	ornatissima D'Orb. St. Thom.		2,—
pusilla L.	Jamaica	0,30-40	Mactra.		
striata L.	W.-Indien	0,30-50	achatina Chm.	M. rubr.	1,—
Fistulana.			antiquata Spengl.	Manilla	0,80-1,20
clava Lam.	Singapore	0,50-3	carinulata Desh.	Südsee	1,50
Clavagella.			decora Desh.	Australien	1,—
Australis Sow.	Austral.	2,—	lurida Phil.	China	1,—
Aspergillum.			olorina Phil.	M. rubr.	0,60-80
Javanum Lam.	Java	1-2,50	opposita Desh.	Philippinen	0,60
vaginiferum Lam. M. rubr.		4—6	ornata Gray	China	1,50
Solen.			violacea Chm.	Singapore	1-1,20
brevis Gray	Philippinen	0,40-80	Mactrella.		
gracilis Phil.	Japan	0,80	alata Spengl.	Columbia	2—3
grandis Dkr.	Philippinen	0,60-1,50	exoleta Gray W.-Columbia		3,—
Guineensis Gray	Guinea	0,60-80	Hemimactra.		
Malaccensis Dkr.	Malacca	0,80-1	corbuloides Desh.	Ceylon	0,60-1
Timorensis Dkr.	Timor	1,—	Mulinia.		
Pharella.			antarctica Dkr.	Chile	1-1,50
Javanica Lam.	Java	0,60-1	Byronensis Gray	„	1—2
Cultellus.			typica Gray	„	1,20
Australis Dkr.	Moreton Bay	0,60	Lutraria.		
Cumingianus Dkr.	Philipp.	0,80	Australis Desh.	Moluccen	0,80-1,20
Machaera.			maxima Jonas	China	0,50-1,20
radiata L.	Sumatra	1-1,50	Merope.		
subsulcata Sow.	Singapore	0,60-80	aegyptiaca Chm.	Singapore	0,60-1,50
Winteriana Dkr.	Java	1-1,50	Asaphis		
Solecurtus.			coccinea Mart.	St. Thomas	0,50-1,50
Cumingianus Dkr.	Bohol	0,50-80	deflorata L.	M. ind.	0,30-1
exaratus Phil.	China	0,80-1,50	dichotoma Ant.	Philippinen	0,30-60
Tagelus.			violascens Forsk.	M. rubr.	0,30-80
angulatus Sow.	W.-Afrika	0,60-1	Psammobia.		
Caribaens Lam.	W.-Indien	0,50-80	lineolata Gray	N-Seeland	0,50-1,50
Dombeyi Lam.	Chile	0,50-1	Menkeana Reeve	Australien	0,50
Novaculina.			tristis Desh.	Amboina	1,20
gangetica Bens.	Calcutta	0,30-50	Sanguinolaria.		
mollis Gould.	China	1,—	rosea Lam.	Ceylon	1-1,20
Mya.			Soletellina.		
Hemphillei Newc.	Californ.	0,80-1,20	Adamsi Desh.	Philippinen	2,—
			Cumingiana Desh.	„	1—2

	Mk.		Mk.
plannata Reeve Moluccen	2,—	dentifer Hanl. Panama	0,40-60
solida " Malacca	0,60-1	Dohrni Jick Massaua	0,40-80
violacea Desh. Philippinen	0,20-50	elongatus Lam. Sénégal	0,60-1
Elizia.		fabia Chm. Mauritius	0,20-30
orbiculata Wood Australien	0,80-1	ovalinus Desh. Oc. pacif.	0,40-50
Tellina.		rugosus L. W.-Afrika	0,60-1
angulata Chm. Philippinen	1-1,50	scortum L. C. b. sp.	1—2
chloroleuca Lam. "	1,—	serra Chm. "	1,50-2
crucigera " Oc. ind.	0,20-60	sulcatus Phil.	0,50-60
candida " China	1,50	Galathea.	
compressissima Reeve Japan	1,20-2	Bernardi Dkr. Gabon	3,50
cuspidata Hanl. W.-Amerika	0,50-1	concamerata Duv. Guinea	5,—
Cumingi Hanl. Antillen	2,—	radiata Lam. Congo	3—4
Deshayesi Hanl. M. rubr.	1-1,50	Paphia.	
fausta Donovan. W.-Indien	0,60-2	glabrata Desh. Mauritius	0,30-50
foliacea L. Massaua	0,60-1	Ceronia.	
interrupta Wood Surinam	0,60-1	donacia Desh. Peru	1-1,50
jubar Hanl. Philippinen	2,—	Ervilia.	
lata Quoy et G. N.-Caledon.	2—3	nitens Turt. Antillen	0,20-30
lacunosa Chm. Guinea	1-1,50	scaliola Issel M. rubr.	0,20-30
lingua-felis L. Philippinen	0,40-1	Tivela.	
lineata Furt. Antillen	0,30-50	argentina Sow. Peru	1—2
Madagascariensis Gmel.		bicolor Gray Sénégal	0,80-1,50
	2-2,50	intermedia Sow. Californien	1,—
magna Spengl. Antillen	2—3	mactroides Born W.-Indien	0,80-1,20
marginalis Dillw. Ostindien	0,80-1	planulata Brod. et Sow. Mazatl.	0,80-1
perna Spengl. Philippinen	0,40-60	polita Sow. Natal	0,60-80
pristis Lam. Australien	0,80-1,20	radiata Sow. Mazatlan	0,30-1
punicea Born Mexico	0,40-60	v. Hinds Hanl. Ganges	0,50-80
radiata L. W.-Indien	0,40-1,20	trigonella Lam. Antiller	0,40-50
v. unimaculata L. "	0,20-1	tripla L. Guinea	0,50-1
rastellum Hanl. Ostafrika	0,80-1,50	undulata Sow. Mazatlan	1-1,20
rostrata L. Philippinen	1-3,50	Meretrix.	
rufescens Chm. Antillen	0,60-1	Lamarcki Desh. China	2—3
remies L. Philippinen	1,—	lusoria Chm. "	0,50-1
rugosa Born "	0,40-60	meretrix L. (impudica Lam.)	
scobinata L. Tahiti	0,80-1,50		Siam 0,40-60
staurella Lam. Philippinen	0,20-40	v. castanea Lam. Oc. ind.	0,40-60
strigosa Gmel. W.-Afrika	0,50-80	v. morphina Lam. "	1,—
Timorensis Lam. Timor	0,40-60	ovum Hanl. Oc. ind.	0,80-1
virgata L. Philippinen	0,20-60	petechialis " Mazatlan	1—2
vulsella Chm. "	0,60-1,20	Callista.	
Strigilla.		aurantiaca Gray Californien	0,80-1,20
carnaria L. St. Thomas	0,20-40	costata Chm. Mauritius	0,50-1,50
festiva Semper Australien	0,80-1	erycina L. Calcutta	0,80-1,50
pisiformis L. Oc. ind.	0,20	festiva Sow. O.-Indien	1-1,20
Macoma.		florida Lam. M. rubr.	0,50-1
galathea Lam. Singapore	1,50-2,50	lilacina " "	0,60-1,20
inornata Hanl. Chile	1-1,50	maculata L. Mexico	0,50-1
Tellidora.		pannosa Sow. Chile	0,40-60
Burnetti Brod. et. Sow.		pulchra Gray Australien	0,60-80
	2-2,50	squalida Sow. Californien	0,60-1
Donax.		Caryatis.	
assimilis Hanl. Panama	0,30-50	citriua Lam. Australien	0,50-80
bimaculatus L. St. Thom.	0,20-30	crocea Desh. Philippinen	0,50-80
v. alba " "	0,20-30	hebraea Lam. M. rubr.	0,40-80
v. sexradiata P. Cabello	0,20-30	laeta L. Philippinen	0,40-80
carinatus Hanl. Californien	0,80-1	Kingi Gray N.-Caledonien	0,80-1
Californicus Conr. "	0,30-40	obliquata Hanl. Philippinen	0,50-80
cuneatus L. Tranquebr.	0,30-40	subpellucida Sow. "	0,60-1
Deshayesi Dkr. W.-Afrika	0,30-40	varians Hanl. Brasilien	0,40-80
denticulatus L. Antillen	0,20-40	Dione.	
		brevispina Sow. Australien	1—2

		Mk.			Mk.
circinata Born	Mazatlan	1-1,50	subimbricata Sow.	Peru	0,40-60
dione L.	Antillen	1-3	subrugosa Ant.	Oc. ind.	0,40-80
lupinaria Less.	Peru	2-5	Chione.		
purpurata Lam.	Brasilien	2-2,50	asperrima Sow.	Trinidad	0,40-50
semilamellosa Gould.	Peru	2-4	Amathusia Phil.	Californien	1-2
rosea Brod.	Panama	1-2	Californiensis Brod.	"	0,80-1
unicolor Sow. W.-Columbien		0,50-1,50	crispata Desh.	Philippinen	0,80-1,50
Lioconcha.			compta Brod.	Peru	1,50
arabica Chm.	M. rubr.	0,20-50	crenulata Chm.	Oc. ind.	1-2
castrensis L.	Mauritius	0,50-1,50	cygnus Lam.	China	2,-
picta Lam.	"	0,40-60	cancellata Chm.	Antillen	0,30-50
tigrina "	Oc. ind.	0,40-60	Columbiensis Sow.	Columbia	0,80-1
Crista.			cardioides Lam.	Panama	0,60-1
discors Spengl.	M. rubr.	0,30-50	crassicosata Quoy N.-Seel.		1,50
divaricata Chm.	"	0,30-60	discors Sow.	Mexico	0,40-60
gibbia Lam.	Philippinen	0,30-60	Dombeyi Lam.	Chile	0,50-1
pectinata L.	"	0,30-60	exalbida Chm.	Falkl. Ins.	1-2,50
transversaria Desh.	"	1,-	granulosa Gmel.	St. Thomas	0,30-40
Circe.			gallinula Lam.	Australien	1,-
corrugata Ch.	M. rubr.	0,30-50	Gnidia Brod. et Sow.	Californ.	1-3
personata Desh.	Philippinen	0,40-80	histrionica Sow.	Mazatlan	0,50-80
scripta L.	"	0,20-80	laqueata "	Australien	2-3
Sunetta.			lacerata Hanl.	Philippinen	0,50-1,50
Meroë L.	Ind. occ.	0,60-1,50	Listeri Gray	"	0,40-1
scripta L.	"	0,60-1	Lamarki "	China	0,60-1,20
Tapes.			marica L.	Mauritius	0,30-50
adspersa Chm.	Philippinen	0,50-1	ornatissima Brod.	Panama	1,50
v. nocturna Chm.	"	0,40-80	puerpera L.	Philippinen	0,60-1
Ceylonensis Desh.	Ceylon	0,50-1,20	rugosa Gmel.	W.-Indien	1-2
Deshayesi Sow.	Philippinen	0,40-80	reticulata L.	Philippinen	0,50-1
laterisulca Lam.	Malacca	0,50-1	simillima Sow.	Californien	1,-
litterata L.	Oc. ind.	0,20-1	Stuchburyi Gray N.-Seeland		0,80-1,20
Malabarica Chm.	Malabar.	0,40-80	subnodulosa Hanl.	Philippin.	1,20
Philippinarum Ads. et Reeve			Dosinia.		
	Philippinen	0,20-40	amphidesmoides Reeve		
rimularis Lam.	Australien	0,40-80		Philippinen	1,50
recens Chm.	Oc. ind.	0,50-60	aspera Reeve	"	0,50
sulcaria Lam.	Amboin	0,60-1	angulosa Phil.	Malacca	0,50-1
striata Chm.	Oc. ind.	0,40-50	Adansoni Phil.	Senegal	1,-
turgida Lam.	Salanga	0,40-1	Annae Carp. W.-Columbien		2,-
undulata Born	China	0,20-50	annus Phil.	N.-Seeland	2,-
variegata Sow.	Philippinen	0,20-40	concentrica Born.	Brasilien	0,50-1,50
Katelsysia.			cretacea Reeve	M. rubr.	0,50-80
Peroni Lam.	Australien	0,80-1	caerulea "	Australien	1,20
scalarina Lam.	"	0,40-60	Dunkeri Phil.	Panama	0,50-1
Gomphina.			v. simplex Hanl.	Californ.	0,50-1
undulosa Lam.	Australien	0,30-50	discus Reeve	Antillen	1-2
Anaitis.			eburnea Römer	Ceylon	1,-
calophylla Phil.	Australien	1-2	Gruneri Phil.	China	1-1,50
Isabellina "	"	0,60-80	histrion Gmel.	Philippinen	0,50-60
lamellata Lam.	Tasmania	2-5	isocardia Dkr.	N.-Guinea	0,80-1
paphia L.	Philippinen	0,80-1,20	Japonica Desh.	Japan	1,50-2
plicata Lam.	Senegal	2-4	laminata Reeve	Philippinen	1,-
tiara Dillw.	Philippinen	0,50-1	Lüdersi Römer	Australien	1,50
roborata Hanl.	Australien	0,80-1	labiosa Römer	"	1-1,50
Yatesi Gray	N.-Seeland	2-3	Orbigny Dkr.	Guinea	1,20
Cryptogramma.			Patagonica Phil.	Patagonien	0,40-1
Brasiliana Lam.	Brasilien	0,40-60	ponderosa Gray	Mazatlan	3-4
flexuosa L.	N.-Granada	0,20-40	prostrata L.	Oc. ind.	1,50
impressa Ant.	Oc. ind.	0,30-60	plana Reeve	China	1-2
squamosa L.	Philippinen	0,40-60	sculpta Hanl.	Australien	1,-
			trigona Römer	"	1,-
			variegata Chm.	Mauritius	0,40-50

	Mk.		Mk.
Cyclina.			
Chinensis Ch. China	0,40-80	planicostatum Sow. Amer. c.	1,50-2,50
Cypricardia		retusum L. Ind. occ.	0,80-1
angulata Lam. Mauritius	0,50-1,20	subretusum Sow. Suez	0,80-1,50
Coralliophaga.		tetragonum Voigt Moluccen	0,40-80
laminata Reeve Mauritius	0,30-60	unedo L. Ind. or.	0,30-80
Petricola.		Isocardia.	
divaricata Chm. Mauritius	0,30-40	vulgaris Reeve China	1,50-2,50
Glanconome.		Chama.	
chinensis Gray China	0,60-1,50	arcinella L. W.-Indien	1—3
corrugata Reeve Philippin.	1-1,50	ferruginea Reeve Honduras	2—3
rugosa Hanl. Australien	0,80-1,50	fibula " Philippin.	0,50-1
Cardium.		frondosa Brod. W.-Amerika	2—3
assimile Reeve Zanzibar	1-1,80	imbricata " Mauritius	1,—
bicolor Sow. Mauritius	0,40-60	Lazarus L. M. ind.	4—10
costatum L. W.-Afrika	1—4	lobata Brod. China	0,50-2
elongatum Brug. Viti-Ins.	1—3	pulchella Reeve Australien	1,—
enode Sow. Ceylon	0,50-2,50	macrophylla Chm. St. Thom.	1—6
foveolatum Sow. M. rubr.	0,80-1	reflexa Reeve Australien	0,60-3
fimbriatum Wood. China	0,60-80	Tridacna.	
isocardia L. Antillen	1—2	crocea Lam. Philippinen	1—3
latum Born Philippinen	1-1,50	elongata Lam. "	0,50-2
multispinosum Sow. "	0,80-1,50	rudis Reeve "	1,50-3
magnum Born Mexico.	1-1,50	squamosa Lam. Moluccen	0,80-3,50
muricatum L. W.-Indien	0,50-1,50	Hippopus.	
maculatum Sow. Mexico	0,50-1	maculatus Lam. Ind. or.	1—2
Nuttali Conr. Nunivak	2—3	Lucina.	
Petitium D'Orb. St. Thom.	1,20	bicornis Reeve Philippinen	1,—
procerum Sow. C.-Amerika	1—2	Fischeriana Issel Dahlak	0,30-40
psendolima Lam. Ostindien	1—2	Jamaicensis Lam. Jamaica	0,50-1,20
v. alba " "	0,80-1,50	interrupta " Singapore	1,—
rugosum Lam. Philippinen	0,40-80	punctata L. M. rubr.	0,60-1,50
ringens Chm. Gambia	2—4	Pensylvanica L. Antillen	1,50-2
sinense Sow. China	0,80-1	rugifera Reeve N.-Caledon.	1-2,50
tenuicostatum Sow. Austral.	2,—	scabra Lam. Jamaica	0,20-40
vertebratum Jon. N.-Caledon.	0,60-1,50	tigrina L. St. Thomas	0,50-1,50
Papyridea.		Loripes.	
bullata Lam. Mazatlan	0,60-1,20	chrysostoma Meusch Antillen	1,50-2
papyracea Chm. Manilla	0,80-1,50	edentula Lam. N.-Caledon.	1,50-2
Laevicardium.		ovum Reeve Ostindien	1,—
attenuatum Sow. Ceylon	1,50-2,50	Philippinarum Hanl. Manilla	1-1,50
Australe Sow. Australien	0,40-60	Corbis.	
biradiatum Brug. Philippin.	0,60-1	fimbriata L. Oc. ind.	1—2
Elenensis Sow. St. Elena	0,80	Crassatella.	
lyratum Sow. Ostindien	1-2,50	Cumingi Ads. Australien	6,—
multipunctatum Sow. China	0,60-1,20	decipiens Reeve "	2-3,50
serratum L. W.-Indien	0,40-1	Kingicola Lam. "	3,—
Hemicardium.		Cardita.	
auricula Forsk. M. rubr.	1—2	cardioides Reeve Philippin.	1,50
biangulatum Sow. St. Elena	1,50-2	crassa Gray Mexico	1,50
cardissa L. Oc. ind.	0,50-2	incrassata Sow. Australien	1-1,50
v. Junoniae Lam. Salanga	0,50-2	laticostata " Tasmania	1-1,20
Dionaeum Brd. et Sow. J. Anaa	0,80-1	Mytilicardia.	
exasperatum Sow. China	1,50-2	crassicostata Lam. Philippin.	3,—
fragum L. China	0,40-60	gubernaculum Reeve "	0,50-2
Guichardi Bern. N.-Caledon.	3,—	muricata Sow. Oc. pacific	1,—
graniferum Brod. Antillen	0,50-1	phrenetica Lam. Philippinen	1,50
medium L. "	0,60-80	semiorbiculata Brug. "	0,50-80
		variegata " Mauritius	0,40-60

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Tausch-Catalog 252-259](#)