

Freunde und litterarischen Genossen vollständig beruhigen zu können. Der Catalog, wird, wie ich schon vorhin erwähnte, im Sinne des Verstorbenen fortgesetzt und die Sammlung ist durch die Pietät der Erben vor jeder unwürdigen Verwerthung gesichert: Die Paetel'sche Sammlung bleibt der Wissenschaft erhalten.

Berlin im Februar 1888.

Hermann Freiherr von Maltzan.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozologie.

Diagnoses specierum novarum sinensium.

Auctore Dr. O. Fr. de Moellendorff.

Diplommatina Schmackeri Mlldff.

T. dextrorsa, non rimata, elongatule ovato-conica, superne tenuissime costulata, in anfr. ultimis glabrata, pellucida, corneo-fulva. Anfr. 6 sat convexi, supremi spiram regulariter convexo-conoideam efficientes, antepenultimus maximus, penultimus paullum distortus, ultimus initio valde constrictus, dein inflatus, distortus, antice ascendens. Apertura vix obliqua, angulato-rotundata, peristoma duplex (submultiplicatum), parum incrassatum, expansum, reflexiusculum, superne interruptum, callo tenui junctum, margine columellari strictiusculo cum basali angulum sat acutum formante. Lamella columellaris modica, palatalis valida, longiuscula, supra columellam conspicua.

Long. 3, diam. $1\frac{1}{2}$ mm.

Hab. ad rupes sinus Mirs Bay dicti provinciae sinensis Guangdong leg. cl. B. Schmacker.

Obs. Differt a *D. rufa* m. ejusdem provinciae statura majore, habitu graciliore, sculptura evanescente, peristomate minus incrassato et parum expanso, callo

parietali tenui, lamella palatali longiore et magis immersa.

Macrochlamys apex Mlldff.

T. anguste umbilicata, discoidea, subtiliter striatula, nitens, pellucida, pallide corneo-flava, spira breviter conoidea lateribus concavis, apice acutiusculo, fere mucronato. Anfr. 6 convexi, lente accrescentes, sutura applanata pallescente discreti, ultimus paullum inflatus, ad umbilicum excavatus, non descendens. Apertura parum obliqua, oblique lunaris, peristoma rectum, acutum, margine columellari brevissime ad umbilicum reflexo. Diam. maj. $13\frac{1}{2}$, min. 12, alt. $7\frac{1}{2}$.

Hab. ad monasterium Fei-lai-sy provinciae sinensis Guangdong leg. collector sinicus, comm. cl. B. Schmacker.

Trochomorpha borealis Mlldff.

T. aperte umbilicata, conoideo-depressa, transverse plicato-striatula, lineis spiralibus minutis, ad peripheriam magis distinctis, subtus evanescentibus decussata, tenuis, pellucida, corneo-fulva; spira breviter conoidea. Anfr. 6 convexiusculi, lente accrescentes, ultimus ad peripheriam carina forti exserta munitus, non descendens. Apertura sat obliqua, securiformis, peristoma simplex acutum.

Diam. maj. 11, min. 10, alt. $4\frac{1}{2}$ mm.

» » 10, » 9, » $4\frac{1}{2}$ »

Hab. in silva montis Omi provinciae Sytshuan ad 1000 met. alt. leg. rev. E. Faber, comm. cl. B. Schmacker.

Obs. Prima generis species ex Sina cognita.

Helix Faberiana Mlldff.

T. sat aperte umbilicata, discoidea, solida, striis transversis et lineis spiralibus rugulosis minute granulosa

(in junioribus pilis longiusculis sparsis hirsuta), purpureo-fusca; spira plana, apice vix prominulo. Anfr. 5 subplani, ultimus superne planus, obtuse angulatus. subtus inflatus, gibbus, paullum distortus, circa umbilicum obtuse angulatus, pone aperturam duabus impressionibus, basali brevi, supera longiore, intus lamellas formantibus coarctatus, antice breviter deflexus. Apertura maxime obliqua, cordiformis, peristoma late expansum, labiatum, reflexiusculum, marginibus distantibus, haud callo junctis, externo sinuoso, basali dentato.

Diam. maj. 18, min. 15, alt. $7\frac{1}{2}$ mm.

Hab. in monte Omi provinciae sinensis Sytshuan ad 1000 met. alt. leg. rev. E. Faber, comm. Cl. B. Schmacker.

Obs. Differt ab *H. biscaipta* Heude statura minore, anfractu ultimo superne angulato, peristomate haud continuo, impressionibus vel sulcis, praesertim supero, multo brevioribus etc. Cum illa sectioni *H. trisinuatae* Mart. adnumeranda.

Helix (Plectotropis) subconella Mlldff.

T. sat aperte umbilicata, conoideo-depressa, tenuis, subtiliter curvatim striatula, lineis spiralibus tenuissimis decussata et costulis membranaceis deciduis interruptis sculpta, corneo-fusca. Anfr. 6 convexiusculi spiram subregulariter conoideam efficientes, ultimus ad peripheriam acute carinatus, basi inflatulus, circa umbilicum obtuse angulatus, antice brevissime deflexus. Apertura diagonalis, lunato-trapezoidalis, peristoma superne vix expansum, basi sinuatum, reflexiusculum, ad columellam reflexum, paullum dilatatum.

Diam. maj. vix 12, min. $10\frac{1}{2}$, alt. $6\frac{1}{2}$ mill.

Hab. in regione Lien-dsou provinciae sinensis Guangdong, comm. cl. B. Schmacker.

Helix (Plectotropis) lofouana Mlldff.

T. latiuscule umbilicata, depressa, solidula, curvatim striatula, lineis spiralibus tenuibus sed distinctis decussata, costulis membranaceis deciduis interruptis interdum ad peripheriam ciliose elongatis sculpta, sericina, corneo-flava, spira convexo-conoidea. Anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus ad peripheriam carina exserta subtus crenulata cinctus, subtus convexus, circa umbilicum obtuse angulatus, antice breviter descendens. Apertura diagonalis, securiformis, peristoma superne leviter expansum, basi et ad columellam labiatum, reflexiusculum.

Diam. maj. $14\frac{1}{2}$, min. 13, alt. 8 mm.

Hab. in montibus Lo-fou-shan provinciae sinensis Guangdong.

Helix Herziana Mlldff.

T. sat aperte et profunde umbilicata, globoso-depressa, tenuis, corneo-brunnea, transverse leviter striatula, punctis impressis minutissimis in lineas regulares valde confertas dispositis sculpta. Anfr. 5 convexi, sutura valde impressa discreti, ultimus magnus, valde inflatus, antice non descendens, circa umbilicum obtuse sed distincte angulatus. Apertura parum obliqua, rotundato-lunaris, peristoma leviter expansum, reflexiusculum, sublabiolum, margine basali ad columellam retrorsum sinuato.

Diam. maj. 17, min. $14\frac{1}{2}$, alt. $10\frac{1}{2}$ mm.

Hab. prope oppidum Hoihow insulae Hainan, leg. cl. O. Herz.

Obs. Sp. proxima H. Hungerfordianae Nev. et cum illa nec non H. Franciscanorum Gredl., H. puberula Heude aliisque subgeneri Chloritidi (Beck) Semp. adnumeranda.

Hadra Leonhardti Mildff.

T. late umbilicata, globoso-depressa, solidula, transverse striatula et minute granulosa, nitidula, pallide fusca, fasciis fuscis numerosis, ad peripheriam una latiore ornata. Anfr. $5\frac{1}{2}$, supremi subplani, sequentes convexiusculi, ultimus ad peripheriam sat acute angulatus, basi convexior, circa umbilicum profundum, infundibuliformem obtuse angulatus, antice non descendens. Apertura obliqua, lunato-rotundata, peristoma expansum, reflexiusculum, albolabiatum, marginibus callo tenuissimo junctis, columellari dilatato, umbilicum partim obtegente.

Diam. maj. 44, min. 38, alt. 26 mm.

Hab. ad vicum Nien-hang-li in parte orientali provinciae Guang-dung, leg. rev. Leonhardt.

Obs. Sp. similis H. subgibberae m., sed habitu magis depresso, umbilico latiore, absentia rugarum, nitore, granulatione, anfractu ultimo minus inflato, haud gibbo, magis angulato facile distinguenda.

Hadra Schmackeri Mildff.

T. modice umbilicata, depresso globosa, solida, oblique plicato-striata, spiraliter rugulosa, castaneo-fusca, fasciis tribus flavidis, una ad suturam, altera ad peripheriam, tertia circa umbilicum variegata. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus basi inflatus, ad peripheriam obtuse angulatus, antice breviter deflexus. Apertura diagonalis, lunato-elliptica, peristoma expansum, incrassatum, purpurascens, marginibus callo tenui junctis, columellari dilatato.

Diam. maj. $37\frac{1}{2}$, min. 31, alt. 24 mm.

» » 39, » 33, » $26\frac{1}{2}$ »

Hab. in regione Lienshou provinciae sinensis Guang-dung.

Obs. Differt ab *H. Caspari* m. statura minore, habitu altiore, anfractibus magis convexis, ultimo inflato obtuse angulato (nec carinato), umbilico angustiore et fasciis.

Hadra granulifera Mlldff.

T. aperte umbilicata, depresso globosa, solida, transverse plicato-striatula, confertim et minute granulosa, castaneo-fusca. Anfr. 6 subplani, spiram globoso-conoideam lateribus convexis efficientes, ultimus ad peripheriam carina forti undique exserta indutus, basi inflatus, subgibbus, antice brevissime descendens. Apertura diagonalis lunato-rotundata, peristoma expansum, reflexiusculum, violaceo-labiatum, margine columellari dilatato umbilicum partim obtegente.

Diam. maj. 46, min. 40, alt. 28 mm.

Hab. prope urbem Wutshangfu provinciae Hubei, comm. cl. B. Schmacker.

Hadra nux Mlldff.

T. anguste et semiobtecte umbilicata, globoso-conica, transverse subtiliter striata et lineis spiralibus rugulosis decussata, castanea, ad peripheriam fascia fusca perangusta signata. Anfr. $6\frac{1}{2}$ subplani, spiram conicam apice acuto efficientes, ultimus obtuse angulatus, basi convexus, pone aperturam paullum applanatus, antice brevissime descendens. Apertura obliqua, lunato-rotundata, peristoma sat expansum, reflexiusculum, margine basali subhorizontali, columellari dilatato, incrassato, umbilicum partim obtegente.

Diam. maj. $28\frac{1}{2}$, min. 24, alt. 25 mm.

Hab. in insula Formosa.

Obs. Sp. ab Anonymo mihi transmissa differt ab *H. Friesiana* m. spira magis elevata, anfractu ultimo haud carinato, vix angulato, basi non compresso, sed convexo, fere inflato, peristomate magis expanso.

Stenogyra (? *Opeas*) *superba* Mlldff.

T. rimata, ventricosulo-turrita, sat solida, oblique curvatim striatula et lineis spiralibus decussata, viridescenti-flavida; apex obtusus. Anfr. 9 convexiusculi, sensim accrescentes, ultimus inflatus, non descendens. Apertura obliqua, truncato-ovalis, peristoma expansiusculum, valde incrassatum, margine columellari dilatato, subtus non truncato nec torto.

Alt. 40, lat. $11\frac{1}{2}$ mm, apert. 10 mm alta, $7\frac{1}{2}$ lata.

Hab. ad urbem Hêng-shan-hsien provinciae Hunan, leg. cl. P. K. Fuchs.

Obs. Propter rimam umbilicarem et formationem columellae sectioni Opeadi adnumeranda videtur, sed statura maxima et peristomate incrassato a speciebus typicis valde devians.

Catalog der Gattung Chilina.

(Nach Edg. A. Smith in Pr. Z. S. 1881 p. 842).

amoena Smith Pr. Z. S. 1881 p. 37 pl. 4 fig. 18.

Südwestpatagonien.

angusta Phil. Reise Atacama p. 185.

Wüste Atacama.

bulloides d'Orb. Voy. Amer. merid. p. 335 pl. 43 fig 18. —

Hupé in Gay Chile III. pl. 3 fig. 10.

(ampullacea Sow. Conchol. Illustr. fig. 3. — Conch.

Icon. fig. 8. — M. Ch. II. pl. 10 fig. 12).

Chiloë.

Dombeyana Brug. Enc. méth. VI. p. 335. (Auricula) Lam.

ed. II. vol. VIII. p. 331. — M. Ch. II. t. 9 fig. 18. 19. —

Sow. Conch. Illustr. fig. 11. — Conch. Icon. sp. 4. —

(fluctuosa Sow. Conch. Ill. fig. 2. — Conch. Ic. sp. 2, nec Gray).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Möllendorff Otto Franz von

Artikel/Article: [Diagnoses specierum novarum sinensium. 38-44](#)