

castaneo-brunnea, fascia albida ad carinam, altera per zonam brunneam angustam a sutura separata ornata, spira subregulariter conica, apice obtuso albescente. Anfr. $4\frac{1}{2}$ subplani, ultimus acute albocarinatus, antice breviter deflexus, subtus pone aperturam gibbus, circa columellam fascia pallide flavescente cinctus. Apertura maxime obliqua, angulato-elliptica, peristoma expansum albolabiatum, columella excavata, obliqua.

Diam. maj. $21\frac{1}{2}$, min. 18, alt. 12 mm.

Hab. in monte Limutan provinciae Morong.

Diese auffallende Art, welche in hohem Grade an *Geotrochus*-Arten, z. B. *G. Cleryi* Recl., erinnert, hat unter den philippinischen Chloräen *C. Hanleyi* Pfr. und *benguensis* Semp. zu näheren Verwandten, ist aber durch ihre eigenthümliche Zeichnung, die bei den vorliegenden 5 Stücken nicht variirt, das hohe Gewinde, den sehr scharfen Kiel, die sehr deutlichen Spirallinien gut geschieden. Ich halte die habituelle Aehnlichkeit mit *Geotrochus* nicht für zufällig, sondern glaube an eine directe Verwandtschaft, welcher die geographische Verbreitung von *Geotrochus* mindestens nicht entgegensteht. Meines Wissens fehlt es noch an einer anatomischen Untersuchung der letzteren Gattung; vielleicht dass dieselbe meine Vermuthung eines näheren Anschlusses derselben an *Chloraea* und damit an *Cochlostyla* bestätigt.

Die systematische Stellung von *Chloraea* und ihre wahrscheinliche Zugehörigkeit zu *Cochlostyla* soll bei der folgenden Art besprochen werden.

Schluss folgt.

Literaturbericht.

Martini-Chemnitz, systematisches Conchylien-Cabinet. — Neue Ausgabe.

Lfg. 353. *Clessin, S.*, Mytilacea (Schluss), und Cardita.

Lfg. 354. *Kobelt, W.*, Pecten Taf. 55—60.

Le Naturaliste (2) Année 9. No. 19.

p. 221. *Jousseau, Dr.*, la Famille des Cancellariidae (Suite et Fin).

— Es werden noch folgende neue Gattungen aufgestellt: Tribia für Cancellaria Angasi Crosse; — Broechinia für C. mitraeformis Brocchi; — Solatia für C. piscatoria Chemn. (le Solat Adans.); — Nevia für C. excavata Sow.; — Uxia für C. angulata Wat. foss.; — Bonellitia für Admete circumcincta Dall und für die fossile C. Bonellii Brocchi.

Kobelt, Dr. W., Prodromus Faunae Molluscorum Testaceorum maria europaea inhabitantium. — Fasc. IV. (Schluss).

Das Werk liegt nunmehr fertig vor und enthält auf 470 Seiten die möglichst gleichmässig gearbeiteten Diagnosen von circa 1700 Arten, ein Verzeichniss der benutzten Literatur, das eine annähernd vollständige Uebersicht der überhaupt existirenden einschlägigen Literatur bieten dürfte, und ein sorgfältig gearbeitetes Register. Es ist dadurch wenigstens jedem Zoologen die Möglichkeit geboten, sich über die europäische Conchylienfauna zu unterrichten, ohne eine ganze Bibliothek durchstöbern zu müssen.

Reinhardt, Dr. O., Schnecken aus der aegyptischen Wüste. — In Sitz.-Ber. Ges. nat. Fr. 20. Decbr. 1887.

Ascherson hat in der Wüste östlich und nördlich vom Suezkanal, zwischen el Kantara und el Arisch, mehrfach ganz frische Exemplare von *Lanistes carinatus* gefunden, obschon ausser einigen Brunnen das ganze Gebiet kein Süsswasserbecken enthält. Auch *Cleopatra bulimoides* und einige Mittelmeerschnecken fanden sich an den Raststellen vor. Von Landschnecken fand sich nur *Helix desertorum* in zahlreichen Formen, von denen eine mit ganz gerundeten Umgängen, tiefer Naht, vier Binden und nur 16—20 mm Durchmesser als *Helix Aschersoni* n. beschrieben wird.

Pollonera, Carlo, nuove specie di Molluschi delle Scioe. — In Bolletino Mus. Zool. ed Anatom. comp. Torino II. No. 34.

Dr. Vincenze Ragazzi, der Direktor der italienischen Station von Ankober in Schoa, hat die Mollusken der Umgebung gesammelt. Es sind folgende neue Arten: *Helicarion Ragazzii*, *Buliminus Antinorii*, *Homorus Ragazzii*, *Subulina Chiarinii*, *Fruticiecola scioana*, *Frut. strigelloides*, *Planorbis Cecchii*.

Pollonera, Carlo, Esame critico delle specie terrestri descritte come nuove dall' abate Olivi. — In Bullet. Soc. malacol. ital. XIII. No. 1.

Turbo multidentatus ist wahrscheinlich *Pupa frumentum*, nicht varia-

bilis; — *Helix umbilicaris* ist die vicentinische Form von *Helix ammonis*; — *Helix bilabiata* ist obvoluta, die dabei erwähnte Form von Bassano die Varietät mit stärker gezahntem Mundrand, *Helix Spinellii* Poll. = *Hel. Blanci* Poll. olim; — *Helix lineata* ist nicht virgata, sondern gehört in die Gruppe der *Helix profuga*; — *Hel. arenaria* ist *carthusiana*, *Hel. petholata* = *pisana*.

Journal de Conchyliologie vol. 35 No. 4.

- p. 281. *Morelet, A.*, Malacologie des Comores. V. Deuxième voyage de M. Humblot. — Neu *Helix miliaris* p. 282 t. 9 fig. 1; — *Streptaxis pupilla* p. 283 t. 9 fig. 2; — *Bulimus Humbloti* p. 284 t. 9 fig. 9; — *Bul. Bewsheri* var. t. 9 fig. 7; — *Stenogyra vulgaris* p. 286 t. 9 fig. 4; — *St. ornata* p. 287 t. 9 fig. 6; — *Ennea phanerodon* p. 288 t. 9 fig. 8; — *E. Dupuyana* Crosse var. t. 9 fig. 10; — *Cyclotopsis horrida* p. 290 t. 9 fig. 3.
- p. 291. *Mousson, Albert*, Coquilles recueillies dans le Sud-Ouest de l'Afrique par Mr. le Dr. H. Schinz. — *Cochlicella opposita* p. 293 t. 12 fig. 2 [ob nicht doch richtiger zu *Bulimus* zu stellen?]; — *Achatina Schinziana* p. 294 t. 12 fig. 3; — *Leucochiloides minusculeus* p. 295 t. 12 fig. 5; — *Subulina vitrea* p. 296 t. 12 fig. 6; — *Succinea arborea* p. 297 t. 12 fig. 7; — *Physa parietalis* p. 298 t. 12 fig. 8; — *Ampullaria occidentalis* p. 299 t. 12 fig. 9; — *Unio Kunenensis* p. 200 t. 12 fig. 10.
- p. 301. *Dautzenberg, Ph. et le baron L. de Hamonville*, Description de deux espèces nouvelles de mollusques terrestres du Tonkin. — (*Trochatella Nogieri* und *Pterocyclos Berthae*).
- p. 303. *Crosse, H.*, Diagnoses molluscorum Novae Caledoniae incolarum. — (*Helicina Alrici*, *H. Mondaini*, *Hydrobia Savesi*, *Planorbis Morletianus*).
- p. 305. *Crosse, H., et Fischer, P.*, Observations sur le genre *Berthelinia*. Das winzige Fossil ist nach gut erhaltenen Exemplaren in die Nähe der *Aviculidae* und *Prasinidae* zu stellen.
- p. 311. *Mayer-Eymar, C.*, Description de Coquilles fossiles des terrains tertiaires inférieures (Suite). Neu *Ostrea Runcensis*, *Gaasensis*; *Anomia Lisyensis* p. 313 t. 11 fig. 1; — *Plicatula magnifica* p. 316 t. 11 fig. 2; — *Pecten* (*Cornelia*) *Munieri* p. 317 t. 11 fig. 3; — *Inoceramus?* *Isseli* p. 317 t. 11 fig. 4; — *Verus plicatella* p. 319 t. 11 fig. 5; — *Lovellia Schweinfurthi* p. 320 t. 11 fig. 6.

Hoyle, William E., List of Shells collected by John Rattray on the West Coast of Africa and the adjacent islands.

From Proc. Roy. Physical Soc. Edinburgh 1886—7
vol. IX.

Mr. Rattray benutzte kurze Aufenthalte des Telegraphenschiffs *Bucaneer* zum Sammeln von Meeresconchylien bei Accra, an San Thomé, Principe, vor S. Paolo de Loanda, bei Porto Praya auf den Capverden und am Isthmus von Gran Canaria. Es wurden 4 Landschnecken, 70 Einschaler und 38 Zweischaler gesammelt. Bemerkenswerth ist das Vorkommen von *Cypraea lurida* bis nach Loanda hinab.

The Journal of Conchology Vol. V No. 9.

- p. 257. *Hudson, Baker*, Hogg's List of Mollusca of Stockton (Cont.).
- p. 260. *Madison, L.*, Notes on *L. peregra* vars. *burnetti* and *lacustris*.
- p. 261. *Cockerell, P. D. A.*, Note on *Hel. Raffrayi*. — Für die Ancey'sche Art dieses Namens wird wegen *Hel. Raffrayi* Tapp. der Name *Raffrayana* vorgeschlagen.
- p. 262. *Nelson, W.*, a Day's Collection near Howden, Yorkshire.
- p. 267. *Galwey, Honoria*, on the marine Shells of Macgilligan Strand.
- p. 278. *Marshall, J. T.*, on *Terebratula papillosa* Marsh. (Die- selbe ist nicht recent, sondern eine Varietät von *Terebratulina striata* d'Orb.)
- p. 279. *Melvill, J. Cosmo*, Descriptions of six new species of *Pecten* (*Gladysiae* t. 2 fig. 5 unbekannten Fundortes; — *Guen- dolenae* fig. 6, Mauritius; — *Hastingsii* fig. 7 Japan; — *hys- ginodes* fig. 8 unbekannten Fundortes; — *psarus* fig. 9 Japan; — *valdecostatus* fig. 10, Hongkong).
- p. 281. *Melvill, J. Cosmo*, Description of fifteen new species of *Mitra*. — (*Marionae* t. 2 fig. 11; — *aerumnosa* fig. 12, Algoa- Bai; — *astyridiformis* fig. 13; — *caloxesta* fig. 14, Andamanen; — *chariessa* fig. 15; — *transena* fig. 16, Ostindien; — *Sybillae* fig. 17, Andamanen; — *pernodictya* fig. 18, Philippinen?; — *cerithina* fig. 19; — *bela* fig. 20; — *tensa* fig. 21; — *abacophora* fig. 22; — *rhodinosphaera* fig. 23, Mauritius; — *zythochroa* fig. 24; — *fulvosulcata* fig. 25, Mauritius).
- p. 288. *Melvill, J. Cosmo*, Description of a new species of *Cy- praea* (*Rashleighana* t. 2 fig. 26 unbekannten Fundortes).

Martens, Ed. von, *List of the Shells of Mergui and its Ar- chipelago, collected for the Trustees of the Indian Mu- seum, Calcutta, by Dr. John Anderson, Superintendent of the Museum.*

Mergui, an der Küste von Tenasserim unweit der gleichnamigen Stadt gelegen, bildet mit dem Gebiet zwischen dem Mittelgebirge Malaccas und dem Meer bis nach Moulmein hinauf eine eigene Provinz des hinterindischen Faunengebietes, die sich ziemlich scharf nach allen Richtungen hin abgränzt. Die reiche Landconchylienfauna der Hügel von Moulmein scheint aber nicht über das ganze Gebiet verbreitet. Anderson sammelte nur 22 sp. Landconchylien, davon keine neu. Charakteristisch ist *Cyclophorus aurantiacus* in sehr mannigfaltigen Formen, zu denen auch *Cycl. pernobilis* Gould, *speciosus* Rve. nec Phil. und *Malayanus* Theob. et Hanley gezogen werden; var. *Nevilli* n., *Reevei* n. und *Andersoni* n. werden abgebildet, ausserdem *Cycl. zebrinus* var. *ambiguus*. *Helix* ist nur durch *gabata* Gould = *merguiensis* Phil. vertreten. Die Süss- und Brackwasserarten sind sämmtlich weiter verbreitet. Von marinen Arten werden 357 sp. aufgeführt, darunter neu *Littorina rubropicta* t. 16 fig. 2 und *Mytilus* (Septifer?) *Andersoni* t. 16 fig. 5. Abgebildet sind ferner *Nassa Thersites* var. *acypha* fig. 1, *Isanda pulchella* fig. 3, *Mytilus curvatus* fig. 4, *Mesodesma aequilaterum* fig. 6 und *Lutrarina* (Merope) *nicobarica* fig. 7. Das Verzeichniss ist eine sehr werthvolle Bereicherung unserer Kenntniss der geographischen Verbreitung der Mollusken im indischen Ocean, da Bestimmung und Fundort gleich sicher sind.

Bulletino della Società malacologica italiana. Vol. 13.

- p. 9. *Pollonera, Carlo*, Esame critico delle specie terrestri descritte come nuove dall' abbate G. Olivi (Cfr. p. 91).
- p. 17. *Simonelli, Vittorio*, sopra una nuove specie del genere *Pholadomya* (Ph. *Canavarii* t. 1 fig. 1—7 aus dem Miocän von Pergola, Prov. Ancona).
- p. 21. *Pantanelli, Dante*, *Pecten Angelonii* e *P. histrix*. Ersterer Name hat Priorität.
- p. 23. *Pantanelli, Dante*, *Melanopsis Matheroni* e *M. narzolina*.
- p. 26. *Pantanelli, Dante*, Descrizione di Conchiglie mioceniche nuove e poco note. — Neu: *Patella protea* Dod., *Tectura zibinica* Dod., *T. binistriata*, *Cocculina sculpta*, *Helcion tectula* Dod., *Fissurella excentrica* Dod., *F. alveolata* Dod., *Utriculus circinatus* Dod., *U. radians* Dod., *Rissoina hieroglyphicula* Dod., *Alvania rotulata* Dod., *Alv. zibinica*.

Nobre, Augusto, Remarques sur la Faune malacologique marine des possessions portugaises de l'Afrique occiden-

tale. — Extracto do Journal Sciencias mathematicas, physicas e naturales. No. 46. Lisboa 1887.

Ein sehr schätzenswerther Beitrag zur Kenntniss der geographischen Verbreitung der Meeresmollusken in den westafrikanischen Gewässern. Unter den 70 Arten, welche die Herren Newton, Moller und Quintas an der Küste von S. Thomé sammelten, befinden sich von europäischen Arten *Cypraea lurida*, *C. spurca*, *Columbella rustica*, *Nassa incrassata*, *N. reticulata*, *Triton parthenopum*, *Ranella scrobiculata*, *Dolium galea*, *Murex erinaceus*, *Purpura haemastoma*, *Cancellaria similis*, *Natica hebraea*, *Bulla striata*, *Fissurella rosea*, *Haliotis tuberculata*, *Pinna rudis*, *Spondylus gaederopus*, *Lima squamosa*, *Arca lactea*, *Chama gryphoides*. *Cytherea chione*, *Lucina reticulata*, zusammen 22 oder circa 30%, ein ganz auffallend hoher Prozentsatz.

Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, les Mollusques marins du Roussillon. II. Pelecypoda. Lfg. 1.

Enthält die Gattung *Ostrea* in gewohnter sorgfältiger Weise bearbeitet. Die Autoren vereinigen unter *O. edulis* als Varietäten: *tarentina* Issel, *lamellosa* Brocchi = *hippopus* Lam., *Cyrnusi* Payr., *cristata* Brocchi nebst *leonina* Frem., *adriatica* Lam = *uncinata* Desh. nec Lam., *depressa* Phil., *parasitica* Turton und *deformis* Lam., so dass für die französischen Küsten ausserdem nur noch *O. stentina* Payr. übrig bleibt.

Anzeigen.

En vente chez KEMINK & FILS, vis à vis le Domkerk, Utrecht:

Catalogue de la précieuse et superbe collection de Coquilles d'espèces vivantes et quelques livres traitant de la Conchyliologie le tout délaissé par Madame la Douairière Rethaau Macaré, née Ontijd, dont la vente publique aura lieu le lundi 6 Août 1888 à 10 heures du Matin à Utrecht. Prix du Catalogue 1 Franc.

Das naturhistorische Institut

„Linnæa“

befindet sich seit April d. J. in dem für seine Zwecke erworbenen Hause:

BERLIN N. W.

6 Louisenplatz 6

gegenüber den königl. Naturwissenschaftl. Museen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht 90-95](#)