© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

unter Lärchenrinde gesammelt waren, darauf aufmerksam, wie verhältnissmässig selten Conchylien an Nadelhölzern gefunden würden. Er nennt als solche nur Claus. abietina Dup. und Turbo juniperi Mtg. = Pupa secale Drp., sowie nach eigener Erfahrung Pupa frumentum Drp. Herr von Maltzan fügte dem nach Brancsik's Beobachtung Helix Rossmässleri und nach eigener Claus. rupestris Friv. hinzu. — Ich habe bei Boghar in Algerien Helix Juilleti in einem Strandkiefernwald auf dem nadelbedeckten Boden zahlreich gefunden, ebenso auch Helix punica in der Nähe von Lambessa ausschliesslich an und unter Wachholderbüschen. Ko.

Literaturbericht.

Kobelt, Dr. W., Iconographie der schalentragenden europaeischen Meeresmollusken. Zweiter Band, Lfg. 1.

Enthält die Gattungen Cymbium, Volutomitra, Halia, Ranella, Apollon und Epidromus.

Shepman, M. M., een nieuwe Paludina van Borneo. — Sep. Abz. aus Tijdschr. Nederl. Dierk. Vereen. (2) II. 1. 2. 1888.

(Paludina Lemelinki n., t. conoidea, inflata, solida, imperforata vel rimata, obscure virens-olivacea; spira erosa; anfr. verosimiliter 6 valde convexis, subtilissime spiraliter striatis et striis incrementi (antice distinctioribus) decussatis Sutura profunda, inferne filo-marginata. Anfractus ultimus subangulatus Apertura ovata, superne obtuso-angulata, intus coerulescens-alba (in adultis intus aurantio-callosa), marginibus tenuibus, nigro-limbatis. — Operc. corneum, ovato-piriforme, concavum, nucleo submarginali. — Alt. 42, lat. 34 mm. Hab. in fluv. Tabanio prope Pleyharie).

Ancey, C. F., Mollusques du Haut-Tonkin. Récoltes de M. Villedary. — In le Naturaliste p. 70.

Die Fauna schliesst sich eng an die südchinesische an; in der Sendung waren auch zwei Clausilien enthalten, davon eine zu Garnieria gehörend, aber zu schlecht erhalten, um Arten darauf zu gründen. Als neu beschrieben wird Plectopylis Villedaryi, in Holzschnitt abgebildet. — Hel. mercatorina Mab. = Moreleti d'Ham. et Dautz ; — Hel. batmophora Mab. = Gabriellae d'Ham. et Dautz.; — Hel. Hahni Mab. = Ariophanta Broti d'Ham. et Dautz.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Kobelt, Dr. W., Rossmässler's Iconographie. Neue Folge. Dritter Band. Lfg. 5 u. 6. Wiesbaden, Kreidel, 1888.

In dieser Doppelnummer kommen zum erstenmal zur Abbildung: 441. 442. Leucochroa sarda Maltzan. — 443. 444. L. Kobeltiana Deb. — 448. 449. L. hispanica West. — 450—52. L. octinella Péch. — 453—56. L. Debeauxi Kob., deren Verschiedenheit von L. Mayrani Gassies nachgewiesen wird; — 466. Helix anoterodon Péch. — 468. 69. Helix Lobethana Deb. — 472. Helix subjobaeana n., das lebende Analogon der fossilen Hel. jobaeana; — 474. Helix Bailloni Deb.; — 475. 76. Helix chareia Péch. — 477. Hel. Denansi Kob.; — 478. Helix Ghazouana Deb.; — 492. Unio hispalensis Kob. — 494. Unio Calderoni Kob. — 495. Unio baeticus Kob. — 496. Unio Sevillensis Kob — 497. Anodonta Calderoni Kob. — 498. Anodonta baetica Kob.

Cogels, P., Notice historique sur la Société Malacologique de Belgique. Avec une Analyse des Travaux qui ont paru dans ses Annales. (1863—1880). Bruxelles 1887. 8°.

Gibt auf 378 Seiten eine Uebersicht über die Entwicklung der belgischen malacozoologischen Gesellschaft und eine sehr dankenswerthe Zusammenstellung der in ihren Annalen erschienenen Arbeiten.

Neumayr, Dr. M., über Paludina diluviana Kunth. In Zeitschrift deutsch. geolog. Gesellschaft 1887 p. 605 tab. 27.

Exemplare, welche in nichts von der fossilen Paludina diluviana abweichen, sind theils am Strand des schwarzen Meeres bei Sulina, theils aber lebend bei Tuldscha in der Dobrudscha gefunden worden. Die abgebildeten Exemplare gehören zum fasciata-Typus und wären ausser P. mamillata Kstr. einerseits okaensis Clessin, andererseits aethiops Stenz zum Vergleich heranzuziehen. N. vermuthet, dass die rezente diluviana mit einer der Arten zusammenfällt, die Bourguignat von der unteren Donau beschrieben hat.

Braun, Prof. Dr. M., Faunistische Untersuchungen in der Bucht von Wismar. — Sep.-Abz. aus Mecklenb. Archiv vol 42. 1888.

Die sorgsame Untersuchung der Wismarer Bucht mit dem Schleppnetz hat zwar in anderen Thiergruppen sehr interessante Resultate ergeben, an Molluskon dagegen nur schon von der mecklen-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

burgischen Küste bekannte; (Mytilus edulis, Modiolaria discors, Cardium edule, C. exiguum, Tellina baltica, Mya arenaria, Odontostoma rissoides, Littorina littorea, obtusata, rudis, Lacuna divaricata, pallidula, Rissoa octona, membranacea, cornea, parva, Hydrobia ventrosa, Neritina fluviatilis).

The Journal of Conchology. Vol. V. No. 10.

p. 289. *Taylor, J. W.,* on the Variation of Land- and Freshwater Mollusca.

p. 314. *Quilter, H. E.,* Note on a Parasitic Mite of Testacella scutulum.

p. 315. *Smith, Edgar A*, Notice of a Monstrosity of Bythinia tentaculata.

Bulletino della Societa malacologica italiana. Vol. XIII. No. 2.

p. 49. *Pollonera, Carlo*, Molluschi delle Scioa e delle valle dell' Havash.

Die von Dr. Ragazzi zurückgebrachte Ausbeute besteht aus 32 Arten, davon 25 Land- und 7 Flussbewohner, 19 davon sind neu. Nur neun Arten sind mit Abessynien gemeinsam, aber die anderen tragen, wie die von Bourguignat bearbeitete Soleillet'sche Ausbeute, einen ausgesprochen abessynischen Charakter. Die neuen Arten, deren Diagnosen meist schon in der folgenden Arbeit des Verfassers veröffentlicht wurden, sind: Helicarion Ragazzii p. 55 t. 2 fig. 12—15; — Vitrina Licatae p. 56 t. 2 fig. 23, 24; — Vitrina Ragazzii p. 56 t. 2 fig. 20—22; — V. Bianchii p. 57 t. 2 fig. 1—3, 17; — V. Giulettii p. 58 t. 2 fig. 4—6; — V. Martinii p. 59 t. 2 fig. 5—9; — V. Antonellii p. 61 t. 2 fig. 11; — Sitala trochulus p. 62 t. 3 fig. 19—21; — Buliminus Vigonii p. 65 t. 3 fig. 7; — Bul. Sacconii p. 66 t. 3 fig. 8; — Bul. scioanus p. 67 t. 3 fig. 9; — Bul. Antinorii p. 68 t. 3 fig. 4—6; — Bul. Meneliki p. 69 t. 3 fig. 1—3; — Homorus Ragazzii p. 74 t. 2 fig. 10; — Subulina Chiarinii p. 74 t. 2 fig. 31; — Fruticicola scioana p. 76 t. 2 fig. 28—30; — Fr. strigelloides p. 77 t. 2 fig. 25—27; — Planorbis Cecchii p. 79 t. 3 fig. 11—13; — Unio Traversii p. 85 t. 3 fig. 14. 15.

p. 86. *Sacco, Dr. F.,* Sopra alcuni Potamides del Bacino terziario del Piemonte. Folgende Arten nebst ihren Varietäten werden besprochen: P. prolignitarum Sacco, lignitarum Eichw., Melii n., monregalensis S., Clericii n., colligens S., dertonensis S., promargaritaceus S., Isselii S., solitarius S., ligusticus S., Rovasendae n., pedemontanus S. —

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pollonera, Carlo, Nuove specie di Molluschi terrestre raccolti nella Scioa dal Dottor V. Ragazzi. — In Boll. Mus. Torino III. 1888. No. 37.

Enthält die Diagnosen der oben aufgezählten neuen Arten.

Ancey, C. F., Mollusques du Haut-Tonkin. In le Naturaliste, Année X.

Neu Cyclophorus Theodori p. 92, C. fulguratus var. Barniana p. 93, C. Courbeti p. 93 — Die Gattung Proctostoma Mabille (für Helix trisinuata) fällt zusammen mit Moellendorffia Ancey, dem die Priorität gehört.

Martens, Ed. von, zwei neue brasilianische Schneckenarten. In Sitzungsber. Ges. naturf. Fr. Berlin 17. April. —

(*Bulimus proclivis:* T. subimperforata, ovato-oblonga, subinaequaliter striatula, sparsim et subtiliter malleolata, nitidula, flavobrunnea sutura albida, irregulariter undulata; anfr. 6, primus laevis, albidus, immersus, secundus et tertius perconvexi, grossiuscule costulati, superne albidi, dein fusci, sequentes celeriter crescentes, penultimus magnus, parum convexus, ult. in parte secunda peroblique descendens, basi rotundatus; apert. paullum obliqua, ovata, peristomate incrassato, breviter reflexo, roseo, margine columellari intus spiratim torto, albido, extus dilatato, appresso, roseo, callo parietali distincto, roseo-albicante. Alt. 89 mm. — *Anodonta legumen.* T. elongata, sat compressa, concentrice striatula, nitida, olivaceo-fusca, margine dorsali ante et pone vertices rectilineo, parte antica brevi, rotundata, superne subangulata, extremitate postica linguaeformi, rostrata, superne descendente, compressa, margine ventrali antice distincte, postice vix adscendente, medio rectilineo; intus violascenti-coerulea, iridescens; vertices ad $^1/_4$ long. siti. Long. 83, alt. 26, diam. $13^1/_2$ mm. — Beide aus der Provinz Rio grande do Sul).

Pollonera, Carlo, Appunti di Malacologia. — In Boll. Mus. Torino III. 1888 No. 43.

Behandelt die Testacelliden. Zunächst einige Arten aus der Umgebung von Turin, von denen es nicht sicher ist, ob sie recent oder fossil sind (haliotidea Drp. dubia n. und subtrigona n.); ferner einige neue spanische Arten (barcinonensis, catalonica). Endlich wird auf eine Nacktschnecke aus Kleinasien die neue Gattung Mesolimax (Braunii n.) gegründet; es ist eine Mittelform

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

zwischen Limax, dem der Generationsapparat gleicht, Amalia, mit welcher das Schälchen mit centralem Nucleus stimmt, und Agriolimax und Malacolimax, mit denen die Zungenbewaffnung übereinstimmt.

Bulletin of the California Academy of Siences. Vol. II. No. 7. June 1887.

p. 355. *Cooper J. G.,* West Coast Pulmonata; Fossil and Living. — Enthält sehr interessante Bemerkungen über die geographische Vertheilung der californischen Pulmonaten und deren Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit und den feuchten Seewinden. Wir werden über Coopers Forschungen eingehender berichten, sobald der in Aussicht gestellte Schlussartikel erschienen ist.

Journal de Conchyliologie. 1888. No. 1. —

p 5. *Furtado, Arrudo,* sur le Bulimus exaratus Müll. — Die anatomische Untersuchung ergibt, dass die Art, wie aus der Geographie zu vermuthen, zu den Achatiniden gehört und der Mundbewaffnung nach nicht von Perideris getrennt werden kann.

p. 11. *Crosse et Fischer,* Observations sur le Bulimus exaratus Müll. — Die Autoren schliessen sich Furtado an, glauben aber doch für die Art eine eigene Untergattung Atopocochlis bei Perideris errichten zu sollen.

p. 12. *Crosse H.,* Nouveau Catalogue de Mollusques terestres de l'île San Thomé. — Durch die Forschungen von Greeff, Moller und einigen Portugiesen ist die Zahl der bekannten Landconchylien auf 21 gestiegen; Süsswasserarten sind noch gar keine bekannt, obschon es an fliessendem Wasser nicht fehlt. Von Interesse sind zwei winzige Cyclophorus und der neue Homorus Massonianus Crosse t. 1 fig. 3. — Wenn Crosse die Molluskennatur von Thyrophorella bezweifelt, hat er übersehen, dass die anatomische Untersuchung deren Pulmonatennatur festgestellt hat.

p. 30. *Hidalgo, Dr. J. G.,* Recherches conchyliologiques de M. Quadras aux îles Philippines (suite). — Als neu werden beschrieben Stenogyra Quadrasi p. 35. t 6 fig. 2; — St. Semperi p. 36 t. 6 fig. 3; — Cassidula Quadrasi p. 51 t. 6 fig. 6; — C. Philippinarum p. 53 t. 6 fig. 7; — Opisthoporus Quadrasi Crosse mss. p. 59 t. 5 fig. 6; — Diplommatina Tablasensis p. 62 t. 5 fig. 7; — Cyclophorus Daraganicus p. 68 t. 4 fig. 2; — C. Benguetensis p. 69 t. 4 fig.; — C. Fernandezi p. 72 t. 4 fig. 6; — C. Bustoi p. 78 t. 5 fig. 4; — C. Sowerby p. 80.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

p. 97. *Morelet, Arthur,* Description d'une éspèce nouvelle d'Achatina d'Assinie. (Bayoli t. 1 fig. 4).

p. 100. *Crosse et Fischer,* Description d'un Cyclostoma inédit provenant de Madagascar (C. eustolum t. 1 fig. 1).

p. 101. *Craven, Alfred E.*, Note sur l'Helix harpa Say. Der Autor hat diese hochnordische Art auf der Riffelalp bei Zermatt in 2100 m Höhe unter Fichtenrinde gefunden.

p. 103. *Drouêt, Henri,* Unionidae nouveaux ou peu connus. (U. Gandiensis aus der Gegend von Valencia, occitaneus, plebejus, Charpyi, crassulus, lacustris, suborbicularis, badiellus, sämmtlich aus französischen Gewässern; Anodonta Brandti aus dem Tschaldyrsee in Armenien; An. formosa, tremula, convexa, amnica, sämmtlich aus dem Rhonegebiet).

Brancsik, Dr. Carl, die Formen der Clausilia Drp. im Trencsiner Comitat und deren Verbreitung. In X. Jahresheft des Naturw. Vereines des Trencsiner Comitates von 1887. Mit Tafel.

Der Verfasser unterscheidet und bildet ab: var. Trencsinensis fig. 1, var. Manina fig. 2, var. carpathica fig. 3, ferner forma minor, minima, gracillima und costata, und var. pauperata.

Brancsik, Dr. Carl, Pupa Brancsikii Clessin keine Species. Ibid. p. 81.

Die neue Art ist durch so viele Uebergänge mit Pupa dolium verbunden, dass sie nicht von ihr getrennt werden kann. Eine ganze Anzahl Varietäten von P. dolium werden abgebildet und beschrieben.

Smith, Edgar A., on the shells of the Albert-Nyanza, Central-Afrika, obtained by Dr. Emin Pascha. — In Proc. Zool. Soc. London 1888 p. 52.

Durch Baker und Emin kennen wir gegenwärtig 15 Molluskenarten aus dem Albert Nyanza, davon 7 ihm eigenthümlich, die anderen auch sonst im Nilgebiet vorkommend, Planorbis sudanicus auch im Tanganyika vorkommend, Melania tuberculata weit verbreitet. Die neuen Arten sind: Melania lirocincta zunächst mit Mel. Victoriae Dohrn vom Sambesi verwandt, Cleopatra Emini, Bythinia Walleri, Byth. Alberti, Planorbis Stanleyi.

Smith, Edgar A., Notice of an abnormal growth in a species of Haliotis. — In Ann. Mag. Nat. Hist. June 1888 p. 419.

Das britische Museum erhielt neuerdings eine Haliotis gigantea von

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Japan mit zwei Reihen Löchern, der erste bekannt gewordene Fall einer solchen Missbildung.

Petersen, C. G. Joh., om de Skalbaerende Molluskers Udbredningsforhold. I. De Danske Have indenfor Skogen. Kjobenhavn 1888. 8°. 162 pg. mit 2 Karten.

Die vorliegende Doktordissertation enthält die Bearbeitung des reichen Molluskenmaterials, welche das dänische Kanonenboot Hauch im Dienste der Fischerei-Inspection in den Jahren 1883—1886 im nördlichen Kattegat sammelte. Von den Karten gibt die eine die Tiefenverhältnisse, die andere die Bodenverhältnisse in ausführlicher Darstellung. Im speciellen Theil werden 113 Einschaler und 86 Zweischaler ausschliesslich der unsicheren Arten aufgeführt, von jeder Art Vorkommen und Verbreitung genau angegeben. Der allgemeine Theil behandelt das Verhältniss der Kattegattfauna zur europäischen Gesammtfauna sehr eingehend. Das ganze Werkchen ist ein sehr wichtiger Beitrag zur Fauna europaea marina und wir bedauern nur, daß es in einer Sprache geschrieben ist, deren Kenntniss so wenig verbreitet ist.

Smith, Edgar A., Mollusca. In *Collections from the Western Indian Ocean, made by HMS. Alert p. 487—508.* pl. 44.

Die Sammlungen des Alert sind besonders in den maskarenischen Gewässern gemacht und der vorliegende Catalog ist somit eine Ergänzung zu dem Martens'schen Verzeichniss. Es werden 122 Arten aufgeführt, von denen 40—50 bei Martens nicht genannt werden. Die neuen Arten sind: Conus Martensi p. 488; — Pleurotoma grisea p. 189; — Ocinebra infans p. 491; — Ocinebra darrosensis p. 492; — Columbella seychellensis p. 493; — Col. rufopiperata, amirantium, albocaudata p. 495; — Coralliophila amirantensis p 497; — Turricula bipartita p. 499; — Cerithium albovaricosum p. 501; — Cer. amirantium p. 501; — Cer. acutinodulosum p. 501; — Trochus amirantium p. 504; — Chemnitzia Coppingeri p. 505.

Dall, W. H., some american Conchologists. An Adress delivered at the eighth anniversary meeting of the Biological Society of Washington. — Washington 1888.

Enthält die Biographieen von zahlreichen nordamerikanischen Conchologen und die Porträts von Stimpson, Couthouy, Lea. Eine sehr dankenswerthe Arbeit; eine ähnliche in Deutschland wäre sehr zu wünschen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Borcherding, Fr., Dritter Nachtrag zur Molluskenfauna der nordwestdeutschen Tiefebene. Nebst Bemerkungen über die Fauna, insbesondere der Mollusken, des Zwischenahner Meeres, des Dümmer Sees und des Steinhuder Meeres. — In Abth. naturwiss. Vereins Bremen. IX. 1888. p. 335—367. Taf. IV u. V.

Der Autor hat an die Najadeen einen engeren Maßstab gelegt als gewöhnlich in Deutschland geschieht, ein Verfahren, in welchem wir ihm nur unbedingt beistimmen können. Er beschreibt als neu Unio macrochynchus, Seeform des tumidus aus dem Dümmer See; — Anodonta fusiformis, microptera und pachyproctus aus der coraplanata-Gruppe. Ausserdem werden Unio Heckingii Colbeau, Anodonta fragilissima Clessin, Anod. Klettii Rossm., Rayi Mab., elongata Hol. aufgeführt. Wir kommen auf die neuen Arten zurück.

Für die Bibliothek eingegangen.

Schepman, M. M., *een nieuwe Paludina von Borneo.* Sep.-Abz. Vom Verfasser.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. III. No. 1.

Einladung zum vierten internationalen Geologen-Congress.

Von dem Ausschuss zur Organisation des vierten internationalen Geologen-Congresses, welcher am 17. September d. J. zu London eröffnet wird, ist uns eine Einladung zur Betheiligung für die Mitglieder unserer Gesellschaft übersandt worden. Der Beitrag, gegen dessen Einsendung die Karte zur Theilnahme ertheilt wird, beträgt 10 Mark. Anmeldungen sind an den Generalsecretär W. TOPLEY Esq., 28 Jermyn Street, London zu richten. Wir bemerken noch, dass der Besuch des Geologen-Congresses sehr gut mit dem der Sitzung der British Association for the advancement of Science, welche vom 5. bis 12. September in Bath stattfindet, verbunden werden kann.

☞ ***Mit dieser Nummer wird eine Beilage der Werkzeugfabrik Robert Sedlmayr in München ausgegeben, welche wir geneigter Beachtung empfehlen.***

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: 20

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Literaturbericht 121-128