

teren paläarktischen Formen am meisten an die braune Farbenspielart der *H. pura* Ald.

6. *Helix (Dorcasia) similaris* Fér. Theresopolis, Prov. Sta. Catharina.

7. *Bulimus (Strophochilus) unidentatus* Sow. Theresopolis, Prov. Sta. Catharina.

8. *Bulimus (Macrodontes) Grayanus* Pfr. Theresopolis.

9. *Bulimus (Odontomus) tudiculatus* v. Mts. Theresopolis.

10. *Subulina octona* (Chemn.). Olinda bei Pernambuco (Fruhstorfer), Rio de Janeiro (Dr. Naegeli).

11. *Opeas micrus* (d'Orb.).
= *Caraccasensis* Rve.

Ilha das Flores in der Bai von Rio de Janeiro.

Den nahe verwandten *O. Beckianus* Pfr., der nur grösser und breiter wird, glaube ich in meiner Sammlung aus Peru zu besitzen.

12. *Opeas regularis* Pfr. Ilha das Flores.

13. *Helicina Brasiliensis* Gray. Theresopolis, Prov. Sta. Catharina.

Ausser einfarbigen Stücken sind auch solche mit einem breiten kastanienbraunen Unterband daselbst gar nicht selten.

Literaturbericht.

Hoyle, William E., *Report on the biological investigations on the Sea to the West of Lewis during July and August.* Appendix to Sixth Annual Report of the Fishery Board for Scotland p. 215—222, with map.

Die zu den werthvollsten Fischgründen gehörenden Districte westlich der Insel Lewis sind auf Veranlassung des Fishing Board for Scotland einer genaueren Untersuchung durch die Herren W. E. Hoyle und H. R. Mill unterzogen worden, bei welcher auch die Mollusken gebührende Berücksichtigung fanden. Es sind wesentlich boreale Arten, von besonderem Interesse *Buccinopsis Dalei*.

The Journal of Conchology. Vol. V. No. 12.

- p. 353. *Collier, Edward*, Land and Freshwater Mollusca of Cardiganshire.
- p. 356. *Cockerell, Sydney C.*, Conchological Notes from Picardy. Faunistische Angaben aus der Gegend von Amiens und Abbeville.
- p. 358. *Cockerell, T. D. A.*, on *Agriolimax montanus* in Colorado. Der Autor hält sowohl *montanus* als *occidentalis* nur für Localformen des *Limax campestris* Say. In Colorado kommt nur *montanus* vor, aber in drei Varietäten, welche C. als *typicus*, *intermedius* und *tristis* unterscheidet; die beiden letzteren Formen gehören höheren Lagen an.
- p. 361. *Marshall, J. T.*, *Argiope decollata* at Scilly.
- p. 364. *Williams, J. W.*, on the Morphology of the Gonads in *Limnaea stagnalis* and *L. peregra*.

Kleinere Mittheilungen.

Die nachgelassene Sammlung des Majors G. B. Adami ist nach einer Mittheilung im *Naturalista Siciliano* in den Besitz des Marchese Allery di Monterosato übergegangen.

In Bezug auf **Harnleiter und Niere der Pulmonaten** kann nach den nun beendeten Untersuchungen von Dr. Th. Behme noch mitgetheilt werden, dass ebenso wie *Buliminus pupa* Brug. (vergl. *Nachrichtenblatt* No. 9/10 1888) sich noch *Bul. obscurus* Müll., *Hel. radiatus* Brug., *Cionella lubrica* Müll., *Pupa avenacea* Brug. und *Helix pulchella* Müll. verhält; bei allen genannten Arten erinnert die Niere und Harnleiter sehr an die entsprechenden Organe bei *Limnaeen* d. h. die Niere selbst verlängert sich direkt in einen gerade von hinten nach vorn gehenden Harnleiter, der nicht unmittelbar neben dem Mastdarm verläuft und kurz hinter dem Athemloch ausmündet; es fehlt also hier nach unserer Anschauungsweise der sekundäre, aus der Lungenhöhle hervorgegangene Harnleiter. Ebenso liegen die Verhältnisse nach den Abbildungen von Lacaze Duthiers bei *Testacella*, während *Daudebardia*, *Vitrina*, *Hyalina*, *Zonites*, *Leucochroa*, *Patula* wie fast alle *Helix*-Arten, ferner *Clausilia* und ein Theil der *Bulimini* einen sekundären Harnleiter haben — so weit dieselben bisher untersucht werden konnten; unter den Wasserlungenschnecken sind Ausnahmen nicht beobachtet worden.

M. Braun.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [21](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Literaturbericht. 30-31](#)